




LX-B-14

BIBLIOTECA NAZ.
Vittorio Emanuele III

LX

B

14

NAPOLI







SUITE DES
MEMOIRES
DE
MATHEMATIQUE
ET
DE PHYSIQUE,

Tirés des Registres
DE L'ACADEMIE ROYALE
DES SCIENCES,
DE L'ANNEE M. DCCXXXIV.




A AMSTERDAM,
Chez **PIERRE MORTIER,**
M. DCCXXXVIII.

Avec Privilege de N. S. les Etats de Hollande & de West-Frise

S U I T E D E S
M E M O I R E S
D E L' A C A D E M I E R O Y A L E
D E S S C I E N C E S ,

D E L' A N N É E M . D C C X X X I V .



R E C H E R C H E S S U R L E T O U R .

P R E M I E R M E M O I R E .

Par M. DE LA CONDAMINE. *

*Description & Usage d'une Machine qui imite
les mouvemens du Tour.*

 E Tour semble n'avoir été imaginé que pour donner une parfaite rondeur aux ouvrages auxquels cette forme pourroit convenir. Cette Machine en fournit un moyen sûr & commode.

Mais ce qui a passé d'abord pour le chef-d'œuvre de l'Art, est devenu bientôt une pratique ordinaire & commune. Toute l'adresse & l'industrie des Artistes ne s'est presque employée depuis qu'à s'éloigner de plus en plus dans les ouvrages du Tour, de la forme

* 8 Juillet 1734.
Mém. 1734.

me circulaire qui avoit été le but de l'Inventeur dans la premiere découverte.

Le Tour a été porté depuis un siecle, & sur-tout de nos jours, à une grande perfection. Nous avons des ouvrages qu'on a peine à concevoir que le Tour puisse exécuter, mais qu'on imagine encore moins qui aient pu se faire sans le secours du Tour. Plusieurs ouvriers habiles & divers particuliers qui se sont appliqués à cette ingénieuse mécanique, ont trouvé en differens tems. le secret de faire sur le Tour des choses nouvelles & singulieres *; mais la plupart tenoient leur pratique secrette, dans la vue de faire plus admirer ou rechercher leurs ouvrages.

Le P. Plumier, Minime, publia en 1701 son Livre de *l'Art de Tourner*, dans lequel il révéla les plus secrets mysteres de cet Art, ou du moins donna des moyens d'exécuter ce qu'on avoit vu de plus singulier dans ce genre. C'est le seul Auteur François, venu à ma connoissance, qui ait approfondi cette matiere, & qui soit entré dans un aussi grand détail sur les usages du Tour simple & du Tour figuré. Je ne parle point de ce que M. de la Hire a donné en 1719 dans les Mémoires de l'Académie, qui ne peut être d'usage que pour le cas particulier des Polygones à pans droits auquel il s'est borné.

La construction & l'usage du Tour sont assez connus, sur-tout aujourd'hui qu'il est devenu un amusement à la mode. Cependant,

* Voyez la Description du Cabinet de M. Grollier de Servières.

dant, en faveur de ceux à qui la mécanique du Tour n'est pas bien familière, on rappellera en peu de mots ce qui est nécessaire pour l'intelligence de ce Mémoire.

On appelle *Tour simple*, celui qui ne sert qu'à tourner en rond. Le *Tour figuré* est celui dont on se sert pour tourner toute autre figure que le cercle. Je ne parle point du *Tour ovale*, qui a sa construction particulière, quoiqu'on puisse tourner un ovale quelconque avec le seul secours du Tour figuré.

La principale pièce qui caractérise le Tour figuré, est celle qu'on nomme la *Rosette*; c'est elle seule qui fournit le moyen de tracer les différentes figures qu'on peut donner aux ouvrages du Tour; sans elle, avec tout le reste de l'appareil du Tour figuré, on ne pourroit décrire que des Cercles.

* La Rosette, comme on fait, est un morceau de fer plat de trois ou quatre lignes d'épaisseur à-peu-près, & d'environ deux ou trois pouces de diamètre. Son contour est ordinairement à pans, tantôt simples, tantôt ondes ou goderonnés. Il peut y en avoir d'une infinité de figures différentes, suivant le goût & la fantaisie de l'ouvrier.

Cette Rosette est percée dans son centre d'un trou quarré, l'arbre du Tour est aussi é-quarri pour la recevoir & lui servir d'essieu. La Rosette ainsi ajustée, tourne avec l'arbre; & le bord de la Rosette, en tournant, rencontre une pointe de fer mouffe, qu'on appelle

* Voy. l'Art de Tourner, du P. Plam. part. 6. ch. 1.
p. 124.

pelle *Touche* *. Cette Touche est fixe & immobile, mais l'arbre qui porte la Rosette peut se mouvoir parallèlement à lui-même, & par conséquent s'approcher & s'éloigner de la Touche contre laquelle il est continuellement pressé par un ressort disposé pour cela.

Ainsi, tandis que la Rosette tourne, elle porte toujours par son côté sur la Touche, y étant contrainte par la force du ressort; le centre de la Rosette s'approche donc ou s'éloigne de la Touche selon que le permettent les inégalités du contour de cette Rosette, qui présente successivement tous ses points à la Touche. Par la même raison, le centre de la pièce qu'on travaille qui est ajustée & centrée comme la Rosette, mais à l'autre extrémité de l'arbre, s'approchera & s'éloignera de la pointe de l'outil qu'on lui présente, à mesure que la Rosette s'approchera ou s'éloignera de la Touche; l'outil mordra donc sur la pièce, tantôt plus près & tantôt plus loin de son centre, & par conséquent tracera sur la pièce un contour dépendant de celui de la Rosette.

On ne parle point d'un autre mouvement qu'on peut procurer à l'arbre du Tour dans la direction de son axe, & qui sert à pratiquer des creux & des reliefs sur l'ouvrage. Il n'est

* La Touche, pour une plus grande commodité dans l'exécution, est ordinairement garnie d'une Roulette; mais pour ne point trop compliquer cette description, on suppose, quant à présent, la Touche simple & ne portant sur la Rosette qu'en un point, comme lorsqu'elle est taillée en coin, ce qui se pratique aussi quelquefois.

n'est ici question que des contours qu'on peut tracer sur une surface plane.

Au premier coup d'œil, on pourroit être tenté de croire que la même Rosette ne peut produire qu'une même figure ; jusqu'à présent les Tourneurs n'ont été guere plus loin, du moins on peut dire qu'avec la même Rosette ils tracent à peine deux contours vraiment differens , l'un à-peu-près semblable à celui de la Rosette, l'autre qui est, pour ainsi dire, la contre-partie du premier.

Le premier dessein semblable ou presque semblable au contour de la Rosette, est l'effet de la Touche placée du même côté de l'arbre que l'outil, parce que dans cette situation, l'arbre par son mouvement de parallélisme s'approche & s'éloigne de l'outil & de la Touche en même tems. L'autre dessein est l'effet de la Touche placée à l'opposite de l'outil, de l'autre côté de l'arbre, parce qu'alors l'arbre s'éloigne de l'outil quand il s'approche de la Touche, & réciproquement ; ce qui doit nécessairement changer les arcs concaves de la Rosette en convexes sur la piece, & les convexes en concaves. Voilà, à peu de chose près, jusqu'où s'étend la pratique des ouvriers, & le P. Plumier lui-même, qui a rassemblé dans son Livre tout ce qu'il a recueilli chez les plus habiles Tourneurs, & ce que sa propre expérience lui a fourni, n'en dit pas davantage.

Mais en y regardant d'un peu plus près, on découvrira que la même Rosette peut donner un très grand nombre de contours differens ; que ce n'est que dans un cas unique

que le contour tracé est parfaitement semblable à la Rosette, & qu'alors il lui est aussi égal ; enfin que quelques Rosettes fort simples donnent en certains cas des figures fort bizarres, comme des courbes nouées & entrelacées, choses inouïes chez les Tourneurs.

Il seroit donc utile de connoître les différens contours que peut produire la même Rosette, & jusqu'où peut s'étendre leur variété ; en un mot, de savoir, une Rosette étant donnée, tout le parti qu'on en peut tirer. Ce n'est pas encore tout : avec un grand nombre de Rosettes différentes, & une connoissance exacte de tous leurs effets possibles, on ne seroit pas plus avancé, si on avoit à tracer quelque figure qui ne pût être produite par aucune des Rosettes dont on connoitroit la capacité.

Il est vrai que comme l'on fait qu'il y a un cas où la Rosette & la figure sont semblables & égales, on pourroit quelquefois réussir, en employant pour Rosette la figure même qu'on veut tracer ; mais le plus souvent la figure proposée seroit peu commode, pour les raisons que nous dirons ailleurs, & quelquefois aussi il seroit impossible d'en faire usage : par exemple, si le trait de la figure étoit entrelacé, comme dans celles qui ont des nœuds, qui peuvent cependant souvent être produites par le moyen d'une Rosette à simple contour.

Il ne suffit donc pas de pouvoir connoître tous les effets possibles d'une Rosette proposée. Pour n'être jamais arrêté, il faudroit
avoir

avoir encore le moyen de trouver toutes les Rosettes possibles qui peuvent produire la figure que l'on peut tracer; car alors parmi toutes ces Rosettes on seroit en état de choisir la plus convenable pour la facilité de l'exécution. J'avois entendu parler d'une Machine que son Inventeur * tenoit fort secrète, & qui seroit, disoit-on, à l'un & à l'autre de ces deux usages; premierement, une Rosette étant donnée, à connoître toutes les figures qu'elle peut décrire; secondement, un contour étant donné, à trouver toutes les Rosettes qui peuvent servir à tracer ce contour. J'ai cherché quelle pouvoit être la Machine qui produisoit ces deux effets; en voici une que j'ai imaginée.

M. du Fay, par qui j'ai été invité & encouragé à faire cette recherche, a aussi travaillé à deviner ou à remplacer la Machine mystérieuse. Je compte que le plus grand mérite de celles que j'ai à proposer est le rapport qu'elles ont avec celle de M. du Fay, qui depuis a abandonné ce travail. C'est en 1729 que je présentai à l'Académie, dont je n'avois pas encore l'honneur d'être Membre, mon premier essai sur cette matiere †, sur laquelle j'ai fait depuis de nouvelles réflexions. J'ai attendu, pour en parler dans nos Mémoires, que je pusse y joindre l'examen géométrique de la nature des Courbes du Tour, qui n'étoit alors qu'ébauché. C'est le sujet d'un second Mémoire, qu'on trouvera dans ce même volume.

O 5

Par

* M. Grammare, Présid. au Gren. à Sel de Hardens.

† V. l'Hist. de l'Ac. 1729. p. 126.

Par la mécanique du Tour figuré que nous venons d'expliquer, on conçoit que l'arbre du Tour a deux mouvemens: premierement, il se meut circulairement sur son axe, c'est ce qu'il a de commun avec l'arbre du Tour simple; & de plus il se meut horizontalement en ligne droite pour s'approcher ou s'éloigner de la Touche, selon que l'exigent les éminences ou les creux du contour de la Rosette, & c'est en quoi le Tour simple diffère du Tour figuré.

Si l'arbre du Tour figuré n'avoit de mouvement que sur son axe, & qu'au défaut du mouvement horizontal de l'arbre qui sert à l'approcher & à l'éloigner de la Touche, la Touche y suppléât en s'approchant ou s'éloignant elle-même du centre de la Rosette pour suivre les inégalités de son contour, il est aisé de voir que l'effet seroit absolument le même; puisqu'il importe peu que l'arbre s'approche de la Touche, ou que la Touche s'approche de l'arbre, pourvu que dans le cas de la Touche mobile, la pointe de l'outil ait le même mouvement que la Touche, & s'approche ou s'éloigne du centre de l'ouvrage à mesure que la Touche s'approchera ou s'éloignera du centre de la Rosette; & c'est précisément l'effet de la Machine dont voici la construction.

Un mouvement de Pendule à ressort caché par les platines * *AAA*, *BBBB*, & dont le rouage se voit marqué *Fig. 10.* fait lui seul toutes les opérations, après avoir préparé
dessus

* Planche *HL. Fig. 10.*

deffus les pieces convenables; *C** (*Fig. 1.*) est l'arbre du remontoir, *D* est l'encliquetage, *E F* est une détente qui retient le volant *G*. Cette détente levée, laisse le volant libre, & par conséquent le rouage qui tourne de toute la force dont le ressort est capable. L'arbre du pignon que le barillet fait mouvoir, est prolongé de part & d'autre au dehors des platines; l'extrémité *I* d'un côté (*Fig. 1.*) porte une piece platte *H* qui représente la Rosette du Tour qu'on suppose ici quarrée, & de l'autre côté (*Fig. 6.*) le tambour *I L*; l'un & l'autre étant fixes à cet arbre, sont nécessairement entraînés par les révolutions du pignon. La petite piece *M* (*Fig. 1.*) qui porte sur les bords de la Rosette, est ce qui tient ici lieu de la touche du Tour, la partie qui frotte est taillée en couteau. Cette touche qui tient à la piece *O N* se peut ôter quand l'on veut, pour substituer à sa place une autre touche platte que l'on fixe sur le quarré *K*, & dont on parlera dans la suite. La piece *O N* est attachée par deux vis sur une seconde piece pareille unie à deux montans *P Q*, *R S*, qui glissent librement dans les quatre tenons *Z*. Ces pieces & ces montans servent à contenir & à empêcher de balotter la touche *M* qui hausse & baisse alternativement suivant que la Rosette *H*, tournant sur son centre, présente ses angles ou ses pans; il est clair que les angles de la Rosette souleveront la touche *M*, en la repoussant en-haut avec la piece *O N* & les mon-

tans

* Planche I. Fig. 1,

tans * *P Q*, *R S*. Le tout tend à descendre non seulement par son propre poids, mais encore par le moyen d'un petit barillet *T* adapté sur la platine derrière la Rosette, & d'un fil roulé sur le barillet & attaché à la petite fiche *o*, en sorte que la touche porte toujours sur les bords de la Rosette dans toutes ses situations. A cette même piece *O N* est encore fixée une espece de broche ou tringle plate *V V* qui traverse le mouvement, & qui monte & descend avec la touche dans les deux rainures *L L** des deux platines. Cette tringle a son autre extrémité coudée & marquée par les lettres † *V X Y* (*Fig. vi.*). C'est à cette extrémité *Y* que l'on ajuste le crayon *a*, *b*, *c*, *d*, qui représente l'outil, & qui trace la figure sur le plan *I L*. Le crayon peut se placer dans differens points, à droite, à gauche, haut & bas, par le moyen des rainures faites dans le milieu des bras *a*, *b*, *f*, *c*, qui glissent l'une sur l'autre, & qu'on arrête fixement où l'on veut avec la vis *e*.

Fg est un crochet sous lequel est un ressort *r* qui repousse toujours le crochet en avant; ce crochet est mobile sur son point d'appui *f*, à-peu-près aux trois quarts de sa longueur; son autre bout caché derrière le tambour *I L* porte une dent qui traverse la platine, & arrête une roue qui tient à l'arbre du pignon pour le fixer quand il a fait une révolution entiere, sans quoi le même contour se répéteroit à chaque révolution du tambour, & le

* Planche I. Fig. 1.

† Planche II. Fig. 6.

le crayon repasseroit sans cesse sur le même trait. Lorsqu'on voudra faire agir la Machine, on observera de dégager la dent, en pesant sur le bout *g*, après qu'on aura détourné la détente *L* qui est à la platine opposée (*Fig. 1.*) & qui retient le volant *G*.

Le Tambour *IL* est mobile sur une plaque ronde *HK* fermement attachée sur la platine par deux vis, l'une en *p*, & l'autre du côté opposé vers *f*. Le bord de cette plaque représenté à part * (*Fig. VIII.*) & plus distinctement, est divisé en parties égales, en faisant répondre l'alidade *M* à chaque tour du tambour sur différentes divisions également distantes. Le même dessein se répète en se croisant sous tel angle qu'on veut, ce qui forme des traits entrelacés & symétriques qui peuvent faire un effet agréable à la vue.

La seconde Planche contient le développement des parties de la Machine.

† *ABC* (*Fig. VII.*) est le porte-crayon avec ses coulisses & sa douille *BC* dans laquelle entre la tringle ou broche plate *XXVV*, qui d'un côté tient la touche *M* qui lui est attachée par des vis *ON*, & de l'autre le crayon *A*. Elle porte aussi un bout de tringle quarrée *K* dont l'usage sera expliqué.

‡ *KH* (*Fig. VIII.*) est le cercle dont on a parlé, divisé & fixé sur la platine. C'est sur ce cercle que tourne le tambour *IL*, dans l'épaisseur duquel sont plusieurs cartons ou papiers sur lesquels la figure se trace. On en.

* *Fig. 1.*† Planche II. *Eig. 7.*‡ *Fig. 8.*

enleve ces papiers l'un après l'autre avec la pointe d'une épingle, chaque fois qu'on veut changer de dessein, ou répéter le même sur un autre papier. On taille tous ces papiers à la fois avec un emporte-pièce.

M est l'alidade mobile sur les divisions du cercle *KH*.

N est le canon qui tourne sur l'essieu du cercle mobile.

* *OP* (*Fig. ix.*) est un cercle de cuivre plein, coupé dans son milieu par deux rainures disposées à angle droit, & sur lequel est une petite pièce *QR* mobile au point *R*, qui s'ajuste le long des côtés des rainures *R, K, R, Z*, pour tirer des lignes qui se croisent à angle droit dans le centre du papier sur lequel on veut tracer une figure. Ces deux lignes, l'une verticale, l'autre horizontale, servent à prendre les dimensions pour placer le crayon dans les dispositions convenables; pour cet effet, on fait entrer la douille *bc*, adhérente au cercle de cuivre, à la place de la pareille pièce *BC* du porte-crayon, sur la pièce *TX* disposée pour la recevoir.

† *STV* (*Fig. xi.*) est un assemblage de trois pièces qu'on adapte sur le quarré *K* de la *Fig. i.* On fait entrer ce quarré dans l'ouverture *E*, dans laquelle on l'arrête par le moyen de la vis *O*.

Si l'on veut voir les effets de la touche plate *TS*, on détache le côté *SV* & l'arc *VT*, en lâchant l'écrou *T*, & on fait porter la plaque *TS* à plat sur les côtés de la Rosette;

te;

re; si on veut une touche platte inclinée, on remet en place l'assemblage TV , VS , au moyen de la vis T , & des deux pointes qui entrent dans les deux trous S , l'on incline plus ou moins VS sur TS , à l'aide de la vis T , mobile dans la rainure de l'arc VT .

On voit que les mouvemens de cette Machine sont absolument équivalens à ceux du Tour. L'arbre du Tour qui porte la Rosette & l'ouvrage, tourne sur lui-même, ce que fait dans la Machine l'essieu qui porte la plaque & le tambour. Toute la différence consiste en ce que dans le Tour l'arbre a un second mouvement parallèlement à lui-même, qui lui permet de s'approcher & de s'éloigner de l'outil & de la touche, l'un & l'autre fixes; au-lieu que dans la Machine, c'est la tringle, portant à ses deux bouts la touche & le crayon, qui se meut parallèlement à elle-même & à l'essieu qui représente l'arbre, & qui porte la plaque & le tambour. Il a été plus simple & plus commode, dans une machine d'Horlogerie, de laisser fixe le pivot qui porte les roues, & de transporter dans la tringle le mouvement de parallélisme: du reste il est clair que cela revient au même.

Il faut encore observer que le mouvement de parallélisme se fait d'ordinaire horizontalement sur le Tour, au-lieu qu'il a paru plus commode de l'exécuter verticalement dans la Machine: ce qui ne change rien à l'effet.

* On a fait faire (*Fig. VII.*) un coude en X à la tringle mobile pour faire approcher plus près

près du centre le bout *M* qui porte sur la Rosette, sans être obligé de rendre les Rosettes plus grandes. Ce coude n'empêche pas que la tringle ne se meuve parallèlement, & il n'apporte aucun changement essentiel à la construction de la Machine; il en résulte seulement une plus grande commodité en plusieurs cas.

On se servira indifferemment dans ce Mémoire du mot d'*outil* ou de *crayon*, puisque le crayon représente ici l'outil du Tour: par la même raison on entendra la même chose par l'*extrémité de la tringle mobile*, que par le terme de *touche*.

Le premier usage de cette Machine, & celui qui se présente d'abord, est de trouver par son moyen quelles sont les différentes figures qu'on peut faire tracer à l'outil avec la même Rosette, ce qui est très facile à exécuter, dès qu'on a en cuivre ou en fer un modèle de la Rosette qu'on veut essayer; car ayant placé & assujéti ce modèle, ou cette plaque de cuivre, comme nous avons dit, à une des extrémités *I* (*Fig. I.*) de l'arbre du grand pignon, le crayon ajusté à l'autre extrémité *a* (*Fig. VI.*) qui par le moyen des rainures *ae*, *fc*, peut se placer dans tous les points différens du papier, tracera dans toutes les différentes positions qu'il peut recevoir, tous les desseins possibles que peut fournir la Rosette donnée, & cela dans la dernière précision, si la Machine est bien faite.

On est surpris de l'extrême différence qui se trouve entre certaines figures produites
par:

par la même Rosette; peut-être aussi paroîtra-t-il singulier que ce soient d'ordinaire les Rosettes les plus simples qui donnent les figures les plus bizarres. Il est certain, du moins, que les Rosettes qui ont un grand nombre de côtés, ne produisent dans aucun cas des desseins aussi différens d'elles-mêmes, qu'une Rosette simplement triangulaire ou quarrée; & cela doit être ainsi.

Pour en rendre la raison plus sensible, & en même tems pour donner quelque idée de ce premier usage de la Machine, nous allons examiner ses effets dans quelques cas particuliers, résultans des différentes positions du crayon; & afin de rendre la chose plus simple, nous prendrons d'abord pour exemple la Rosette quarrée, telle que nous l'avons proposée dans la description de la Machine.

* Dans toutes les figures suivantes, on suppose les plans parallèles de la Rosette & du dessin projetés l'un sur l'autre; le centre de la Rosette & celui de la figure seront par conséquent le même point *C* (*Fig. 1.*); le trait ponctué marquera le contour de la Rosette, l'autre trait marquera le dessin qui résulte de cette position, *T* le point de la Rosette où porte la touche, & *O* le point du papier où le crayon répond au même instant.

Si on place le crayon *O* au-dessus du centre *C*, & à la même distance de l'axe que la touche *T*, c'est-à-dire, à l'endroit même où seroit l'autre bout de la tringle, si elle n'é-

toit

toit pas coudée, il est clair qu'il tracera alors une figure égale & semblable à la Rosette, puisque la tringle se meut parallèlement à elle-même, & qu'ainsi ses deux extrémités doivent faire le même chemin; par conséquent l'une des deux ne quittant jamais le contour de la Rosette, l'autre doit tracer sur le plan qu'elle rencontre une figure égale & semblable à la Rosette. Ici le dessein & le contour de la Rosette étant semblables, le trait plein & le trait ponctué se confondent en un seul.

Ainsi, par exemple, dans la position du crayon que nous venons d'examiner, une Rosette quarrée fera tracer au crayon un trait quarré de même grandeur. C'est-là ce cas unique & le plus simple de tous dont on a déjà parlé, où la figure tracée est toujours égale & semblable au contour de la Rosette; mais pour peu qu'on écarte le crayon de ce point, & qu'on le place ailleurs, la figure tracée ne fera plus un quarré, & chaque position du crayon causera de grandes variations dans la figure.

On peut distinguer toutes les diverses positions du crayon en deux especes différentes. L'une, lorsque le crayon est placé dans l'alignement de la rainure où glisse la tringle mobile, c'est-à-dire, lorsque la touche *T*, le centre *C* & le crayon *O* sont dans la même ligne, qui est posée verticalement dans la Machine. L'autre, lorsque le crayon *O* est hors de cet alignement. J'appelle les premières *positions directes*, & les dernières *positions obliques*. Commençons par la première espece.

Quoiqu'il y ait autant de positions directes du

du crayon qu'il y a de points dans l'alignement dont nous venons de parler, on peut cependant considérer sept positions qui renferment toutes les autres, & qui produisent les effets les plus differens. La premiere est celle dont le crayon copie exactement le contour de la Rosette; c'est celle dont nous venons de parler.

* Si on éloigne le crayon du centre en droite ligne au-delà du point où il étoit fixe dans la position précédente, mais toujours en-deçà du centre, il tracera une figure plus grande que la Rosette, dont les quatre côtés seront bombés ou légèrement cintrés dans leur milieu, la convexité en dehors de la figure. C'est l'effet de la seconde position.

† La troisieme est celle où le crayon sera plus près du centre que la touche, mais de telle sorte qu'en descendant à son plus bas, le crayon ne puisse qu'approcher du centre sans y atteindre. En ce cas la figure tracée sera, à la vérité, quadrangulaire, mais ses côtés seront des lignes concaves par dehors qui s'approcheront du centre dans leur milieu, plus le crayon sera posé près du centre, pourvu que ce soit toujours en-deçà, en sorte que la concavité deviendra un angle rentrant qui approchera à la fin de l'angle droit.

‡ Quatrieme position. Si le crayon est dans la même ligne au-delà du centre, mais à telle distance qu'en montant à son plus haut point, il ne puisse qu'approcher du centre sans pouvoir y atteindre, il tracera encore une

* Planche III. Fig. 2. † Pl. IV. Fig. 3. ‡ Fig. 4.

une figure quadrangulaire*, mais dont les angles seront rentrants, & les côtés, quatre arcs convexes par dehors, & dont la convexité sera d'autant plus grande, que le crayon aura été placé plus près du centre, mais toujours au-delà. Il faut remarquer que ce sont ici les angles de la Rosette qui font les angles rentrants de la figure, au-lieu que dans la précédente ils sont produits par le milieu des côtés de la Rosette.

Entre les deux positions précédentes du crayon, il y en a une moyenne, qui est de le placer sur le centre même du tambour; mais il peut y être placé dans trois cas différens, car comme les angles & les côtés de la Rosette font hauffer & baisser alternativement le crayon porté par la tringle, le centre peut être rencontré par le crayon, 1°. Quand le crayon est au point le plus bas où il puisse descendre, & c'est l'instant où la touche est sur le milieu du côté de la Rosette. 2°. Lorsque le crayon est au point le plus haut où il puisse monter, ce qui arrive lorsque la touche porte sur l'angle de la Rosette. Enfin, & c'est le troisieme cas, le crayon peut rencontrer le centre dans sa route, je veux dire en passant du point le plus haut où il monte, au plus bas où il descende, la touche portant entre l'angle & le milieu du côté. Ces trois positions donnent encore trois figures différentes.

* Dans le premier cas, les quatre côtés de la figure qui n'étoient que concaves, quand le

le crayon ne descendoit pas jusqu'au centre du dessein, se réunissent & se confondent par leurs milieux, en un seul point dans le centre; alors la figure tracée ressemblera à quatre feuilles oblongues disposées en sautoirs c'est l'effet de la cinquieme position directe du crayon.

* Dans le second cas, ce ne seront pas les milieux des côtés, mais les quatre angles rentrans de la *Figure 4*, qui se réuniront au centre dans un seul point; les quatre côtés seront parvenus à leur plus grande convexité, & la figure ressemblera à un trefle à quatre feuilles disposées en croix. Tel est l'effet de la sixieme position directe.

† Enfin, & c'est la dernière des sept positions directes, si le crayon ne rencontre le centre ni au plus haut point, ni au plus bas de la ligne droite qu'il parcourt, mais en passant de l'un à l'autre, comme alors il monte au dessus du centre, & qu'il descend au dessous, il rassemble les deux cas précédens; aussi décrit-il les deux figures précédentes qui se croisent, de telle sorte que les quatre feuilles oblongues en sautoir de la première se trouvent placées dans les intervalles des quatre feuilles en croix du trefle de la seconde, & que le crayon trace les deux sortes de feuilles alternativement une à une, jusqu'à ce que toute la figure composée des huit feuilles soit entièrement tracée.

Si le crayon fait plus de chemin au dessous du centre qu'au dessus, les feuilles du trefle
seront.

• Fig. 6.

† Fig. 7.

P 3

seront plus hautes que les feuilles oblongues; & s'il en fait plus au dessus qu'au dessous, les feuilles du trefle seront les plus petites.

Enfin, si le crayon rencontre le centre précisément à moitié chemin, les deux especes de feuilles seront de même hauteur; mais soit qu'il rencontre le centre à moitié chemin ou non, toutes les fois que la figure aura huit feuilles, les hauteurs des deux différentes feuilles, prises ensemble, seront égales à la hauteur que l'une ou l'autre feuille auroit eue séparément dans les deux positions précédentes où la figure n'avoit que quatre feuilles, au-lieu de huit.

Ce sont-là les principales positions du crayon qui renferment toutes celles que j'ai nommées directes, c'est-à-dire, toutes celles où le crayon est placé dans l'alignement de la rainure où glisse la tringle, soit en-deçà, soit au-delà du centre. Il nous reste à examiner les positions obliques du crayon, qui sont celles où il est hors de cet alignement, soit à droite, soit à gauche, en-deçà, en-de-là, ou au niveau du centre; mais pour désigner exactement ces situations du crayon, il est à propos de définir quelques termes.

Il est indifférent que la rainure où glisse la tringle mobile, ait une direction plutôt qu'une autre, il suffit que son alignement tende au centre; mais dans la Machine, telle qu'elle est construite, cette rainure est verticale; ainsi l'alignement de la rainure ou le diamètre vertical seront deux termes synonymes dans ce Mémoire; j'appellerai la ligne qui coupe à angles droits cette perpendiculaire, en

en passant par le centre du tambour, le *diamètre horizontal* ou le *niveau du centre*. C'est par rapport à ces deux lignes seulement que l'on peut désigner les positions obliques du crayon dans lesquelles le crayon ne se meut plus dans le diamètre vertical comme dans les positions directes, mais parallèlement au diamètre vertical, ce qui fait qu'il ne rencontre plus jamais le centre, mais seulement le niveau du centre; ou le diamètre horizontal.

La plupart des nouvelles figures que donnent les positions obliques du crayon, auront quelque rapport aux précédentes; mais elles auront une inflexion de côté ou d'autre, selon que le crayon sera à droite ou à gauche du diamètre vertical. Par exemple,

* Si le crayon est placé hors du diamètre vertical, en sorte qu'il ne puisse pas descendre jusqu'au diamètre horizontal, les côtés de la figure ne seront plus concaves dans le milieu des deux angles, comme *Figure 3*, mais leur concavité sera plus près de l'un des deux, suivant le différent côté où sera placé le crayon.

Si le crayon est fort près du centre, les quatre côtés de la figure ressembleront à des dents de rochet, & tout le reste étant égal, le biais sera d'autant plus sensible que le crayon sera plus écarté du diamètre vertical, & l'angle d'autant plus aigu que le crayon sera plus voisin du diamètre horizontal, ce qui est commun à toutes les figures obliques.

Les

Les trois contours de la *Figure 8* répondent aux différentes distances du crayon au centre, toujours dans ce même cas.

Cette figure est l'effet de la première position oblique du crayon, & répond à la troisième position directe. Les figures qui résultent des deux autres positions obliques qui répondent à la première & seconde position directe, ne diffèrent pas assez du trait extérieur de cette dernière figure pour en faire une particulière.

* Si le crayon est placé au-delà du centre hors de l'alignement de la rainure, mais de telle sorte qu'il ne puisse jamais remonter au niveau du centre, c'est-à-dire, dans les mêmes circonstances où il traçoit dans la position directe la figure régulière à quatre côtés convexes (*Fig. 4.*); la figure sera composée de quatre goderons d'autant plus inclinés que le crayon sera plus écarté du diamètre vertical, & d'autant plus sensibles qu'il sera plus près du diamètre horizontal. En approchant le crayon du centre, les goderons se fermeront, & deviendront des boucles.

Nous n'entrerons pas dans le même détail à l'égard des autres positions obliques; les figures où seront marquées dans chaque cas les positions respectives de la touche ou de l'outil, suffiront pour voir l'effet de chaque position.

† Les positions obliques (*Fig. 10. & 11.*) qui répondent à la cinquième & sixième position directe, sont peu différentes des deux pré-

* Planche V. *Fig. 9.*

† *Fig. 10. & 11.*

précédentes huit & neuf; elles ont seulement leurs angles & leurs goderons plus aigus & plus marqués, par la raison déjà alléguée, que dans celles-ci le crayon est plus près du diamètre horizontal, puisqu'il l'atteint dans l'une & dans l'autre.

* La cinquième & dernière position oblique est celle où le crayon fait une partie de son chemin au-dessus & l'autre au dessous du diamètre horizontal. Elle répond à la septième position directe. Au-lieu de la figure à huit feuilles de la première, celle-ci produit une figure à huit boucles, de hauteur égale, entrelacées deux à deux; qui forment quatre nœuds ou lacis, & fait ressembler la figure entière à cet ornement de blason qu'on nomme *cordelière*. On a remarqué dans la position directe, correspondante à celle-ci, que les deux espèces de feuilles dont elle est composée, n'étoient égales que lorsque le crayon faisoit également de chemin au-dessus & au-dessous du centre; cette analogie se conserve dans la position oblique correspondante, & la figure dont on vient de parler n'est tracée que lorsque le crayon fait également de chemin au-dessus & au-dessous du diamètre horizontal, autrement les proportions de la figure changent; & si le crayon fait plus de chemin au-dessus qu'au-dessous, on aura l'un des traits de la † *Figure 13*, selon que le crayon, à distance égale du diamètre horizontal, sera plus ou moins éloigné du diamètre vertical: si au contraire le crayon fait

* Planche V. Fig. 12.

† Fig. 12.

fait plus de chemin au-deffous qu'au-deffus de l'horizontal, l'on aura l'un des traits de la

* *Figure 14.*

Ces trois dernieres figures ne sont bien sensibles que lorsque le crayon est fort près du diametre vertical; plus on l'en éloigne, quoiqu'on conserve la même distance au diametre horizontal, plus les nœuds se rappetissent & se confondent avec le contour de la figure; en sorte qu'à une certaine distance du diametre vertical, par exemple, à la longueur du rayon de la Rosette, les trois dernieres positions du crayon, au-lieu de la figure précédente, en donnent une † que l'œil ne distingueroit pas du cercle, tant elle en differe peu sensiblement. Nous en verrons bien-tôt la raison.

Voilà quelles sont les principales figures que peut donner la Rosette quarrée; je dis les principales, parce que je n'ai parcouru que les positions du crayon les plus differentes entre elles, & qu'entre les deux plus voisines de celles dont on a parlé, il y en a autant que de points où on peut placer le crayon; mais celles qui viennent d'être détaillées suffisent pour donner une idée des autres qui sont toutes comprises dans quelques-uns des cas que nous avons examinés, en sorte que quelque figure qu'on prenne qui fasse l'effet d'une Rosette quarrée, elle sera semblable ou à peu près semblable à quelqu'une des précédentes, ou ne s'en éloignera que pour ressembler mieux à quelque autre de celles dont nous

* *Planche V. Fig. 14.*

† *Planche VI. Fig. 15.*

nous avons donné pareillement la description.

La diversité & la bizarrerie apparente de toutes ces figures n'est causée que par la différente combinaison des deux mouvemens, droit & circulaire, de la Machine, qu'il faut avoir bien présens pour en démêler les effets compliqués. Le crayon porté à l'extrémité de la tringle mobile n'a que son mouvement en ligne droite, & ce mouvement se fait, ou dans l'alignement de la rainure, c'est-à-dire, dans le diametre vertical, ou hors de cette ligne, mais parallelement à elle: dans l'un ou dans l'autre cas le crayon ne fait que hausser & baisser alternativement, selon que les angles de la Rosette soulevent la tringle qui porte le crayon, ou que le ressort repousse la tringle sur les pans ou dans les creux de la Rosette. Par exemple, dans le cas de la Rosette quarrée, le crayon qui s'élève chaque fois qu'un angle passe, & qui se baisse ensuite, monte quatre fois, & descend autant de fois alternativement pendant une révolution de la Rosette, en parcourant à chaque fois un chemin égal en ligne droite; & comme les deux extrémités de cette ligne sont l'une le plus haut point, & l'autre le plus bas où descende le crayon, & qu'il n'est à son plus haut point que lorsque la touche porte sur l'angle, & à son plus bas que lorsque la touche porte sur le milieu du côté, il s'ensuit que la mesure de cette ligne est la difference du plus grand au plus petit rayon de la Rosette, c'est-à-dire, si elle est quarrée, l'excès de la demi-diagonale sur la demi-hau-

teur. Si le tambour étoit immobile, le crayon allant & revenant sur ses pas, ne traceroit jamais que cette petite ligne droite : si le crayon au contraire étoit immobile, & que le tambour seulement se mût sur son centre, le crayon ne traceroit jamais qu'un cercle ; mais comme, pendant que le crayon se meut, le tambour tourne, il s'ensuit que le crayon montant ou descendant en ligne droite, trace sur le tambour, mù circulairement, une ligne ordinairement courbe, composée de ces deux mouvemens ; & c'est cette courbe répétée autant de fois que la Rosette a de côtés, qui compose la figure tracée. Je dis une ligne ordinairement courbe, & on verra la raison de cette restriction.

Il est aisé d'appliquer à cette mécanique le principe ordinaire qui sert à expliquer les mouvemens composés, en examinant quelles sont à chaque instant les deux déterminations que reçoit le crayon ; car quoiqu'il n'ait réellement de mouvement que celui qu'il reçoit de la tringle en ligne droite, le mouvement circulaire du tambour fait, eu égard à la ligne tracée, le même effet que si le crayon, outre son mouvement direct, étoit lui-même emporté circulairement autour du tambour du sens opposé à celui dont le tambour se meut. Dans ce cas on conçoit qu'à chaque instant le crayon recevrait deux déterminations : l'une, suivant une portion infiniment petite de la circonférence du cercle où il se trouve alors, & qu'il décrirait si son mouvement en ligne droite étoit suspendu ; & ce petit côté peut être considéré comme une ligne.

gne droite : l'autre, suivant une partie infiniment petite de la ligne droite, suivant laquelle il monte ou il descend. Il décrirait donc à chaque instant, pour satisfaire en même tems à ces deux impressions, la diagonale d'un petit parallélogramme dont ces deux petites lignes seroient les côtés ; mais les côtés infiniment petits d'un cercle changent à chaque instant de direction. Donc quoique les petites portions de la ligne droite, le long de laquelle le crayon monte & descend, aient la même direction, les diagonales résultantes de chacune d'elles, & de chaque petit côté correspondant du cercle, ne doivent pas moins changer de direction à chaque instant ; & par conséquent leur somme doit composer une courbe, à moins que la combinaison des deux mouvemens, droit & circulaire, ne soit telle que les côtés des parallélogrammes composés des portions infiniment petites de la ligne droite parcourue par le crayon, & des portions infiniment petites de la circonférence où il passe successivement, ne suivent entre eux une même proportion d'accroissement ou de diminution, auquel cas toutes ces petites diagonales bout à bout l'une de l'autre, composeront une ligne droite. C'est ce qui arrive dans la position unique qui fait copier exactement au crayon le contour de la Rosette, & par conséquent décrire des lignes droites quand la Rosette est à pans droits ; d'où il résulte un paradoxe assez singulier, qui est qu'un corps mù en ligne droite, & dont la trace sur un plan immobile seroit nécessairement une ligne droite, peut, sans changer de vitesse

tesse ni de direction, tracer aussi une droite sur un plan mù circulairement.

Un peu de méditation sur la position respective du crayon & de la touche, & sur la combinaison des deux mouvemens, droit & circulaire, relativement à cette position, éclaircira toutes les difficultés qui peuvent se présenter à l'inspection des figures, & de leur extrême différence d'avec les Rosettes. Et il n'y aura aucun point de la courbe ou de la figure tracée, qu'on ne puisse assigner, en considérant quelle portion de son cercle le tambour a décrite pendant que le crayon est monté ou descendu en ligne droite d'une certaine quantité.

Nous n'entrons pas dans le détail, qui seroit infini; nous nous contenterons d'indiquer une cause générale, qui peut servir à rendre raison de ce qu'on a pu remarquer de plus bizarre & de plus singulier dans les figures que nous avons examinées.

Soit que le crayon soit près ou loin du centre, le tambour achève toujours sa révolution dans le même tems: par conséquent le grand cercle que traceroit le crayon, s'il étoit placé loin du centre, & que la machine n'eût que le mouvement circulaire, s'acheveroit dans le même tems que le petit cercle que traceroit le crayon dans la même supposition, s'il étoit plus près du centre; & cela, quelque différence qu'il puisse y avoir de grandeur entre les rayons de ces deux cercles.

D'un autre côté, la ligne droite que parcourt le crayon, soit en montant, soit en descendant, ne change point par la distance
du

du crayon au centre ; la courbe tracée est donc le résultat de deux mouvemens, dont l'un, s'il étoit seul, feroit parcourir au crayon une ligne droite, d'une grandeur constante, & l'autre pendant le même tems, s'il étoit seul aussi, un arc de cercle toujours du même nombre de degrés à la vérité, mais dont la longueur seroit tantôt plus grande, tantôt plus petite, selon la distance du crayon au centre. On voit bien que la figure de la courbe qui sera tracée dans chacune de ces deux différentes combinaisons, doit être fort différente.

En effet ; quand le crayon est loin du centre, la longueur de l'arc que le mouvement circulaire seul feroit décrire au carton, l'emporte de beaucoup sur la longueur de la petite ligne droite qu'il décrit par son mouvement propre ; le mouvement circulaire domine alors sur le mouvement direct, & la courbe décrite approche bien plus d'un arc de cercle. Au contraire quand le crayon est fort voisin du centre, la petite ligne droite que son mouvement lui faisoit décrire en montant ou en descendant, toute courte qu'elle est, devient plus longue que l'arc de celle que le seul mouvement circulaire du carton lui feroit tracer ; le mouvement direct l'emporte alors sur le mouvement circulaire, & la courbe décrite est d'autant plus différente d'un arc de cercle.

Or la figure tracée par le crayon n'est, comme on l'a dit, autre chose que la même courbe répétée autant de fois que la Rosette a de côtés ; par conséquent plus la ligne droite
que

que parcourt le crayon par son mouvement propre sera petite par comparaison à l'arc de cercle que le carton parcourt dans le même tems, plus la figure tracée ou la portion correspondante de la figure tracée approchera du cercle.

Qu'on applique ce raisonnement aux divers cas qu'on a précédemment examinés, on reconnoitra clairement que ce qu'on a pu remarquer de bizarre & de singulier dans les effets d'une même Rosette, en est une conséquence nécessaire. Par exemple, que c'est ce qui fait qu'en général les positions du crayon voisines du centre, donnent les plus grandes variétés; & que passé une certaine distance du centre, un peu plus ou un peu moins d'éloignement ne change pas beaucoup la figure. On ne fera d'application particulière de ce principe qu'au cas de la *Figure 15*, où l'on a vu que le crayon guidé par une Rosette quarrée traçoit un cercle, ou plutôt une figure qui ne diffère pas sensiblement du cercle.

La première fois que je rencontrai cette figure, j'avois placé mon crayon au hazard: j'avoue que sur le rapport de mes yeux, je ne doutai pas dans le premier moment que la figure tracée ne fût un cercle, & je ne voyois aucun inconvénient à le supposer. A la vérité, il me paroissoit singulier qu'une Rosette quarrée pût faire décrire à l'outil une figure circulaire, mais je n'en voyois pas encore l'impossibilité.

Cependant la conséquence devenoit délicate: je connoissois en général la nature & les

les propriétés de la courbe du Tour qui, dans le cas présent, me paroissoit à la vue un cercle, & je savois que cette courbe étoit quarrable toutes les fois que l'on pouvoit quarrer sa base *, qui dans cet exemple étoit une ligne droite; donc si la courbe étoit réellement un cercle, on avoit sa quadrature. Cette conséquence très évidente me fit défier de mes yeux, & un peu de réflexion sur les deux mouvemens qui produisent cette courbe, m'eut bientôt convaincu qu'elle n'étoit rien moins qu'un cercle.

En effet, un cercle & une ligne droite, & même plusieurs cercles & une ligne droite, de quelque façon que le tout soit combiné, ne peuvent jamais produire un cercle. Si le crayon étoit immobile, nous l'avons déjà remarqué, il décriroit un cercle sur le carton tournant; mais dès-là que le crayon a un mouvement propre quel qu'il puisse être, à moins que ce ne fût un mouvement circulaire qui lui fît décrire la même circonférence qu'il traceroit par le seul mouvement du carton, il est clair que la courbe tracée ne peut être un cercle.

Mais cette courbe peut s'éloigner ou s'approcher plus ou moins de la figure circulaire, selon la position & la mesure de la ligne droite que parcourt le crayon par son mouvement propre en montant & descendant alternativement.

Premièrement, la position de cette ligne contribue beaucoup au plus ou au moins de ressem-

* Voy. le second Mémoire sur le Tour.

resemblance que la figure tracée aura avec le cercle ; car si le crayon est placé de sorte que cette droite coupe la circonférence du cercle que le crayon supposé immobile décrivait sur le carton tournant , on conçoit que la figure tracée doit être beaucoup plus éloignée de la circulaire que si la ligne droite , au-lieu de couper ce cercle , lui étoit seulement tangente. En effet la tangente s'éloigne moins du contour du cercle que toutes les sécantes possibles , & de toutes les sécantes , c'est la sécante perpendiculaire ou le rayon qui est le moins propre à se confondre avec la circonférence. Enfin il n'est pas moins clair que plus un cercle est grand , moindre est sa courbure , & par conséquent plus sa tangente approche de sa circonférence.

C'est en réunissant ces circonstances , qu'on peut donner au crayon la situation la plus avantageuse , pour que la figure tracée approche du cercle le plus qu'il est possible ; & ce sont celles que nous avons observées , en plaçant le crayon où nous avons dit , pour lui faire décrire une figure sensiblement ronde avec une Rosette quarrée.

Secondement , plus cette ligne droite sera petite , moins elle altérera la figure circulaire que traceroit le crayon , s'il étoit immobile ; & comme elle devient plus courte à mesure que le nombre des côtés du polygone croît , il est clair que dans la situation du crayon où le quarré même donne une figure qui sensiblement ne diffère pas du cercle , tous les autres polygones , hors le triangle , donneront une figure plus approchante du cercle
que

que le quarré, & d'autant plus qu'ils auront plus de côtés. Mais non-seulement la ligne droite en question, qui n'est que la difference du plus grand au plus petit rayon de la Rosette, devient plus courte à mesure que le nombre des côtés du polygone croît; j'ajoute qu'elle décroît dans une plus grande raison que les arcs dont les côtés du polygone sont les cordes; la demonstration en est fort simple.

La difference * CD du grand rayon AO au petit rayon OG d'un polygone, est ce qu'on appelle la *Fleche*: je dis que les fleches croissent ou décroissent dans une plus grande raison que leurs arcs. La fleche CD de l'arc entier AD est, comme on fait, le sinus versé de la moitié AD ou BD .

Soit l'arc † MN variable, double de AM . Soit AP la fleche de l'arc MN , & le sinus versé de l'arc AM ; soient supposés égaux les accroissemens différentiels Pp , $p\pi$ de AP . Je les nomme dx . On fait que les accroissemens MR ou mr , dy des ordonnées qui répondent à chaque dx , vont en diminuant dans toutes les courbes concaves vers leur axe; donc les arcs infiniment petits μm , mM ou ds , qui sont les hypothénuses des petits triangles différentiels, vont pareillement en diminuant; donc la somme de ces hypothénuses, c'est-à-dire, le demi-arc AM augmente par des differences décroissantes, tandis que la fleche AP s'accroît uniformément; dont la fleche croît en plus grande raison que les arcs.

II

Il ne paroîtra donc plus étonnant que les Rosettes les plus simples donnent quelquefois les figures les plus bizarres & les plus différentes de la Rosette qui les produit; j'entends par les Rosettes les plus simples, celles qui ont le moins de côtés, comme le triangle ou le quarré. On voit par ce que nous venons de dire, que leurs fleches étant plus grandes à proportion que dans les autres polygones, & par conséquent le crayon pouvant s'approcher & s'éloigner plus du centre, pendant une portion égale de la révolution du tambour, la figure tracée doit avoir ses angles ou ses goderons plus saillans ou plus rentrans que les figures tracées par le secours d'autres Rosettes; & qu'en général, par la même raison, il doit s'y faire des combinaisons plus variées des deux mouvemens, circulaire & direct, d'où on a fait voir que dépend la diversité des figures.

Il paroît d'abord extraordinaire que ces effets singuliers de Rosettes aussi simples que le triangle & le quarré, aient jusqu'ici échappé aux Tourneurs: mais l'observation précédente, dont il suit que les figures produites par les autres polygones sont plus semblables à leurs Rosettes que celles qui ont pour Rosettes le triangle & le quarré, indique assez la raison qui a empêché jusqu'ici les Tourneurs d'exécuter sur le Tour, les contours singuliers dont nous avons parlé, & plusieurs autres de la même espece, quoique les Rosettes qui les donnent ne soient pas fort recherchées.

Les Rosettes les plus commodes dans la
prati-

pratique, sont celles qui ont un plus grand nombre de côtés; les angles en sont plus obtus, & la Rosette en glisse plus aisément sur la touche, au-lieu que des angles fort aigus causeroient des sauts à l'arbre *. A la vérité, il n'est pas impossible de remédier à cet inconvénient; mais il étoit encore plus court de n'y pas tomber. C'est pour cette raison que les Rosettes qu'on employe dans l'usage ordinaire, n'ont gueres moins de huit côtés, sur-tout quand les côtés sont droits; & c'est encore pour cela que le plus souvent elles en ont un bien plus grand nombre, & plutôt à goderons qu'à pans droits: telles sont celles dont le P. Plumier donne des modeles dans son Livre. Les figures qui ont paru les plus singulieres parmi celles que nous avons remarquées, sont produites par les Rosettes qui ont un petit nombre de côtés, trois ou quatre, par exemple. Il n'est donc pas étonnant que les Ouvriers, qui ne raffinent ordinairement que sur les commodités de pratique, trouvant les Rosettes qui ont le plus de pans ou de goderons les plus commodes, ne se soient pas obstinés gratuitement à en essayer de celles qu'ils favoient être sujettes à quelques inconvéniens, & dont ils ignoroient les avantages.

Il y a apparence que c'est encore par la même cause qu'ils ont peu varié la situation de l'outil, & qu'ils ne sont pas dans l'usage de le poser hors de l'alignement de la touche & du centre qui répond dans la Machine au
dia-

* V. les Mém. de l'Académie, an. 1719. p. 423. 424.

diametre vertical du tambour. Nous avons vu que quand la Rosette est quarrée, les positions obliques du crayon & de l'outil opéreroient, dans les differens cas, ces goderons obliques, ces dents de ratchet & ces boucles entrelacées ou nœuds dont on parle; mais on a remarqué aussi que quand la Rosette a un plus grand nombre de côtés, toutes les figures précédentes résultantes des différentes positions obliques du crayon, devenoient beaucoup moins sensibles. En effet, il ne reste alors à chaque inflexion de la figure qui répond à chaque pan de la Rosette, qu'un biais moins singulier que choquant à la vue, qui loin de donner aucune grace, causeroit plutôt une difformité à l'ouvrage. Si la Rosette est mêlée de pans droits & de goderons, la figure n'en fera que plus irrégulière par ce mélange de differens biais qui s'y trouveront. On va donner le moyen de tirer parti de toutes ces difformités apparentes, & de rendre les figures où elles se rencontrent, régulières & symétriques: mais il ne faut pas s'étonner si le premier coup d'œil ayant fait appercevoir aux Tourneurs un biais dans la figure, quand, par hazard, ils ont placé leurs outils hors de l'alignement du centre & de la touche, ils ont évité avec soin toutes les positions obliques.

Le moyen de sauver toutes ces irrégularités, & même de les tourner en agrément, c'est, après qu'on a tracé le premier contour avec tous les biais qui en résultent, de placer l'outil de l'autre côté, à pareille distance & du diametre vertical & de l'horizontal: on tra

tracera alors un pareil dessein avec des inflexions en sens contraire qui croiseront les premiers, & déguiseront la figure en la rendant régulière, sans lui faire perdre rien de sa singularité. C'est ainsi que du trait intérieur & redoublé de la *Fig. 11^{me}*. irrégulière, on peut faire la *Fig. 18*.

Pour faire une figure chargée d'ouvrages & d'ornemens avec un trait fort simple, il n'y a qu'à la répéter sur elle-même, en la faisant se croiser deux, trois ou quatre fois, selon le dessein, sous des angles égaux, ce qui se peut exécuter aisément par le moyen du cercle gradué, en faisant répondre l'albidade * *M* (*Fig. 8.*) à chaque révolution du tambour qui répète le dessein à autant de points différens de la circonférence également distans les uns des autres. De cette manière, avec la *Figure 4* répétée quatre fois, en faisant répondre l'albidale à chaque révolution successive aux points 1, 2, 3, 4, distans l'un de l'autre d'un seizième de la circonférence, on aura la *Figure 19*.

Une autre manière d'orner la figure, de la déguiser, & d'en multiplier les traits, sans qu'il soit besoin de la répéter, c'est de se servir d'un outil à plusieurs pointes ou dents en forme de peigne; autant l'outil aura de dents, autant tracera-t-il de traits différens. Ces traits seront quelquefois écartés l'un de l'autre, & quelquefois ils se réuniront en un seul. Souvent il ne sera pas besoin, même dans les positions obliques,

* Planche II, *Fig. 8.*

de répéter la figure en sens contraire. Le bais qui se trouve dans ces traits entrelacés, n'en a quelquefois que plus de grace & de singularité. Au reste, tout ceci n'est pas de pure théorie, comme on le pourroit croire; toutes ces figures ont été exécutées, non seulement sur la Machine qu'on vient de décrire, mais sur le Tour même de M. Grammaire *, & la plupart ont été admirées des connoisseurs en ouvrages du Tour à qui on les présentoit comme des Problèmes en ce genre, ce qui a donné lieu aux recherches qui font l'objet de ce Mémoire.

Jusqu'ici nous avons supposé la Rosette quarrée, & cette seule Rosette a produit toutes les figures que nous avons parcourues, sans toutes les figures intermédiaires dont nous n'avons point parlé. On peut juger par le quarré, de l'effet des autres polygones pris pour Rosettes, avec les restrictions convenables. Mais la Rosette n'est pas bornée aux simples polygones, elle peut être composée de lignes courbes aussi-bien que de lignes droites, ou des unes & des autres à la fois, enfin de telle figure qu'on veut; & l'on voit bien que chacune en particulier pourra servir à tracer un grand nombre de desseins différens.

Le quarré & les autres polygones n'étant composés que de lignes droites, sont peu propres à donner une idée de l'effet d'une
 • Ro-

* Il est mort en 1731. M. le Duc est en possession de la Machine dont on a parlé, du Tour de M. Grammaire, & de toutes ses inventions.

Rosette dont les côtés feroient des lignes courbes; c'est pourquoi, avant que de passer au second usage de la Machine, nous allons, pour servir d'exemple aux autres cas des Rosettes courbes, parcourir seulement les effets de l'Ovale ou de l'Ellipse prise pour Rosette, & ceux du cercle pris aussi pour Rosette, quand il est excentrique, je veux dire quand le Cercle-rosette tourne sur un autre point que sur son centre; car s'il tournoit sur son centre, il est clair que le crayon, quelle que fût sa position, ne traceroit jamais que des Cercles.

Nous suivrons le même ordre en parcourant les positions du crayon, que nous avons suivi en examinant les effets de la Rosette quarrée; mais nous n'entrerons pas dans un si grand détail.

Supposons d'abord la Rosette de figure elliptique, & commençons par les cas où le crayon est dans le diametre vertical, que nous supposerons répondre au grand axe de l'Ellipse.

Le Crayon, dans la premiere des positions directes, c'est-à-dire, posé à même distance du centre que la touche, & du même côté du centre, tracera un contour égal & semblable à celui de la Rosette. Comme en pareil cas la Rosette quarrée donnoit un quarré égal à elle-même dans cette position, quelle que soit la Rosette, la * figure tracée lui est entierement semblable, par les raisons que nous avons dites.

Dans

Dans la seconde position directe, c'est-à-dire, si on éloigne du centre le crayon, en sorte qu'il en soit plus loin que la touche & du même côté, l'Ellipse, ou plutôt la Courbe tracée sera plus grande que l'Ellipse de la Rosette *, mais moins allongée à proportion, & plus renflée vers son petit diamètre.

† Si, au contraire, on rapproche le crayon du centre en ligne droite, en sorte qu'il soit plus près du centre que la touche, pourvu qu'il ne puisse pas descendre jusqu'au centre, ce qui est la troisième position directe du crayon; la figure tracée sera plus petite que la Rosette, & plus étroite à proportion de sa longueur. Si on continue d'approcher le crayon du centre, la figure se retrécira par ses deux flancs, & formera deux angles rentrants aux deux extrémités du petit diamètre; elle ressemblera alors ‡ à un corps de violon long & étroit, ou à un 8 de chiffre qui ne seroit pas achevé de fermer dans son milieu; & plus le crayon sera près du centre sans pouvoir y atteindre, plus la figure approchera d'un 8 de chiffre, jusqu'à ce qu'elle lui soit entièrement semblable, ce qui arrivera dans la quatrième position, lorsque le crayon *O*, à force d'être approché du centre, l'atteindra en descendant à son plus bas point *o*, ‡ c'est-à-dire, au moment que la touche qui portoit sur le grand diamètre en *T*, portera sur le petit en *t*.

Dans les deux situations du crayon opposées

* Planche VI. Fig. 21. † Pl. VII. Fig. 22.

‡ Fig. 23. ‡ Fig. 24.

sées aux deux précédentes qui formeront la cinquieme & sixieme position directe ; je veux dire. quand le crayon est placé au delà du centre, & toujours dans le diametre vertical, sans jamais monter assez haut pour atteindre le centre, & lorsque le crayon placé pareillement au-delà du centre, ne l'atteint précisément que lorsqu'il est monté à son plus haut point, la touche portant sur le plus grand diametre de la Rosette ; les * deux figures differentes entre elles seront assez semblables chacune à l'une des deux précédentes, avec cette seule difference que celles-ci seront plus larges & plus courtes, & les autres plus étroites & plus allongées, & que l'axe de celles-ci couperoit à angle droit celui des autres, ce qui provient de ce que la touche porte sur le petit diametre dans le dernier cas, dans le moment où elle porte sur le grand dans le premier.

Enfin, & ce sera la septieme & derniere des positions directes, si le crayon rencontre le centre † entre le point le plus haut où il monte, & le plus bas où il descend, soit au milieu de la route ou non, il rassemblera les deux cas differens où il auroit tracé les deux 8 de chiffre, l'un plus étroit, l'autre plus large, & il les tracera effectivement tous deux chacun dans sa position, de telle sorte qu'ils se croiseront à angle droit, ce qui formera une espece de tresse à quatre feuilles, dont deux seront differentes des deux autres, savoir deux plus étroites qui seront dans la direction verticale, & deux plus larges dans l'horizontale.

Q 2

II

* Planché VII, Fig. 25. & Fig. 26. † Fig. 27.

Il faut remarquer qu'ici, comme dans la figure à huit feuilles du quarré, les deux 8 qui composent la présente figure seront égaux en hauteur, quoique non en largeur, si le crayon fait autant de chemin au-dessous du centre qu'au-dessus, sinon ils seront inégaux aussi en hauteur; mais de façon ou d'autre, les deux 8 pris ensemble n'auront que la même hauteur qu'un seul auroit eu dans les cas précédens où il n'y en avoit qu'un.

Il n'y a que trois situations obliques du crayon qui méritent attention, quand la Rosette est elliptique: quand il est au-dessus du diametre horizontal, & qu'il ne l'atteint point à son plus bas, ou lorsqu'il ne fait que l'atteindre sans passer outre, la touche portant sur le petit diametre, car les deux figures dans ces deux cas sont à-peu-près semblables. La seconde, quand le crayon est plus bas que le diametre horizontal, & qu'il ne remonte pas jusqu'au niveau du centre, ou du moins qu'il ne passe pas ce niveau; qu'il atteint seulement quand la touche est sur le grand diametre, car les résultats sont aussi à-peu-près les mêmes; & la troisieme, lorsque le diametre horizontal partage en deux parties le chemin que le crayon fait verticalement.

* Dans la premiere de ces trois positions obliques, la figure est fort irréguliere, elle approche de celle d'un concombre ou d'un citron, dont les deux bouts seroient inclinés en sens contraires. Cette ressemblance, surtout la derniere, est d'autant plus marquée que le crayon est plus voisin du centre.

Dans

* Dans la seconde position oblique, la figure ressemble à ces osselets d'ivoire avec quoi jouent les enfans, ou à un double bec de corbin dont les deux bouts seroient fort recourbés en sens contraires.

† Dans la troisieme position oblique, la figure ressemble assez à la précédente, avec cette difference qu'elle a toujours des boucles, ce qui ne manque pas d'arriver, quelle que soit la Rosette, dès que le crayon placé hors du diametre vertical monte au-dessus & descend au-dessous du niveau du centre. Ces boucles sont plus ou moins hautes, selon le plus ou le moins de chemin que fait le crayon dessus ou dessous le diametre horizontal, ainsi qu'on l'a remarqué en examinant les effets de la Rosette quarrée.

Il n'est pas besoin de remarquer qu'on peut, dans la position précédente, tracer une figure fort approchante du Cercle, sur-tout si le crayon fait précisément autant de chemin au-dessus du diametre horizontal qu'au-dessous. Avec la Rosette quarrée nous avons dans le même cas tracé une pareille figure, & nous avons observé, qu'au triangle près, le quarré de tous les polygones réguliers y étoit le moins propre. L'Ellipse n'ayant point d'angles, y conviendra mieux pour cet effet que le quarré, à moins que la difference de ses deux diametres ne fût plus grande que celle du demi-côté du quarré à sa demi-diagonale.

Le Cercle excentrique ou tournant sur un autre point que son centre étant pris pour la
Ro-

* Planche VIII. Fig. 30.

† Fig. 31.

Rosette, les figures qu'il produit méritent quelque attention, quoique moins variées que celles qui sont produites par l'Ellipse. Premièrement, si le point *R*, sur lequel on fait tourner le Cercle, & que nous nommerons *centre de rotation*, est fort près du centre *C*, la diversité des figures doit être fort peu sensible. En second lieu, si le centre de rotation est à une distance suffisante du centre du Cercle, il n'y a que deux ou trois cas où la figure qui en résulte ait quelque singularité remarquable.

On indiquera les diverses positions pour le moment où la touche est le plus près du centre de rotation, comme on a fait dans l'examen des effets du quarré pris pour Rosette. Le diametre vertical sera celui qui passera par le point *T*, où porte la touche & le centre de rotation *R*. Pour éviter les répétitions, on désignera ici les diverses positions du crayon par leurs correspondantes dans le cas de la Rosette quarrée.

La premiere position directe donne, comme on fait, dans tous les cas possibles, une figure égale & semblable au contour de la Rosette.

La 2^{de}, la 3^{me} & la 4^{me} position directe donneront ici des figures très peu différentes du Cercle. Celle qui résulte de la 3^{me} position, est celle qui s'en éloigne le moins. Son diametre vertical est plus long que l'horizontal, au contraire des deux autres, dont la dernière a ses diametres encore plus inégaux.

* La 5^{me} & la 6^{me} position directe donnent

ont une figure qui ressemble à la coupe d'une cerise. L'axe vertical de l'une & de l'autre figure sera égal à la distance entre la touche & le crayon, qu'on a supposée ici égale au tiers du diamètre du Cercle-rosette. La seule différence des deux figures est que celle de la 6^{me} position est plus large que l'autre.

* La 7^{me} position, où le crayon monte ou descend au-dessus & au-dessous du niveau du centre de rotation ou du diamètre horizontal, est composée des deux figures précédentes, raccourcies & renfermées l'une dans l'autre; elles sont de hauteur égale, & cette hauteur est moitié de celle de chacune des deux figures précédentes, quand OR est moitié de OT , ou quand le crayon fait autant de chemin au-dessus qu'au-dessous de l'horizontal: plus le chemin du crayon au-dessus & au-dessous de cette ligne est inégal, plus le contour extérieur croît, tandis que l'intérieur décroît, en sorte qu'il devient un anneau † qui étoit réduit à un point dans les deux figures précédentes; mais de façon ou d'autre, la somme des deux hauteurs est toujours la même.

Les positions obliques du crayon ne causent ici qu'un biais à la figure, & ne fournissent rien de remarquable.

Les exemples précédens des effets de l'ellipse & du cercle excentrique, pris pour Rosette, suffisent pour donner une idée de ce que peuvent produire les différentes Rosettes courbes, comme le quarré a pu faire juger de l'effet des autres polygones à pans droits pris pour Rosettes. Ainsi, quelle que soit

Q 4

main-

maintenant la Rosette proposée, en considérant la situation respective de la touche & de l'outil ou du crayon, & se rappelant ce qui a été observé, on pourra juger de ses effets, à quelque chose près, & l'épreuve qu'on en fera sur la Machine, déterminera avec précision ce que l'on en doit attendre sur le Tour.

Les différentes situations de l'outil, qui causent tant de diversités dans les figures produites par la même Rosette, le changement même des Rosettes qui n'a point de bornes, ne sont pas encore les seules sources de variété dans les desseins.

La touche que nous avons jusqu'ici supposé ne porter sur la Rosette qu'en un point, peut par ses changemens de figure, en causer de grands dans l'ouvrage; on peut supposer par exemple, que la touche est plate, & qu'elle s'applique dans toute sa longueur sur les pans de la Rosette; on la peut supposer concave ou convexe, on peut l'incliner en sorte qu'elle se présente obliquement à la rencontre de la Rosette, en ne faisant pas un angle droit avec le rayon vertical: tous ces changemens doivent en causer dans la figure, & nous ne pouvons nous dispenser d'en toucher quelque chose.

Il est ordinaire aux Tourneurs Allemands, de se servir de touche plate: elles sont peu d'usage, & presque inconnues en France aux Ouvriers. Le P. Plumier, dans son Livre, en a donné plusieurs desseins. On s'attend peut-être que cette forme différente de la touche doit causer un grand changement dans les figures,

gures, & il est vrai que dans les mêmes positions du crayon, l'effet de la touche plate est fort différent de celui de la touche pointue; cependant quand la Rosette est telle, que tous les points de la touche plate peuvent rencontrer tous les points de la Rosette, ce qui arrive quand celle-ci est à pans droits, il importe peu qu'on se serve d'une touche plate ou d'une touche pointue, puisqu'avec l'une ou l'autre, l'effet sera sensiblement le même, en observant seulement dans l'un des deux cas, de placer l'outil du côté opposé à celui où on le placeroit dans l'autre: en sorte que se servir de l'une de ces deux touches, au-lieu de l'autre, c'est-à-peu-près la même chose que si, sans changer de touche, on changeoit l'outil de place, en le portant de l'autre côté du centre de la Rosette.

Dans les effets de la Rosette quarrée, par exemple, on a pu remarquer que les figures à angles saillans se traçoient quand le crayon étoit du même côté que la touche & en-deçà du centre, & les goderons quand le crayon étoit du côté opposé à la touche & au-delà du centre. Avec la touche plate, au contraire, les goderons se forment en plaçant l'outil en-deçà du centre, & les angles saillans en le plaçant au-delà.

Avec la touche pointue, ce sont les angles de la Rosette qui font les angles saillans ou rentrans de la figure, & ce sont les pans qui en font les côtés, soit convexes, soit concaves. Avec la touche plate, au contraire, les angles de la Rosette, en passant sous la touche, font tracer au crayon les arcs con-

vexes ou concaves de la figure, & les angles se tracent quand la touche est appliquée sur un des côtés de la Rosette.

Cette difference vient de ce qu'en se servant de l'une des deux touches, le mouvement circulaire domine sur le mouvement direct, précisément dans le tems où le mouvement direct l'emporteroit sur le circulaire, si l'on avoit employé l'autre touche, & réciproquement. Par exemple, dans le cas de la touche pointue, c'est lorsque l'angle de la Rosette passe sous la touche, que le mouvement direct est le plus rapide, & c'est tout le contraire dans le cas de la touche plate. Pour s'en convaincre, soit supposée d'une part la touche pointue portant sur le milieu du côté * Ko de la Rosette au point T ; & dans la même figure, pour mieux comparer les effets des deux touches, soit supposée encore la touche plate AB , appliquée dans le même moment à plat sur le côté Ko ; faisons maintenant tourner la Rosette sur son centre de B vers A .

Quand le point o , angle de la Rosette, aura décrit l'arc $o3$, la touche aiguë qui portoit sur le point T de la Rosette aura glissé, en montant, le long du côté To , & sera parvenue au point 3. Si on s'est servi de la touche plate AB , elle sera alors en $a'b'$: par conséquent dans l'un & dans l'autre cas le crayon placé dans un point quelconque I de la figure, & se mouvant ou dans la verticale TC , ou parallèlement à TC , sera monté dans le même

même tems d'une quantité égale à T_3 , chemin de la touche, qu'on peut prendre indifféremment pour le chemin du crayon qui lui est égal. Mais pour reconnoître dans quelle différente proportion ce mouvement direct se combine avec le circulaire dans les deux différentes hypothèses de la touche aiguë & de la touche plate, voyons quelles portions de la ligne droite T_3 ; chemin total du crayon, répondront dans l'une & dans l'autre hypothèse à chaque arc correspondant de la circonférence que décrit l'angle θ de la Rosette. Soit pour cet effet l'arc θ_3 divisé en trois arcs égaux, $\theta_1, \theta_2, \theta_3$, compris entre les rayons C_0, C_1, C_2, C_3 .

Commençons par le cas de la touche pointue. Le côté T_0 de la Rosette, en tournant, va soulever la touche T , & la faire monter dans la verticale T_3 , en sorte que dans les momens où l'angle θ répondra aux points 1, 2, 3, ou, ce qui est le même, dans les momens où les points LM_0 du bord de la Rosette, pris sur les rayons terminés aux points 3, 2, 1, 0, passeront sous la touche, la touche répondra aux points HQ_3 de la verticale T_3 . Les parties du chemin total T_3 de la touche & du crayon correspondantes aux arcs égaux $\theta_1, \theta_2, \theta_3$, sont donc TH, HQ, Q_3 , que l'on voit qui vont en croissant d'autant plus rapidement que l'angle θ approche de la touche au point 3.

Tout le contraire arrive dans la supposition de la touche plate; car sans répéter en détail ce qui vient d'être dit, on peut voir d'un coup d'œil, que la touche plate AB , soule-

vée d'abord par l'angle θ de la Rosette, parviendra successivement dans les situations $a^1 b^1$, $a^2 b^2$, $a^3 b^3$; pendant que l'angle ou le point θ , en tournant, répondra aux points 1, 2, 3. Les parties du chemin total T_3 de la touche & du crayon, correspondantes aux arcs égaux $\theta 1$, 12 , 23 , seront donc dans le cas de la touche plate $F1$, $E2$, $D3$, ou TZ , ZD , $D3$, qui, comme on voit, vont dans une progression fort décroissante, à mesure que l'angle θ approche du point 3.

Il est donc vrai que dans les deux suppositions de la touche plate & de la touche aiguë, le mouvement direct du crayon, eu égard au mouvement circulaire, va en diminuant dans l'une précisément quand il augmente dans l'autre; & comme c'est de cette différente combinaison de ces deux mouvemens, qu'on a prouvé que résulteroit la diversité des figures, c'est cette opposition dans les mouvemens des deux touches qui fait que leurs effets sont absolument opposés dans les positions semblables du crayon.

Au lieu de diviser l'arc $\theta 3$ en trois, on pourroit le diviser en tel nombre de parties qu'on auroit voulu, on eût tiré les mêmes conséquences.

La figure précédente parle assez aux yeux; mais voici une démonstration géométrique.

On vient de voir que l'accélération de la touche & du crayon, dans le cas de la touche pointue, est mesurée par les lignes TH , HQ , $Q3$; c'est-à-dire, qu'elle suit la raison des accroissemens successifs TH , TQ , T_3 de la ligne qui devient enfin T_3 , ou, ce qui

qui revient au même, les accroissemens $RL = TH$, $SM = TQ$, $VO = T_3$ des sécantes CL , CM , CO des arcs égaux TR , RS , SV , & que dans le cas de la touche plate, il n'est question que de prouver,

1°. Que les sinus versés décroissent en plus grande raison que leurs arcs, ce qui a déjà été prouvé. 2°. Que l'excès de la sécante d'un arc quelconque sur le rayon, croît dans une raison plus grande encore que le sinus versé correspondant du même arc ne décroît. Pour le démontrer,

Soit l'arc * TR quelconque CT , son rayon TM , sa tangente en T , CM sa sécante; RE son sinus droit, TE son sinus versé, & RM l'excès de la sécante sur le rayon CR . Supposons que TE croisse de la quantité Ee quelconque; tirez er parallèle à ER , & l'arc Mn du rayon CM , l'arc TR fera cru de la quantité Kr , & la sécante CM de la quantité nm . Or je dis que rm a une plus grande raison à RM , que Te à TE . Tirez rf parallèle à RM , on aura PM , & par conséquent son égale rF , $RM :: Te. TE$; mais rm est plus grand que rF . Donc, &c. $C. Q. F. D.$

Quand je dis que les figures sont les mêmes avec la touche plate qu'avec la touche pointue, & seulement dans un ordre renversé, j'entends les mêmes à l'œil sensiblement; car on démontrera dans le second Mémoire, que les courbes tracées dans ces deux cas, sont d'une différente nature. Je réserve aussi pour la discussion géométrique, l'examen de la dif-

différence qu'il y a entre l'effet de la touche plate, quand elle est plus longue ou plus courte, que le côté de la Rosette. Ici où il n'est question que de pratique, on ne s'attache qu'aux différences qui peuvent frapper les yeux.

La touche plate disposée obliquement, ne cause d'autre changement, sinon que la figure tracée par la touche oblique, croîsera l'autre figure sous le même angle que les deux touches font entre elles. Il reste à examiner les touches courbes.

Nous avons déjà remarqué que les Tourneurs se servoient ordinairement d'une touche qui porte à son extrémité une petite roulette, dont le mouvement sur son centre rend celui du Tour plus doux, en diminuant le frottement; ou conçoit que le côté de la Rosette touchant cette roulette en différens points de sa circonférence, l'effet ne doit être le même que lorsque le côté de la Rosette porte toujours sur un même point, comme dans le cas de la touche aiguë. On verra dans le second Mémoire, quelle est la courbe qui en résulte; il suffit de remarquer ici que la roulette étant très petite, la figure est sensiblement la même que si la touche étoit pointue.

Les touches concaves ni les touches convexes, si ce n'est celles à roulettes, ne sont point usitées; aussi l'examen de leurs effets n'est que de pure curiosité. Si les touches sont petites & convexes, elles ne diffèrent pas sensiblement des touches rondes ou à poulies; si elles sont petites & concaves, le
côté

côté de la Rosette s'applique sur les deux extrémités à la fois de l'arc dont ce côté & la Rosette devient la corde, ce qui retombe dans le cas de la touche platte, hors pour le tems où l'angle de la Rosette entre dans la concavité de la touche. Enfin si la touche est fort grande, son arc, soit convexe, soit concave, en approche d'autant plus de la ligne droite; le peu de difference qui se trouve, cause peu de changement à la figure, & la courbe paroîtra encore sensiblement la même, que si la touche étoit platte. Tous ces cas seront examinés géométriquement dans le second Mémoire.

Il nous reste un mot à dire du second usage de la Machine. Nous lui en avons attribué deux. L'un, de faire connoître avec exactitude tous les effets differens de la Rosette qu'on veut employer; c'est ce que nous avons jusqu'ici examiné. L'autre, de faire trouver quelles sont les Rosettes les plus commodes pour exécuter un dessein quelconque; c'est maintenant de quoi il est question.

Quand il y a un modele de Rosette ajusté sur la Machine, ce modele, comme nous avons vu, guide une extrémité de la tringle, & le crayon attaché à l'autre extrémité trace une figure. Il n'y a donc qu'un des bouts de la tringle de conduit, & le crayon adapté à l'autre bout qui ne porte sur rien, trace nécessairement un contour résultant du chemin que fait le bout qui est conduit; la dépendance est donc réciproque entre la Rosette & le dessein qu'elle produit. Par conséquent quand on a un dessein pour lequel

on

on cherche une Rosette, après avoir placé & assuré le crayon dans l'endroit le plus convenable, il n'y a qu'à le conduire à la main sur le dessein dont on cherche la Rosette, & l'autre bout de la tringle, dont l'usage ordinaire est d'appuyer sur le bord de la Rosette, tracera en ce cas la Rosette qu'on n'a point & qu'on cherche. Pour cet effet, au lieu de modele de Rosette, on fera porter un second carton à cette extrémité de l'arbre, & le bout de la tringle fait pour appuyer sur la Rosette, dans le premier usage, portera dans ce cas un crayon qui tracera le contour de la Rosette cherchée.

Pour conduire l'un des deux crayons sur le dessein, il suffira de le hausser & baisser à propos, ce qui est aisé au moyen de la tringle qui glisse librement dans ses rainures; le mouvement circulaire du carton fera le reste: & comme ce mouvement circulaire du carton n'est pas fort rapide, & qu'on peut aisément le ralentir en causant quelque petit frottement au rouage, on aura tout le tems de hausser ou baisser le crayon pour qu'il ne quitte pas le contour du dessein donné; & l'un des deux crayons, car il n'importe lequel, ainsi conduit sur un contour quelconque, fera tracer à l'autre crayon le contour de la Rosette, qui sera différent suivant les différentes positions qu'on donnera au crayon.

Il faut avouer cependant, que quelque juste que soit la Machine, l'exactitude du contour pourroit être un peu altérée par le secours de la main qu'on est obligé d'employer dans ce second usage, ce qui ne se peut gue-

re sans qu'il y ait quelque vacillation dont le trait se ressent infailliblement. A la vérité, on pourroit remédier à cet inconvénient, en faisant limer un modele du dessein donné en cuivre, dont on se serviroit comme on a fait des modeles de Rosettes. Ce modele conduiroit sûrement la tringle sans le secours de la main; mais cela demanderoit trop de tems & d'appareil, sur-tout si le dessein étoit irrégulier & d'un contour difficile. Il seroit donc à souhaiter qu'on pût trouver la Rosette d'un dessein qu'on veut exécuter, sans être obligé de rien conduire à la main, & sans perdre le tems nécessaire pour limer en cuivre un nouveau modele à chaque essai. Cette perfection manque à notre premiere Machine; aussi pour ce second usage je préfère de me servir d'une espece de Compas, dont on trouvera la construction dans le second Mémoire. Ce Compas, propre à tracer d'un mouvement continu toutes les Courbes du Tour, peut servir indifferemment à tracer ou le dessein ou la Rosette, l'un des deux étant donné; il remplace par conséquent & peut tenir lieu de la Machine tenue secrete, & propre à ces deux usages, qui a donné lieu à ces recherches.

Quelques particuliers ont déjà fait une application très simple & très heureuse à leur Tour, de la Machine qu'on vient de décrire; & par ce moyen, d'un Tour simple dont l'arbre n'a que le seul mouvement de rotation sur son axe, on fait un Tour figuré en rendant la touche & l'outil, ajustés sur un support, mobiles d'un mouvement commun qui tend

tend au centre, & tient lieu du mouvement de parallelisme que l'arbre n'a pas.

EXPLICATION DES FIGURES
des trois premières Planches de ce Mémoire.

P L A N C H E I.

L A Figure I. représente la Machine, vue par la platine postérieure *B B B B*.

C est l'Arbre du remontoir.

D est l'encliquetage.

E F, Détente qui retient le volant *G*, laquelle étant levée, laisse courir le rouage.

G, le Volant.

H, pièce plate qui représente la Rosette du Tour. Elle est supposée ici quarrée.

I, un des bouts de l'Arbre du pignon que la roue du barillet fait mouvoir. On fixe à ce bout la Rosette par le moyen d'un écrou. Cet arbre du pignon représente l'arbre du Tour.

K, Arbre quarré, rivé sur la pièce *N O*, pour y adapter la touche plate, comme il sera expliqué ci-après.

L, Rainure faite dans la platine *B B B B*, pour laisser monter & descendre la broche ou tringle plate *W* qui traverse les deux platines du mouvement.

M, pièce taillée en couteau, qui représente la Touche du Tour. Elle est fixée à la pièce *N O*.

N O, pièce plate qui s'attache avec deux vis sur la traverse d'assemblage des deux règles
ou

ou montans PQ , RS , laquelle traverse fait corps avec la tringle platte W .

PQ , RS , Règles ou Montans ci-dessus expliqués.

T , petit Barillet à ressort, dont l'effet est de rappeler à lui la piece NO tirée par un fil attaché d'un bout au tambour, & de l'autre au crochet marqué 9 sur cette piece NO .

$ZZZZ$, Tenons à coulisse dans lesquels glissent les règles PQ , RS .

La *Figure II.* est composée de deux Règles plates TS , SV , mobiles, sur deux Pivots ou Crochets en S , où elles peuvent même se séparer, lorsqu'on ne veut qu'une touche platte, non oblique, & jointes à leur autre extrémité par un arc de cercle refendu d'une rainure dans laquelle s'engage la règle SV , de manière qu'au moyen de l'écrou T , on tient la règle SV plus ou moins inclinée sur la règle ST . Cette règle porte dans son milieu un Tenon percé d'un trou quarré E qui s'ajuste sur l'arbre marqué K (*Fig. I.*) sur lequel on l'arrête par la vis D .

La *Figure III.* représente en grand la piece NO qui porte les Touches.

Figure IV. Rosette quarrée.

Figure V. Rosettes ronde & ovale.

PLANCHE II.

La *Figure VI.* est la Machine vue par la platine.

ae , fc , sont deux Règles plates refendues chacune d'une rainure, lesquelles au moyen d'un pivot mobile b , qu'on fixe par la vis e ,
peu.

peuvent prendre telle inclinaison qu'on souhaite.

d est un Crayon placé à l'extrémité d'une de ces règles, lequel par conséquent peut répondre à tel point qu'on veut du plan *IL*. Ce crayon représente l'outil du Tour.

Fg est une Détente sous laquelle un ressort *r* est placé. Cette détente est mobile sur son point d'appui *F*, & porte à son extrémité cachée une dent ou cheville qui traverse la platine, & arrête le rouage lorsqu'une figure est tracée. On lui rend la liberté de courir, en appuyant le doigt sur le bout *g* de la détente.

il est un Tambour mobile dans l'épaisseur duquel on place plusieurs papiers l'un sur l'autre, sur lesquels se tracent les figures. Ce tambour est ajusté à frottement sur un canon goupillé au bout de l'arbre du pignon, dont on a vu dans la *Figure I.* que l'autre bout *I* portoit la Rosette, & représentoit l'arbre du Tour, en sorte que cet arbre, la rosette & le tambour, tournent d'un mouvement commun imprimé par le rouage.

HK est un Cercle divisé en parties égales quelconques, attaché à la platine par des Vis en *f* & en *p*, avec la précaution que le tambour lui soit concentrique, tellement qu'après chaque tour du tambour mû par le rouage, si l'on fait tourner à la main ce tambour d'une valeur quelconque, l'Alhidade *M* qui répondra à des divisions différentes du Cercle *HK*, fera connoître sous quel angle il faut faire croiser le même dessein pour avoir des contours symétriques & agréables à la vue.

L.

L est la Rainure de la platine dans laquelle coule la Tringle plate *W* qui a été dite traverser les platines du mouvement (*Fig. I.*).

VXY est l'extrémité de cette tringle plate coudée en cet endroit, pour ne pas gêner le tambour. C'est sur cette extrémité *Y* qu'entre la douille du crayon.

La *Figure VII.* est le développement de l'assemblage du crayon de la tringle plate & de la piece qui porte les touches.

ABC est le Porte-crayon avec ses coulisses, & sa douille *BC* qui entre sur la tringle plate en *Y*.

TXW est la tringle plate coudée en *X*.

M est la Touche taillée en couteau.

K est la Tringle quarrée sur laquelle s'attache la touche plate.

O N sont les Vis qui attachent la piece *MK* à la tringle plate *TXW*.

Figure VIII. *KH* est le Cercle gradué qui tient à la platine.

IL représente le Tambour qui peut tourner d'un mouvement propre sur le canon auquel il tient à frottement, lorsqu'on le fait mouvoir à la main, mais qui est cependant emporté d'un mouvement commun avec la Rosette, lorsque c'est le rouage qui le meut.

M est l'Alidade qui tient au tambour.

IL est la coupe du tambour.

N est le Canon sur lequel il tourne à frottement

N bis représente le Plan du canon & de l'arbre du pignon sur lequel il s'en-arbre quarrément.

Figure IX. *OP* est un Cercle de cuivre plein,

plein, à la réserve qu'il est coupé par deux rainures perpendiculaires l'une à l'autre, dont l'intersection est le centre du cercle. Il porte une petite Règle QR mobile au point R , laquelle s'ajuste au long des deux rainures, de manière qu'elle sert à tirer des lignes qui se coupent à angles droits au centre du papier du tambour.

bc est sa Douille, qui se place comme celle du crayon sur la pièce VX de la tringle plate.

P L A N C H E I I I.

La *Figure X.* est le développement du rouage.

A, Arbre du remontoir.

B, Roue du barillet, de 84 dents.

C, Arbre qui représente l'arbre du Tour sur lequel sont fixés la Rosette & le tambour mobile.

D, Pignon de 20, qui est mené par la roue *B*, & qui a pour tige l'arbre *C*.

E, Roue de 54, sur laquelle est rivé le pignon *D*.

F, Pignon de 6, mené par la roue *E*.

G, Roue de 48, en-arbrée sur la même tige que le pignon *F*.

H, Pignon de 6, mené par la roue *F*.


I, Roue de 42, en-arbrée sur la tige du pignon *H*.


L, Pignon de 6, mené par la roue *I*.

M, Roue de 36, en-arbrée sur la tige du pignon *L*.

N, Pignon de 6 pour le volant mené par la roue *M*.

O, Trou








P⊙

F

H

P⊙



ANCH




Fig. 14.


T



Fig. 12.

T






LANCHE




Fig.






TCHE VII. Fig. 24.



6.

Fig. 27.





CHE VIII.


Fig. 32

T

O

R

C.



O, Trou percé dans la roue *E* pour recevoir la dent ou cheville de la détente *FG* (*Fig. VI.*) qui sert à arrêter le rouage, lorsqu'il s'est fait une révolution du tambour *IL* (*Fig. VI.*)

P P P P. Trous pour recevoir les piliers de la cage.

Q, Rainure dans la platine pour laisser hausser & baisser la tringle plate (*Fig. I. & VI.*)



SUR LE SUBLIMÉ CORROSIF;

ET A CETTE OCCASION,

Sur un Article de l'Histoire de l'Académie Royale des Sciences de l'année 1699, où il s'agit de ce Sublimé.

Par M. LEMERY. *

ON fait que le Sublimé corrosif ordinaire peut se faire, & se fait aussi de différentes manières; on peut même dire qu'outre celles qui sont connues & pratiquées, on en peut encore imaginer & exécuter d'autres qui, en produisant le même Sublimé, c'est-à-dire, blanc & corrosif, auront à certains égards, des avantages & des inconvéniens qui pourront les faire préférer en quelques cas, & rejeter en d'autres.

J'ai imaginé un nouveau mélange pour faire du Sublimé corrosif: je le donnerai d'autant

tant plus volontiers dans la suite de ce Mémoire , qu'il m'a fort bien réussi , & qu'il peut avoir son utilité.

Dans chacun des procédés usités pour la fabrique du Sublimé corrosif, le sel commun, ou du moins son acide, y entre toujours & nécessairement; & la seule différence qu'il apporte à ces procédés, c'est que dans les uns il en faut moins, & dans les autres davantage, à proportion du Mercure qui y a été employé.

L'état différent du Mercure qu'on mêle aux différens ingrédiens avec lesquels on fait du Sublimé corrosif, apporte encore une différence particulière aux procédés de ce Sublimé; car ou l'on y employe le Mercure crud & coulant, c'est-à-dire, sous sa forme naturelle, ou sous celle de Sel concret qu'il a acquise par l'esprit de Nitre, ou par l'huile de Vitriol dont il a été dissout, & dont on a ensuite fait évaporer la partie aqueuse: or dans ces différens cas, le mélange des autres ingrédiens, & la manœuvre de l'opération, varient nécessairement plus ou moins. Enfin le Vitriol dont on a coutume de se servir dans les procédés les plus usités du Sublimé corrosif, n'est pas toujours si nécessaire pour la formation de ce Sublimé, qu'on ne puisse souvent dans sa préparation, ou s'en passer tout-à-fait, ou y substituer un autre intermede équivalent. Nous entrerons une autre fois plus avant dans le détail & l'explication physique de ces différens procédés, dont nous ne parlons quant à présent que par occasion, & qu'autant qu'il est nécessaire pour l'in-

l'intelligence de ce que nous avons à dire dans la suite.

Il y a peu de tems qu'on voit plus clair qu'on ne faisoit auparavant sur la maniere dont les différentes matieres qui entrent dans la composition du Sublimé corrosif, agissent les unes sur les autres pour la formation de ce Sublimé; on peut même dire que malgré les éclaircissemens qu'on a tirés de quelques expériences nouvelles & anciennes, on n'est point encore parfaitement instruit, ni de la mécanique de l'opération du Sublimé corrosif, ni du contingent que le Mercure tire de chacun des Sels qui ont été mêlés avec lui.

Les Chimistes qui sont venus, ou qui ont écrit avant les éclaircissemens dont on vient de parler, donnoient à-peu-près & indistinctement le même emploi aux acides de tous les Sels qu'on faisoit servir à la production du Sublimé corrosif; ils regardoient ce Sublimé comme un Mercure hérissé des pointes de tous ces acides, & s'imaginant que plus il en étoit chargé de différens, plus il étoit corrosif; lorsqu'au-lieu du Mercure dissout par l'esprit de Nitre, ils employoient le Mercure crud, ils avoient souvent soin d'ajouter dans le mélange des ingrédiens du Sublimé corrosif, une portion de Salpêtre dont ils comptoient que les acides se joindroient à ceux du Sel commun & du Vitriol, pour se réunir dans le Sublimé corrosif qui en devoit naître, & ils n'imaginoient pas que le Vitriol même eût d'autre usage dans l'opération de ce Sublimé, que celui qui vient d'être allegué.

Mais depuis qu'on a découvert l'action du

Mém. 1754.

R

Vi.

Vitriol ou de ses acides sur ceux des autres Sels qui y ont été mêlés, ou plutôt depuis que la difficulté qu'on a trouvée jusqu'ici à expliquer mécaniquement certains phénomènes chimiques, que nous ferons voir en tems & lieu être très susceptibles d'une explication de cette nature; depuis, dis-je, que la difficulté apparente d'expliquer mécaniquement certains phénomènes, a donné lieu d'imaginer pour cela, & d'introduire en Chimie le système des Attractions, qui, à dire vrai, est moins une explication qu'un aveu ou une déclaration formelle de l'impossibilité où l'on croit être de rendre une raison claire & satisfaisante des effets dont il s'agit; enfin depuis que le système des Attractions a fait naître l'idée d'affinités, de rapports plus ou moins grands entre différentes substances, d'où, dit-on, dépendent les mouvemens cachés qui suivent le mélange des corps, on a conclu affirmativement en conséquence de cette idée, que quelles que soient les différences des mélanges avec chacun desquels on fait du Sublimé corrosif, dès que le Sel commun ou son acide ne manque jamais dans tous ces mélanges d'être un des ingrédients, le Sublimé corrosif qui résulte de chacun d'eux doit toujours être parfaitement le même, & n'avoir admis dans sa composition que le Mercure & les seuls acides du Sel commun, qui, suivant la supposition, ayant plus de rapport avec le Mercure que tous les autres acides, y doivent être reçus par préférence, sur-tout quand on employé le Mercure crud; & lorsqu'on se sert de celui qui est déjà chargé des acides

acides du Nitre ou du Vitriol, ceux du Sel commun, en vertu de leur plus grand rapport avec le Mercure, en chassent aussi-tôt les autres acides, ou les en trouvent délogés à leur arrivée, parce que ces autres acides qui ont plus de rapport avec la matrice du Sel commun qu'avec le Mercure, abandonnent l'un pour s'établir dans l'autre, & cèdent par-là d'eux-mêmes la place aux acides du Sel marin: d'où il suit que quand on se sert du Mercure pénétré par les acides du Nitre, ou par ceux du Vitriol, ce ne doit pas être dans la vue de faire un Sublimé plus fort, ou différent de celui pour lequel on ne se sert que du Mercure crud, mais pour la facilité de l'opération, & en faveur de celui qui travaille à incorporer ensemble par la trituration, le Mercure, le Sel & le Vitriol; car outre qu'il est fort longtems à en venir à bout, il se trouve encore exposé pendant tout ce tems à une poussière incommode, & même dangereuse, qui s'élève du mélange.

Quoiqu'une grande partie des faits qu'annoncé ce système se trouve vérifiée par l'expérience, & conforme à ceux d'un autre système plus mécanique & plus vrai, dans le détail duquel nous entrerons lorsqu'il s'agira d'expliquer la formation du Sublimé corrosif, & toutes les singularités qui s'observent dans les différens procédés de cette opération; on ne trouve pas la même certitude dans l'autre partie des faits de la supposition alléguée, suivant laquelle on prétend que le Sublimé corrosif en général ne contient d'autres acides que ceux du Sel commun, & que celui qui a

été fait avec le Mercure dissout auparavant par l'esprit de Nitre, ou par l'huile de Vitriol, n'a rien retenu des acides de ces liqueurs, & est en tout parfaitement semblable à celui qui a été fait avec le Mercure crud. Et comme l'expérience est la pierre de touche des spéculations chimiques, l'amour de la vérité m'a déterminé d'abord à y avoir recours pour la vérification de cette supposition; & je l'ai fait d'autant plus volontiers, qu'outre que cette vérification est par elle-même curieuse & intéressante pour la Physique, & qu'en travaillant sur le Mercure, il est rare qu'on n'y apperçoive pas quelques nouveautés, qui ne sont à la vérité que de simples curiosités tant qu'elles sont isolées, mais qui deviennent souvent utiles par l'usage & l'application qu'on s'avise d'en faire, soit pour la preuve de quelques vérités, soit pour se garantir de quelques erreurs, ce qui va être prouvé par un exemple qui fait le principal sujet de ce Mémoire; il est encore vrai qu'il est de la dernière importance pour la Médecine, de connoître à fond la composition intérieure de chacun des Sublimés corrosifs qui ont été faits suivant des procédés differens.

Quoique cette préparation chimique soit le plus grand de tous les poisons, & qu'en cette qualité elle serve à tuer quantité de bêtes incommodes, elle n'en est pas moins utile dans la pratique de la Médecine, soit pour l'extérieur, soit pour l'intérieur. On sait que c'est un grand escarrotique propre à manger les chairs baveuses, à consumer les callosités les plus obstinées dans les ulcères, les glandes

des endurcies, les verrues; qu'on en fait, avec l'esprit de Vin, une espece d'huile propre pour les chancres vénériens menacés de gangrene; & avec l'eau de Chaux, l'eau phagédénique dont on se sert pour nettoyer les vieux ulcères; qu'elle entre dans les trochisques de Minium, remede incomparable pour dissoudre & enlever, par la voye de la supuration, les glandes scrophuleuses. Mais on fait de plus qu'elle est la base du Mercure doux & de la Panacée mercurielle, deux des plus grands remedes que nous ayons en Médecine, & pour la meilleure préparation desquels nous ne devons négliger aucune des instructions que la Chimie est capable de nous procurer. Si elle nous fait voir dans la suite, que tous les Sublimés corrosifs ne sont composés que de Mercure & des acides du Sel commun, nous nous servirons indistinctement & sans scrupule de tous ces Sublimés pour l'intérieur & pour l'extérieur; mais si elle nous dit tout le contraire sur cette composition, si elle nous avertit qu'il y a des Sublimés corrosifs, plus corrosifs & moins faciles à être adoucis que d'autres, nous ne nous servirons des uns ou des autres que dans les cas où ils conviendront davantage, & nous n'employerons, sur-tout pour les préparations de Mercure doux & de la Panacée, que ceux avec lesquels l'expérience nous aura appris qu'on en doit faire, & qu'on en fait de meilleurs.

C'est pour remplir les vues qui viennent d'être proposées, que j'ai commencé par faire huit differens Sublimés corrosifs, & que

j'en ai tenté quelques autres qui ne m'ont pas réussi comme les premiers, quoique pour un d'eux j'eusse travaillé sur la foi d'un Auteur de réputation. Les premières expériences que j'ai faites sur trois de mes Sublimés, n'ont pas seulement justifié mes doutes sur la différente composition des Sublimés corrosifs qui résultent de différens mélanges; elles m'ont encore fourni un éclaircissement & une décision parfaite sur un article de l'Histoire de l'Académie Royale des Sciences de l'année 1699, dans lequel il s'agit de la falsification du Sublimé corrosif par l'Arsenic, & d'un moyen rapporté par différens Auteurs pour la reconnoître sur le champ. Nous nous arrêterons, quant à présent, à ce dernier article; & à l'égard du premier qui, pour être traité à fond, demande un plus grand nombre d'expériences que nous n'en avons encore faites, quoique nous en ayons déjà fait beaucoup, nous le remettons à un ou à plusieurs autres Mémoires qui viendront dans la suite.

Si le Sublimé corrosif ne servoit qu'à faire périr différentes bêtes qui nous incommode, ou s'il n'étoit employé en Médecine que pour l'extérieur & en qualité de topique, on ne s'inquiétoit peut-être pas tant que l'on fait, des matières arsénicales qu'on peut faire entrer dans sa composition: il est cependant vrai, & plusieurs Auteurs célèbres ont observé que le simple usage extérieur de l'Arsenic étoit très dangereux; que des foiblesses, des syncopes, la fièvre, le délire, des inquiétudes & des mouvemens involontaires dans

dans les membres en avoient souvent été la suite, & que plusieurs en étoient morts. Par conséquent si le Sublimé corrosif, soupçonné de contenir des matieres arsénicales, est si fort à redouter, même pour l'extérieur, que n'en devoit-on pas craindre, si on l'employoit pour les deux remedes intérieurs dont il a déjà été parlé, qui préparés avec du Sublimé corrosif bien & fidelement fait, sont aussi doux & aussi efficaces qu'ils seroient dangereux & funestes, s'ils l'avoient été avec du Sublimé corrosif mêlé d'Arsenic?

Pour être dans une parfaite sécurité sur la composition du Sublimé corrosif destiné à faire des remedes extérieurs ou intérieurs, il faudroit que tout Apothicaire fît lui-même cette préparation; mais malheureusement la peine qu'elle donne, & qui ne laisse pas d'être grande, se trouve en pure perte pour l'Artiste, auquel il coûte encore plus à faire, qu'à acheter tout fait des Droguistes qui le tirent de Hollande & de Venise à très bon compte; & cela, soit parce qu'il y a dans ces lieux de grandes manufactures de Sublimé corrosif, & que ce qui se fait en grand revient en général à bien moins que la même chose faite en petit; soit parce que les Hollandois & les Venitiens étant postés au milieu de la Mer, & à portée d'avoir à bon compte chacune des drogues nécessaires pour la fabrique du Sublimé corrosif, ils le font à beaucoup moins de frais que chaque particulier parmi nous, & ils peuvent aussi le lui donner à un prix fort au-dessous de celui qu'il trouveroit à le faire chez soi. Cela étant,

il n'en faut pas davantage pour engager, au moins le commun des Apothicaires, à acheter plutôt le Sublimé corrosif tout fait, qu'à le faire eux-mêmes.

Je remarquerai ici à l'occasion des manufactures de Sublimé corrosif de Venise & de Hollande, auxquelles le bon marché a fait, &, suivant toute apparence, fera toujours avoir recours, qu'on pourroit en établir de semblables en France, où le Sublimé corrosif se feroit non-seulement à bon compte, mais encore à la vue du Public, & par conséquent avec fidélité, ce qui nous dispenseroit d'avoir recours à celui des Etrangers, dont nous ne sommes pas d'ailleurs aussi sûrs que nous le serions du nôtre. On n'auroit pour cela qu'à choisir un lieu sur le bord de la Mer, des eaux de laquelle on auroit permission de se servir, ce qui épargneroit déjà la dépense du sel commun; & à l'égard du Vitriol qui est un des ingrédiens de l'opération commune du Sublimé corrosif, quoique ce sel ne coûte pas beaucoup, pour épargner encore sur cet article, je lui substituerois le Bol ou l'Argille, qui sont toujours d'un prix fort au-dessous de celui du Vitriol, & avec lesquels je sai, par ma propre expérience, qu'on peut faire de très bon Sublimé corrosif. Il est même plus aisé, quand on se sert du Mercure crud, de l'éteindre avec le Bol ou l'Argille, qu'avec le Vitriol. Cette substitution pourroit toujours servir à diminuer le prix du Sublimé corrosif, qui d'ailleurs se faisant à la fois en grande quantité, & pour ainsi dire, sous nos yeux, non seulement pour-

pourroit se donner à bon marché, mais encore seroit moins suspect que celui qui vient de loin, & qui passe par différentes mains plus avides les unes que les autres de gain, & dont plusieurs peuvent se déterminer par ce motif à falsifier après coup avec l'Arsenic le Sublimé corrosif même sorti des manufactures de Hollande & de Venise.

Mais, dira-t-on, qu'importe qu'on le falsifie, si par un essai chimique tout des plus faciles, on en peut découvrir sur le champ la falsification? Il n'y a qu'à l'éprouver par cet essai, avant que de l'employer: cet expédient sera toujours plus aisé, & coutera moins, que s'il falloit préparer soi-même tout le Sublimé corrosif dont on a besoin pour en faire des remèdes internes ou externes.

Il est vrai que plusieurs Auteurs, ou qui n'ont fait que se copier, ou qui ont été séduits par la comparaison de quelques expériences mal examinées, comme on le fera voir dans la suite, avancent, comme une vérité certaine, que la marque infailible du Sublimé corrosif sophistiqué, c'est de noircir comme de l'encre quand on y verse de l'huile de Tartre par défaillance; & que celle du Sublimé corrosif qui est bon, & tel qu'il doit être pour sa composition, c'est de jaunir comme l'or avec la même huile de Tartre.

Mais Barchusen, dans un Livre intitulé *Pyro-sophia*, rejette l'épreuve dont on vient de parler, & dit pour cela avoir observé que tout Sublimé corrosif, sophistiqué ou non, arrosé d'huile de Tartre, jaunit, puis rou-

370 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE
git, & enfin exposé à l'air quelque tems,
noircit.

Quoique l'observation de Barchusen differe, comme on le fera voir, de l'épreuve dont il s'agit par une circonstance, & laisse encore par-là quelque chose à desirer sur la preuve de la fausseté de cet essai, qui ne peut être mise dans tout son jour que par quelques autres observations que j'ai nouvellement faites, & que je vais donner dans ce Mémoire; on peut toujours conclurre assez clairement de celle de Barchusen, que la couleur noire qui survient au Sublimé corrosif arrosé d'huile de Tartre, & qu'on regardoit comme le signe d'un mélange arsénical, ne doit point passer pour tel; qu'on le reconnoitroit plutôt, ce mélange, par une odeur puante que l'Arsenic communique aux corps avec lesquels il est mêlé, & qui s'attache fortement aux doigts qui touchent ces corps; qu'enfin, en attendant la découverte de nouveaux essais qui nous annoncent aussi sûrement & avec autant de facilité l'Arsenic qui peut être mêlé avec le Sublimé corrosif, que la Noix de galle déclare le Fer ou le Vitriol qui se trouve dans certaines eaux, la seule marque infailible pour distinguer la vérité du fait, c'est la revivification ou l'analyse.

Qui croiroit que des faits rapportés par un Auteur de nom, tel que Barchusen, pour réfuter les prétendus moyens de distinguer le Sublimé corrosif sophistiqué, faits d'ailleurs aussi simples & aussi faciles à répéter & à apercevoir, que je vais démontrer qu'ils sont vrais, ayent pu, je ne dis pas seulement être

soup-

soupçonnés, mais taxés de faux, du moins en partie, par un Chimiste de réputation & de très bonne foi, qui a cru être en droit de le faire dans un Mémoire pour lequel j'ai consulté les Registres de l'Académie, parce qu'il n'a été imprimé qu'un extrait de ce Mémoire dans l'Histoire de l'Académie Royale des Sciences de l'année 1699 ? Ce Chimiste, qui est feu M. Boulduc, après avoir versé un grand nombre de fois de l'huile de Tartre sur du Sublimé corrosif ordinaire, & sur un autre qu'il avoit fait avec deux onces de Sublimé corrosif ordinaire & demi-once d'Arse-nic sublimés ensemble, dit n'avoir rien remarqué de différent dans l'un & dans l'autre Sublimé, qu'ils ont jauni tous deux par le mélange de l'huile de Tartre, moins d'abord, & ensuite davantage ; & comme il trouve jusque-là parfaitement la même chose que Barchusen, il conclut aussi comme lui, que l'huile de Tartre n'apportant à l'un des deux Sublimés d'autre altération que celle qu'elle communique à l'autre, elle ne peut être regardée comme un moyen de distinguer le Sublimé corrosif sophistiqué d'avec celui qui ne l'est point, & doit être rejetée comme une épreuve fautive, & qui ne peut servir qu'à tromper.

Mais notre Auteur, après avoir déclaré ce qu'il trouve de bon & de vrai dans les faits de Barchusen, c'est-à-dire, de conforme à ce qu'il a observé, nie formellement la couleur noire que contracte à l'air le Sublimé corrosif abreuvé d'huile de Tartre, & il la nie sur un très grand nombre d'expériences qui lui

ont fait voir le contraire dans l'un & dans l'autre Sublimé. Il ajoute même, au sujet de celui où il étoit entré de l'Arsenic, qu'ayant commencé à jaunir avec l'huile de Tartre, il avoit plutôt ensuite blanchi que noirci à l'air, ce qu'il a fait voir à la Compagnie.

Si ses expériences, au-lieu d'avoir été faites sur du Sublimé corrosif en masse, l'eussent été sur du Sublimé corrosif en liqueur, c'est-à-dire, dissout auparavant par ce qu'il lui faut d'eau pour cela, je ne serois point surpris qu'il n'y eût point apperçu la couleur noire que cite Barchusen, & qui vient, comme on le verra par suite, d'une poudre noire & très fine qui tombe & se répand insensiblement sur la surface de la petite masse du Sublimé, & qui, souvent par sa finesse, reste suspendue dans la liqueur surnageante, ce qui fait que le Sublimé conserve alors sa couleur jaune ou rouge; mais quand cette poudre tombe entièrement sur le Sublimé, & qu'il y en a une assez grande quantité pour couvrir toute sa surface, on n'y apperçoit alors que du noir, & la liqueur surnageante est claire, au-lieu qu'elle est noirâtre, aussi-bien que le Sublimé, quand une partie de la poudre se précipite, & que l'autre reste suspendue dans la liqueur.

Ce n'est point à la quantité de cette poudre, mais à sa finesse, & à la grossièreté des parties du Sublimé corrosif, comparées à celles de la poudre fine, & employées sous une forme sèche, qu'est dûe la couleur noire qui succede en quelque sorte à la jaune, ou à la rouge: car si celles du Sublimé corrosif étoient

toient aussi subtiles, & avoient autant de surfaces que les autres, comme la quantité du Sublimé surpasse infiniment celle de la poudre noire, les parties de ce Sublimé qui seroient aussi infiniment plus nombreuses que les autres, bien loin d'en pouvoir être alors recouvertes, comme il arrive quand elles sont plus grossieres & plus ramassées, recouvreroient si fort elles-mêmes les autres, ou les écarteroient tellement les unes des autres, qu'elles les offusqueroient en quelque sorte, & elles les feroient si bien disparoître à la vue, qu'on n'appercevroit alors que la couleur rouge ou jaune du Sublimé, qui se trouveroit abondamment entre chacune des petites parties noires: aussi lorsque le Sublimé devenu jaune par l'huile de Tartre a eu le tems de devenir noirâtre, de la maniere qui a été dite, si seulement avec les doigts, on écrase & on divise la matiere, & qu'on la délaye avec de nouvelle eau, elle reprendra sa couleur jaune ou rouge, qu'elle communiquera à tout le liquide, & le noir disparoîtra d'autant plus qu'il sera plus étendu par le liquide, & que le Sublimé aura été plus exactement divisé.

Par conséquent, lorsque le Sublimé corrosif dont on se sert pour faire l'expérience, a été auparavant dissout dans l'eau, toutes ses parties y sont dans une division extrême, puisqu'elles y sont invisibles; & quand l'huile de Tartre vient ensuite à les précipiter sous une couleur jaune ou rouge, quoique moins subtiles alors puisqu'elles se font appercevoir, elles composent toujours une poudre qui est au moins aussi fine que la noire, & les parties

de cette poudre noire qui, relativement à la quantité de celles du Sublimé, font peut-être un sur cent, doivent d'autant mieux disparaître, ou être moins sensibles, que la quantité du liquide qui regne pour-lors, & qui ne se trouvoit pas de même dans l'autre expérience, étend & éloigne davantage ces parties noires les unes des autres, les disperse & les confond plus exactement dans toute la masse du précipité qui est aussi lui-même plus étendu.

On voit par ce qui a été dit, qu'en supposant que les expériences de Barchusen ont été faites sur le Sublimé corrosif en substance, & celles de notre Auteur sur le Sublimé corrosif en liqueur, il est facile de rendre raison de la différence de leurs observations ; mais malheureusement notre Auteur dit positivement avoir fait ses expériences comme Barchusen ; c'est-à-dire, en versant quelques gouttes d'huile de Tartre sur le Sublimé corrosif en substance, ce qui lui a fait voir le contraire de ce qu'a vu Barchusen ; & le témoignage de l'Académie qu'il cite, & dont il s'appuye, joint à son exacte probité, ne permet pas de douter un moment de la vérité des faits qu'il allègue.

Il résulte seulement de la différence de ces faits, & de ceux de Barchusen, que des expériences très-simples, & qui paroissent entièrement semblables & les mêmes, tant par la manière de les faire, que par les ingrédients dont on s'est servi, peuvent avoir des différences très-sensibles, & capables d'en imposer à leurs Auteurs.

Que

Que Barchusen eût lu, par exemple, les expériences de notre Auteur, dans lesquelles le Sublimé devenu jaune demeure tel, & ne noircit point à l'air; n'auroit-il pas eu autant & plus de droit, de taxer ces expériences-là de faux; qu'en avoit eu notre Auteur sur les siennes, de nier formellement celles de Barchusen? Je dis autant & plus, car j'ai remarqué à cette occasion, par l'examen scrupuleux d'un très grand nombre de faits, que tout concourt à justifier ceux de Barchusen; au-lieu que rien, ou presque rien ne parle en faveur de ceux de notre Auteur. J'ai observé par-tout que le Sublimé devient ou noir, ou brun-foncé tirant sur le noir, ou noir en plusieurs endroits & par points; ou si le Sublimé conserve sa couleur jaune ou rouge, la liqueur qui le surnage est chargée d'une poudre noire qui le salit: de manière que, suivant mes observations, ce qui arrive le plus généralement, pour ne pas dire toujours ou presque toujours, est entièrement conforme à ce qu'a observé Barchusen; & à l'égard des faits de notre Auteur, je les regarde comme une exception à la règle générale & ordinaire. C'est cependant sur ces faits, qu'on a voulu donner l'exclusion aux autres.

Avant que d'entrer dans le détail de ceux qui ont été annoncés dans ce Mémoire, pour rétablir & confirmer la vérité des observations de Barchusen, il est à propos de faire sentir ce qui manque à ces observations pour être une preuve décisive & tout-à-fait concluante contre le prétendu moyen de distinguer le

Su-

Sublimé corrosif sophistiqué, de celui qui ne l'est pas.

Les differens Auteurs qui enseignent & prescrivent ce moyen & dont j'en ai lu plusieurs, s'expliquent tous de même sur la manière de discerner le bon Sublimé, du mauvais. Cette découverte, selon eux, est prompte, & se fait sur le champ, par quelques gouttes d'huile de Tartre versée sur le Sublimé. Ils ne disent pas que le Sublimé sophistiqué commence par jaunir & rougir, & ne noircisse ensuite qu'après avoir été exposé quelque tems à l'air; en ce cas, l'épreuve ne se feroit pas sur le champ, & seroit bien plus longue qu'elle ne paroît l'être par l'exposition qu'ils en font. Ils disent tout simplement qu'en versant de l'huile de Tartre sur le Sublimé, s'il est bon il jaunit, & s'il est altéré il noircit; & comme le bon jaunit aussi-tôt qu'on y verse l'huile de Tartre, le sophistiqué doit aussi noircir par-là dans l'instant. S'ils eussent prétendu que le Sublimé sophistiqué ne noircit qu'après être devenu jaune & rouge, & dans un certain espace de tems, ils n'eussent pas manqué de le dire; ou plutôt, comme l'épreuve n'auroit pas été momentanée, ils eussent pu voir par eux-mêmes, que tout, ou presque tout Sublimé corrosif arrosé d'huile de Tartre noircit à la longue; & le peu d'apparence qu'ils eussent trouvé à supposer en conséquence, que tout Sublimé qu'on expose en vente eût été mêlé d'Arsenic, leur auroit donné occasion d'examiner la chose de plus près, & d'en découvrir la vérité. Mais il y a lieu de croire, comme on le fera voir dans la

la suite, que quelques expériences leur avoient fait voir d'abord un Sublimé corrosif qui, sans avoir jauni & rougi auparavant, étoit devenu tout d'un coup noir par le mélange de l'huile de Tartre; & comme ils savoient que le Sublimé corrosif ordinaire, & qui est bien fait, jaunit toujours aussi-tôt avec l'huile de Tartre, & qu'ils ne s'étoient pas donné le tems d'appercevoir la couleur noire qui vient ensuite par dessus la jaune ou la rouge, ils avoient conclu de ces deux expériences faites à la hâte, la marque alleguée du bon & du mauvais Sublimé.

En effet, s'ils n'eussent jamais eu d'exemple de Sublimé corrosif capable de devenir noir dès qu'on y jetteroit de l'huile de Tartre, & cela sans jaunir auparavant, ils n'eussent jamais imaginé ce fait, & ils l'eussent encore moins donné comme une règle pour reconnoître le mauvais Sublimé corrosif. Or comme l'observation de Barchusen ne roule que sur des expériences dans lesquelles le Sublimé corrosif jaunit & rougit toujours avant que de noircir, peut-être dira-t-on que l'induction qu'il en tire contre l'épreuve du Sublimé corrosif arsénical où le noir vient d'abord sans avoir été précédé de jaune, pèche dans son principe, c'est-à-dire, par le défaut de conformité, & n'étant point par-là applicable à cette épreuve, elle est incapable de lui faire aucun tort; tout ce qu'on en peut induire, ajoutera-t-on, c'est que dans tous les cas où le noir vient à la suite du jaune ou du rouge, ce noir ainsi précédé n'est point un indice d'arsenic.

Il est vrai que, suivant les expériences de Barchusen, & même de son antagoniste, le Sublimé corrosif, sophistiqué ou non, reçoit l'un & l'autre de l'huile de Tartre, précisément & en tout, les mêmes altérations; ce qui sembleroit devoir décider, qu'inutilement a-t-on recours à l'huile de Tartre, pour reconnoître le bon ou le mauvais Sublimé, & que cette épreuve ne peut qu'induire en erreur: à quoi peut-être répondra-t-on encore, que si l'huile de Tartre ne manifeste point l'espece de mélange arsénical que notre Auteur a fait entrer dans son Sublimé corrosif sophistiqué, elle en découvre d'autres plus susceptibles de l'épreuve de cette huile, ce qui pourtant, à vrai dire, est plutôt un échappatoire qu'une réponse. Mais enfin pour ne rien laisser à désirer sur la vérification de cette épreuve, & pour soustraire, s'il est possible, toute ressource à la chicane qui n'en manque gueres, sur-tout lorsqu'il s'agit de préjugés établis de longue main, & qui ont acquis une espece de titre de loi en vieillissant; il seroit à souhaiter qu'on pût découvrir la maniere de faire un Sublimé corrosif que l'huile de Tartre ne jauniroit, ni ne rougiroit point, mais qu'elle noirciroit aussi-tôt: la connoissance qu'on auroit de la composition de ce Sublimé, jusqu'ici inconnue pour cet effet, apprendroit bien-tôt si l'Arsenic auroit part ou non à la couleur noire qui arriveroit d'abord, & sans avoir été précédée de jaune ou de rouge. J'espère qu'on trouvera un éclaircissement entier sur ce sujet, dans
 plu-

plusieurs des expériences qui vont être rapportées.

J'ai commencé mes expériences sur deux Sublimés corrosifs, dont l'un avoit été fait avec parties égales de Vitriol calciné, de Sel décrépit & de Mercure dissout par l'esprit de Nitre, & réduit en sel par l'évaporation; & l'autre avec parties égales de Sel décrépit & de Mercure dissout par l'huile de Vitriol: mais comme j'ai lieu de soupçonner que dans les deux Sublimés résultans des deux mélanges rapportés, le Mercure n'est pas pénétré des seuls acides du Sel commun, mais d'une Eau régale dans l'un, & dans l'autre d'un mélange d'acide vitriolique & d'acide du Sel commun; je voulois voir & comparer ce que mes essais feroient aussi sur le Mercure pénétré par les seuls acides nitreux, & sur celui qui n'en contient point d'autres que ceux du Sel commun. Je me suis servi pour l'un, de la masse blanche qui reste après la dissolution du Mercure par l'esprit de Nitre, & l'évaporation de la partie aqueuse de cette dissolution; & j'ai employé pour l'autre un Sublimé fait avec deux parties de Sel commun décrépit, deux parties de Vitriol calciné, & une partie de Mercure coulant, le tout bien mêlé par la trituration avant que de le faire sublimer. Je sais bien qu'on pourra dire que le Vitriol qui fait partie du mélange, peut communiquer quelques-uns de ses acides au Mercure, qui en réunira par-là de deux sortes; mais en attendant que de nouvelles expériences m'aient donné lieu de vérifier parfaitement ce fait, je puis toujours dire,

dire, sur de bonnes preuves, que si dans cette opération le Vitriol a fait passer dans le Mercure quelques-uns de ses acides, ils n'y sont pas en grand nombre, & que ce Sublimé est celui de tous où l'on peut moins soupçonner l'alliage des acides du Sel commun avec ceux d'autres sels.

J'ai donc fait usage de ce Sublimé pour mes expériences: mais il est à remarquer que qui le feroit resublimer une ou plusieurs fois encore, après l'avoir mêlé chaque fois avec de nouveau Vitriol calciné & de nouveau Sel décrépité, donneroit lieu aux essais d'y produire toujours de plus en plus des effets différens, & qui rentreroient dans ceux des autres Sublimés corrosifs dont il a été parlé; & comme nous n'avons besoin, quant à présent, que des effets dont ce Sublimé qui ne l'a été qu'une fois est susceptible, ce sera particulièrement sur le produit de cette première sublimation que nous nous exercerons.

A l'égard du sel de Tartre & des autres sels fixes qui ont été mêlés les uns après les autres avec chacune des quatre préparations mercurielles dont on vient de parler; prévenu déjà par d'autres expériences & observations rapportées dans deux Mémoires sur les différentes couleurs des précipités du Mercure, imprimés dans les Mémoires de l'Académie des années 1712 & 1714; prévenu, dis-je, par ces expériences & ces observations, que les différentes couleurs qu'acquiert le Mercure par le mélange des différens Sels alkalis qu'on y mêle, viennent toujours de quelque chose que ces Sels communiquent au

Mer-

Mercure, sans quoi il paroîtroit sous une forme blanche qui est celle qu'il a naturellement & indépendamment des Sels alkalis, quand il est pénétré d'acides; sachant d'ailleurs, & par la différence des expériences de notre Auteur & de celles de Barchusen, & par quelques autres de ma façon, que deux sels fixes d'une même espece, & qui ne paroissent avoir entre eux aucune différence, en apportent souvent de très sensible dans les mêmes expériences où chacun d'eux a été employé; j'ai observé avec soin ce que chaque espece de Sel fixe pris en differens états, étoit capable de faire avec chacune de nos préparations mercurielles. J'ai distingué du sel de Tartre anciennement fait, d'autres sels de Tartre faits nouvellement par moi-même, & cela parce que dans quelques cas j'y ai aperçu des variétés d'effets qui seront remarquées.

J'ai calciné du Tartre blanc & du Tartre rouge, de chacun desquels j'ai tiré un sel parfaitement semblable par sa nature, & qui l'a été aussi par ses effets; ainsi cette distinction n'entrera plus en ligne de compte pour nos expériences.

J'ai encore fait du sel de Tartre de deux façons. Dans l'une, après que le Tartre avoit été bien brulé & calciné, j'avois fait bouillir la matiere avec beaucoup d'eau, dans une bassine de cuivre; puis j'avois passé la liqueur au travers d'un filtre, & je m'en étois servi de cette maniere pour mes expériences. Mais faisant ensuite réflexion, 1^o. Qu'on pouvoit soupçonner la liqueur qui avoit

voit bouilli dans un vaisseau de cuivre, d'en avoir détaché quelques parties capables d'influer dans les expériences par leurs effets qu'on attribuerait mal à propos aux sels ; 2^o. Qu'il est très possible que les sels fixes de la liqueur ; en bouillant avec le marc du Tartre, se chargent de quelques matieres noires & fuligineuses que le feu en avoit séparées, & qui s'y rejoignent pendant l'ébullition ; j'ai fait recalciner du nouveau Tartre, je l'ai mis dans une terrine de grès, j'y ai versé de l'eau toute bouillante & qui venoit de bouillir dans un grand coquemar de terre non vernissé. J'ai ensuite coulé la liqueur, qui comparée pour ses effets à l'autre solution de sel de Tartre, a bien produit quelques variétés, mais rien d'essentiellement différent ; en un mot, l'une & l'autre solution ont noirci le Sublimé corrosif : ce qui ne peut être imputé aux parties de cuivre communiquées à la solution, car si cela étoit, celle qui n'a point été faite dans des vaisseaux de cuivre, ne devoit pas produire de noir, comme elle le fait. Il est vrai qu'en quelques cas elle en produit moins que l'autre solution, & le noir n'arrive pas si promptement, parce que n'ayant pas bouilli de même avec son marc, elle n'en a point enlevé la même quantité de parties noires propres à couvrir & noircir le Sublimé : & en effet, qu'on fasse bouillir de l'eau dans un poëlon, qu'on la verse ensuite dans une terrine de grès sur du Tartre bien brulé & calciné, qu'on ne l'y fasse pas bouillir, mais seulement infuser, qu'on coule ensuite la liqueur, & qu'on la mette en œuvre, on remar-

mar-

marquera qu'elle fera parfaitement la même pour ses effets que celle dont l'eau, après avoir bouilli d'abord dans un vaisseau de terre non-vernissé, a été versée & laissée en infusion sur une autre portion du même Tartre brûlé & calciné de l'expérience précédente. Et si après avoir fait bien bouillir du Tartre calciné dans un vaisseau de terre non-vernissé avec de l'eau, on compare la solution filtrée qui en résulte avec celle du même Tartre qui a été faite dans un vaisseau de cuivre où elle a bouilli de même, & d'où on l'a versée aussitôt après pour la filtrer, on reconnoitra encore dans l'une & dans l'autre solution parfaitement les mêmes effets; d'où il paroît que le cuivre n'a aucune part à ceux de la solution du sel de Tartre ou de tout autre sel fixe qui y a bouilli, & que c'est au marc de la matière & à l'ébullition, que ce qu'il y a de particulier dans ces effets doit être attribué.

Enfin, quand après avoir calciné du Tartre, ou toute autre matière végétale, on en séparé le sel par le moyen de l'eau qu'on a bien fait bouillir sur la matière; comme il est très possible que la solution qui en résulte, toute limpide qu'elle est devenue par la filtration, ait tiré du marc de la Plante, & contiennent des parties qui se dissipent, & ne se retrouvent plus, du moins aussi abondamment qu'auparavant, dans le sel tiré par évaporation de cette solution, & redissout dans de nouvelle eau, où, en formant une seconde solution, il y a preuve qu'il dépose toujours quelque chose qui se sépare de cette seconde solu-

solution lorsqu'on la filtre; j'ai cru que ces deux solutions d'un même sel pourroient bien ne pas toujours produire parfaitement les mêmes effets, & méritoient par-là d'être distinguées, & mises en œuvre séparément; qu'enfin la seconde solution dont on vient de parler, pourroit bien avoir une grande conformité d'effets avec une première solution, qui n'auroit point bouilli, mais simplement infusé sur le marc de la même Plante, dont cette seconde solution auroit tiré son sel. On verra dans la suite si l'expérience s'accorde avec cette idée: ainsi quand je parlerai dorénavant de la première & de la seconde solution du Tartre, de la Soude, de la Potasse, de la Cendre gravelée, je n'entends par-là que ce qui a été dit.

J'ai encore calciné quelque tems & assez fortement dans un creuset, une portion de sel de Tartre restée après l'évaporation de la première solution de ce sel; & je n'ai point trouvé que ce sel recalciné & fondu dans l'eau, ait produit alors d'autre effet remarquable sur nos préparations mercurielles, que celui du sel que je n'ai point fait recalciner, & que j'ai fait fondre de même dans de nouvelle eau.

Expériences sur le Sublimé corrosif fait avec le Sel commun, le Vitriol, & le Mercure précipité des acides de l'esprit de Nitre.

La première solution d'un nouveau sel de Tartre, faite par ébullition, a jauni le Sublimé; & peu de tems après, la liqueur surnageante

geante a commencé à se charger d'une poudre noire qui , augmentant en quantité , a rendu cette liqueur noirâtre ; elle étoit telle vingt quatre heures après & dans la suite, pendant que la masse étoit , au bout de ces vingt-quatre heures , & dans la suite aussi, d'un jaune d'or , mais un peu sali par le noir de la liqueur : cette solution un peu ancienne n'a plus agi si vite ni si fort pour ce qui regarde la couleur noire, qu'elle faisoit auparavant.

La seconde solution du sel de Tartre, recalciné dans un creuset , a jauni , puis rougi le Sublimé, qui est enfin devenu noir, la liqueur furnageante étant un peu rougeâtre, à cause d'une petite portion de poudre rouge qui y étoit restée suspendue.

La solution d'un ancien sel de Tartre a fait en cette occasion-ci , à très peu près, la même chose que la seconde du nouveau.

La première solution du sel de Tartre rouge, & celle du sel de Tartre blanc, faites l'une & l'autre sans avoir bouilli, & par simple infusion, après avoir jauni & rougi le Sublimé, l'ont aussi noirci, sans répandre de poudre noire dans la liqueur qui en contenoit même un peu de rouge.

La première & la seconde solution du sel de la Potasse ont fait encore à-peu-près de même en tout, que la seconde solution du sel de Tartre.

La première solution du sel de Soude a jauni en couleur d'or le Sublimé, & dans le même tems la liqueur furnageante s'est chargée d'une poussière abondante d'un verd-brun

ou noirâtre, dont une partie a retombé & voltige sur la matiere qu'elle a salie beaucoup, mais dont elle n'a point absolument empêché la couleur d'or de paroître, quand on remuoit la matiere, & qu'on la découvroit, en quelque maniere, de la poudre noire qui étoit tombée, & qui glissoit sur sa surface.

Il faut remarquer que cette premiere solution du sel de Soude ayant été gardée quelque tems, la production de la poudre noire n'a été ni aussi prompte, ni aussi abondante que quand la solution étoit nouvellement faite.

La seconde solution du sel de la Soude a d'abord rendu le Sublimé fort rouge, sans que la liqueur furnageante fût d'un verd-brun ou noir, comme avec la premiere solution, dont le Sublimé étoit toujours resté de couleur d'or; vingt-quatre heures après, le Sublimé de cette seconde solution de la Soude s'est trouvé recouvert en quelques endroits d'un peu de noir, & dans les autres, il avoit une couleur rouge roussâtre.

La premiere solution de la Cendre gravelée a donné une couleur jaune & orangée au Sublimé; vingt-quatre heures après, la liqueur furnageante étoit d'un pareil jaune, mais la matiere qui étoit au fond étoit parsemée de noir, & le jaune qui étoit à côté du noir étoit plus terne & plus obscur qu'auparavant.

La seconde solution de la Cendre gravelée a produit, à-peu-près, le même effet que la premiere pour le rouge, sur lequel elle a ensuite répandu une couleur brune-grisâtre, ce qui, avec le rouge, faisoit un rouge gris-brun.

La

La Pierre à cauterer est, comme on fait, le sel de la Cendre gravelée, animé des parties de feu de la Chaux, avec laquelle on le fait tremper & bouillir dans l'eau ; la solution de cette pierre versée sur le Sublimé, lui a donné une couleur jaune très orangée, & n'a différencié en cette occasion-ci de la simple solution de la Cendre gravelée, qu'en ce que vingt-quatre heures après, la matière du Sublimé étoit un peu moins parsemée de noir, & d'un jaune un peu plus apparent que celle de la solution de la Cendre gravelée : la liqueur fumageante le Sublimé de la solution de la Pierre à cauterer, étoit aussi d'un jaune-orangé & non noire.

La solution du Nitre fixé par les charbons, a jauni, puis rougi le Sublimé, qui dans la suite est devenu très noir.

En versant la solution de chacun des Sels fixes, dont on vient de parler, sur le Sublimé corrosif fait avec le Sel commun & le Mercure pénétré des acides vitrioliques, & répétant de la même manière sur ce Sublimé toutes les expériences qui ont été faites sur l'autre, dont on vient de parler, tout y est si exactement semblable, & toutes les circonstances se trouvent si fort les mêmes dans chacune des expériences faites sur l'un & sur l'autre, que d'avoir rapporté ce qui s'est passé dans les mélanges de l'un des deux Sublimés avec différens Sels, c'est annoncer ce que ces différens Sels sont capables de produire sur l'autre ; nous ne nous étendrons donc pas davantage sur son sujet.

Quand on considère que le noir de chacune

des expériences qui ont été rapportées, differe en quantité, en qualité, & par la partie du mélange où il se loge, & que cette difference répond non-seulement aux differens Sels qui ont été employés, mais encore aux differens états d'un même Sel, à la difference provision, ou à la perte qu'il a pu faire de certaines parties qu'il dépose plus ou moins abondamment, & qui, plus ou moins légères, couvrent la surface du Sublimé, ou se tiennent confondues avec le peu de liqueur qui le furnage; on est porté à croire que tout le noir qui survient au mélange, vient des sels qui y sont entrés. Cependant, comme on fait par une longue expérience faite & rapportée par feu M. Homberg, dans les Mémoires de l'Académie de l'année 1710 *, que le Mercure même qui a été revivifié du Cinabre, tout net qu'il paroisse, contient & donne par chaque livre, près de deux gros d'une matiere terreuse, légère, gris-de-souris, sans aucune saveur ni odeur, & que cette matiere, délayée dans l'eau, la rend trouble & noire; on peut croire aussi que le noir de chacune des expériences rapportées, vient de cette matiere grise qui, dans chaque expérience, se détache plus ou moins abondamment du corps du Sublimé qui, quoique fait avec du Mercure revivifié du Cinabre, a toujours conservé cette matiere grise & terreuse.

Pour répandre quelque éclaircissement sur cette difficulté, j'ai commencé par séparer de l'un

* Pag. 190. *Et suiv.*

l'un & de l'autre Sublimé dont il a été parlé, la matiere grise dont il s'agit, & cela par une voye bien plus courte & plus facile que celle de M. Homberg, & qui donne tout au moins autant, pour ne pas dire beaucoup plus de matiere grise que la sienne. Voici de quelle maniere je m'y suis pris.

J'ai mis une demi-once de Sublimé corrosif dans un mortier de marbre, j'y ai versé en cinq reprises differentes, dix onces d'eau, c'est-à-dire, deux onces chaque fois, remuant à chacune l'eau & le Sublimé ensemble, pour en operer la dissolution; après quoi je versois par inclination la liqueur, avec ce qu'avoit été dissout, remettant ensuite sur la matiere une égale quantité de nouvelle eau, & répétant toujours la même manœuvre jusqu'à la fin de la dissolution totale du Sublimé, que j'ai faite par partie, au-lieu de la faire toute à la fois en versant tout d'un coup les dix onces d'eau sur la demi-once de Sublimé, & cela pour appercevoir à chaque fois la couleur de la matiere restée dans le mortier, après que les deux dernieres onces d'eau qui venoient d'y passer en avoient enlevé une portion, & pour examiner par-là plus exactement toutes les circonstances de cette expérience, qui consistent en ce que dès qu'on a eu versé en deux fois quatre onces d'eau sur le Sublimé, la masse restante a paru moins blanche qu'elle ne l'étoit auparavant; qu'elle l'a paru encore moins après qu'on a eu versé en trois fois six onces d'eau; qu'après huit en quatre fois elle est devenue noirâtre; & qu'après dix, il est resté au fond

du mortier une matiere terreuse, grise, indissoluble, & parfaitement semblable à celle de M. Homberg, mais qui la passoit de beaucoup en quantité. J'ai cru que cette voye prompte & aisée de séparer exactement du Mercure les parties terreuses & étrangères qui y sont mêlées, pouvoit avoir son utilité en certains cas, & méritoit d'être rapportée, supposé qu'elle ne l'ait point été jusqu'ici, ce que j'ignore parfaitement; tout ce que je fais, c'est que je ne l'ai apprise de personne.

Le Sublimé corrosif purifié de cette maniere, & réduit sous une forme solide par l'évaporation des parties aqueuses qui le tenoient en dissolution, a été mêlé en cet état à chacun des differens sels fixes auxquels il l'avoit déjà été avant sa purification, & dans le tems qu'il contenoit tout ce qui en a été séparé depuis; & il s'est trouvé que tout purifié qu'il étoit, chacun des differens sels fixes mis en œuvre de toutes les manieres dont ils l'avoient été précédemment, y ont porté toute, ou à très peu près la même altération qu'ils avoient fait avant sa purification.

Je dis à très peu près, car je ne voudrois pas assurer positivement que le noir des expériences faites sur le Sublimé corrosif purifié, le fût exactement autant, ou aussi abondant, qu'il l'avoit été dans le Sublimé non purifié: ce qui donneroit lieu de conjecturer que ce noir pourroit venir de deux sources plus ou moins copieuses, savoir 1°. de chacun des sels fixes qui seroient employés, & qui ne sont pas tous & en toute sorte de situation également chargés de parties noires ou grises.

ses-brunes ; 2°. du Sublimé corrosif, qui peut être aussi plus ou moins chargé des mêmes parties.

Expériences faites sur le Mercure dissout par l'esprit de Nitre, & réduit par l'évaporation sous la forme d'un Sel concret.

Ce qui m'engage à rapporter les expériences que j'ai faites sur le Mercure dissout par l'esprit de Nitre, & réduit en sel concret par l'évaporation de la partie aqueuse de la liqueur, c'est qu'outre les preuves nouvelles qu'elles fournissent, du noir qui vient à la suite du jaune & du rouge dans le Mercure pénétré d'acides, elles nous font encore appercevoir infiniment mieux que nous n'avons fait jusqu'ici par les expériences précédentes, jusqu'où va la différence des premières & des secondes solutions de quelques sels ; & ces faits sont aussi curieux qu'ils sont clairs & évidens.

Je remarquerai d'abord, pour abréger sur les circonstances inutiles, que du Nitre fixé par les charbons, des sels de l'artre blanc & rouge, anciennement & nouvellement faits, des sels de Potasse, de Soude, de Cendre gravelée, retirés chacun par évaporation de la première solution qui les avoit enlevés au marc terreux avec lequel ils avoient été calcinés, & étoient devenus alkalis ; que ces sels, dis-je, refondus dans de nouvelle eau, formant par-là chacun une seconde solution, & versés en cet état séparément sur différentes portions de Mercure pénétré des acides

nitreux, y ont agi comme ils avoient fait sur les deux Sublimés corrosifs dont il a été parlé précédemment, c'est à-dire, qu'ils l'ont promptement jauni & rougi, & que le passage du jaune clair au jaune plus foncé, & du jaune plus foncé au rouge, a été aussi prompt & rapide que celui du rouge au brun ou au noir a été lent & tardif.

En effet, dans le mélange de ces secondes solutions, avec toutes les préparations mercurielles dont il a été parlé, y compris celle dont nous parlons actuellement, il a presque toujours fallu plusieurs heures pour le passage du rouge au brun ou au noir, & ce n'a souvent été qu'après vingt-quatre heures que la matière a bruni ou noirci jusqu'à un certain point, ou autant qu'elle pouvoit le faire.

D'ailleurs il est à remarquer que toutes les secondes solutions de nos sels fixes, bien filtrées, ne répandent pas ordinairement de poudre noire voltigeante dans la liqueur, & que les premières solutions de plusieurs de ces sels qui ont été faites avec ébullition, & qui sont nouvelles, ou du moins qui n'ont point été trop longtems gardées, mêlées aux deux sublimés sur lesquels nous avons travaillé, commencent à peine à les jaunir, qu'elles noircissent aussi-tôt la liqueur, qui devient dans la suite plus ou moins noire suivant la quantité de la poudre de la même couleur qui s'y assemble insensiblement. Mais il faut bien considérer que c'est ordinairement là tout l'effet de ces premières solutions sur les deux Sublimés, qui demeurent toujours visiblement jaunes, & seulement salis par la poudre noire

voltigeante & passagere qui tombe sur leur surface, & qui s'en sépare facilement; & que les secondes solutions des mêmes sels, qui ordinairement ne répandent point de poudre noire dans la liqueur, portent, s'il est permis de le dire, tout leur effet de noir ou de brun sur la masse même des Sublimés, sur la surface de laquelle le brun ou le noir, bien plus inhérent, cache bien davanrage la couleur jaune ou rouge qu'avoit acquis le Sublimé avant l'arrivée du noir ou du brun. C'est-là ce qui fait la différence principale des effets des premières & des secondes solutions des mêmes sels sur les deux Sublimés; & quoique cette différence soit assez légère, & par cela même ne frappe guere, elle paroît d'autant plus singulière, quand on la cherche dans ce qui peut la produire, qu'elle vient de deux liqueurs aussi semblables que le sont une première & une seconde solution d'un même sel par la principale partie de leur composition, je veux dire par leur partie saline, en conséquence de l'homogénéité de laquelle une conformité plus grande d'effets sembleroit devoir naturellement se rencontrer dans ces deux liqueurs.

Mais si l'on a lieu d'être surpris de cette différence d'effets des premières & des secondes solutions des mêmes sels, quand on la considère sur les deux Sublimés corrosifs dont il a été parlé, on a bien un autre sujet d'étonnement, quand c'est sur le Mercure pénétré des acides du Nitre qu'on observe l'action & la différence d'effets de ces premières & de ces secondes solutions.

On a déjà remarqué que les secondes solutions n'y faisoient que ce qu'elles avoient fait sur les deux Sublimés, c'est-à-dire, qu'elles opéroient toujours dans les unes & dans les autres préparations mercurielles, un passage lent & tardif du rouge au noir ou au brun, & qu'ordinairement elles ne répandoient point de poudre noire dans la liqueur furnageante, qui par-là restoit claire, ou simplement chargée d'une petite poudre rouge.

Pour sentir présentement toute la différence de ces effets des secondes solutions d'avec ceux des premières sur le Mercure pénétré des acides nitreux, & de combien cette différence l'emporte dans le cas présent sur celle qui a été observée dans le cas des deux sublimés; il n'y a qu'à considérer que l'action des premières solutions sur le Mercure pénétré des acides nitreux, ne se borne pas alors, comme dans l'autre cas, à répandre un peu plus ou un peu moins de poudre noire dans la liqueur furnageante presque aussi-tôt que la matière devient jaune, & à différer déjà par-là de l'action des secondes solutions sur la même préparation mercurielle; les premières solutions ont encore ceci de particulier dans le cas présent, c'est qu'elles noircissent vraiment la matière aussi bien & même beaucoup mieux que ne le font les secondes solutions, & de plus, avec cette différence, que la noirceur qui par les secondes solutions n'arrive qu'après plusieurs heures, ne demande souvent qu'un instant fort court pour arriver par le moyen des premières solutions, ce qui forme un spectacle curieux & singulier; car
aussi.

aussi-tôt que quelques gouttes de la premiere solution ont été versées sur la préparation mercurielle, on voit, pour ainsi dire, en trois instans differens la matiere devenir d'abord jaune, passer ensuite au rouge, & enfin du rouge au noir, & encore à un noir abondant qui rend la liqueur comme de l'encre, & qui s'empare si bien du petit tas de matiere solide qui est au fond, qu'ordinairement il en fait disparoître tout le rouge, & n'en laisse à la vue aucun vestige, à moins qu'on ne verse beaucoup d'eau sur la matiere, & qu'on ne l'écrase fortement avec les doigts, comme il a déjà été dit ci-dessus.

Il est cependant à remarquer, que suivant la nature de la matiere brulée, dont on a tiré la premiere solution dont on se sert, & aussi suivant que cette premiere solution est plus ou moins nouvelle, l'instant du passage du rouge au noir est plus ou moins court. Mais quoique ce passage se fasse quelquefois un peu attendre, il est cependant toujours assez prompt, & même infiniment rapide, quand on le compare & à celui qu'excitent les secondes solutions sur les Sublimés & sur notre préparation mercurielle, & à celui qu'excitent sur les Sublimés les premieres solutions elles-mêmes.

Quand ce passage n'est pas si vif, comme il n'est jamais long avec certaines solutions dont il sera parlé, on n'en apperçoit que mieux les trois couleurs qui se succedent, & qui prennent en quelque maniere la place les unes des autres; mais quelquefois ce passage qui se fait comme celui d'un éclair, éblouit

& permet à peine d'entrevoir les trois couleurs qui semblent à la vue s'aller perdre & noyer au-plutôt dans le noir.

Il est encore à remarquer que les premières solutions de toute matière végétale quelconque ne produisent pas le passage subit du rouge au noir dont on vient de parler. La première solution entre autres de la Potasse, du moins celle dont je me suis servi, n'a agi sur le Mercure pénétré des acides nitreux, & même sur les deux Sublimés, que comme le font toutes les secondes solutions des fels dont il a été parlé.

Parmi les premières solutions avec lesquelles j'ai vu opérer le passage subit du rouge au noir, quand elles ont été faites avec ébullition, celle qui m'a toujours paru demander un peu plus de tems que les autres pour son opération, c'est la première solution de la Cendre gravelée; le noir même qu'elle répand dans la matière, est moins abondant que celui des autres, & c'est pour cela que la liqueur furnageante de cette expérience, au-lieu d'être noire, étoit claire.

Avec les premières solutions de sel de Tarte & de sel de Soude, versées séparément sur deux portions de la préparation mercurielle, l'arrivée du jaune & le passage du jaune au rouge, & du rouge au noir, se sont faits plus vite que dans l'expérience précédente, mais ils se sont laissé distinguer; & dans ces deux mélanges le noir a été encore bien plus abondant que dans le précédent, aussi la matière du fond en a-t-elle été toute
re-

recouverte, & la liqueur en est elle devenue comme de l'encre.

Je remarquerai à cette occasion, que la première solution de sel de Soude avec laquelle j'ai fait la première fois l'expérience dont on vient de parler, me manquant presque, & n'agissant plus avec la même vivacité que devant, parce qu'elle étoit devenue ancienne; j'ai fait bouillir à différentes reprises dans l'eau une même quantité de la Soude que j'avois déjà mise en usage, & j'ai scrupuleusement observé pour chacune de ces premières portions de sel de Soude, la même manœuvre dont je m'étois servi d'abord: cependant il est arrivé, malgré cette attention, que deux de ces premières portions n'ont pas plutôt fait venir le noir dans l'expérience dont il s'agit, que le fait la seconde solution du sel de Soude; ce qui prouve combien les circonstances qui font réussir cette expérience sont délicates & faciles à manquer.

Enfin de toutes les liqueurs, celle avec laquelle j'ai vu le noir succéder le plus promptement aux deux autres couleurs, c'est la solution de la Pierre à cauter. Dès qu'on a mêlé quelques gouttes de cette liqueur à notre préparation, on apperçoit bien un peu le jaune qui vient d'abord, mais le noir se presse si fort d'arriver ensuite, qu'il passe, pour ainsi dire, par dessus le rouge, & le fait disparaître dans l'instant. Ce n'est cependant pas par l'abondance du noir qu'excite la solution, que ce noir arrive si-tôt, mais par la vivacité & l'action brulante du sel que contient la solution; & en effet, après l'expé-

rience qui dure bien peu de tems à se faire, la liqueur qui furnage la matiere du fond, se trouve claire, & cette matiere se trouve aussi moins noire que celle de la premiere solution de la Soude ou de celle du Tartre.

On remarquera, que malgré tout ce qui vient d'être rapporté de la solution de la Pierre à cauter, ce n'est point une premiere solution, ce n'en est réellement qu'une seconde, & qui agit plus vivement qu'une premiere: mais il faut observer que le sel de cette solution étant celui de la Cendre gravelée, il contient déjà les parties de feu que ce sel a amassées, & il y réunit encore celles qu'il a tirées de la Chaux avec laquelle il a été mêlé, ce qui lui donne la propriété âcre & brulante qu'il n'avoit pas, du moins dans un aussi haut degré, étant simplement sel de Cendre gravelée, & que n'ont point aussi tous les autres sels fixes. Par cette opération de la Pierre à cauter, la Cendre gravelée, dont la premiere solution agissoit avec moins de promptitude pour la production du noir, que les premieres solutions du sel de Tartre & de celui de Soude sur le Mercure pénétré des acides nitreux, devient, comme on voit, plus active à cet égard que ces deux Solutions: ce qui m'a paru mériter d'être remarqué.

Expériences sur le troisieme Sublimé fait avec le Mercure coulant, le Vitriol & le Sel commun, suivant les doses ci-devant rapportées.

Voici encore d'autres expériences nouvelles,

les, très différentes de toutes celles qui les ont précédées, & absolument nécessaires pour l'éclaircissement complet que je me suis proposé de donner dans ce Mémoire sur l'épreuve prétendue du Sublimé corrosif.

J'ai donc fait, ainsi qu'il a été dit, du Sublimé avec le Mercure coulant, le Vitriol & le Sel commun. J'ai versé sur différentes portions de ce Sublimé, qui étoit fort blanc, toutes les liqueurs alkalines employées dans les expériences précédentes; la plus grande partie de ces liqueurs l'ont fortement noirci tout aussi-tôt, quelques-unes n'ont fait que le brunir, & encore après un peu de tems, mais elles l'ont toujours rendu par-là très différent de ce qu'il étoit auparavant; & avant que le noir ou le brun succédât au blanc de toute la matiere, & en prît la place, aucune de ces liqueurs, ce qui est à remarquer, n'y a fait naître du jaune ou du rouge, ni rien qui en approchât, comme dans les expériences précédentes.

Il n'a point été question avec ce Sublimé, de la distinction d'effets des premières & des secondes solutions à l'égard de la liqueur furnageante, & de la petite masse qui étoit au fond; c'est le Sublimé seul qui en a reçu l'impression; & le noir s'est si peu répandu dans la liqueur qui le furnageoit, & a été si peu en état de s'y répandre & d'y demeurer, qu'en versant encore un peu d'eau sur la matiere, l'écrasant & la remuant avec les doigts, la liqueur n'en a pas acquis pour cela la couleur du Sublimé, comme elle le fait en pareil cas, avec les deux autres Sublimés dont il a été
par

parlé, & dans lesquels il se forme toujours une poussière fine & assez légère, pour occuper, du moins pour un tems, l'étendue de la liqueur, & ne s'en pas précipiter à l'instant.

Les premières & secondes solutions qui ont véritablement noirci le Sublimé, & qui l'ont fait sur le champ, ce sont celles 1^o. de plusieurs sels tirés depuis peu & de différentes manières, du Tartre blanc; 2^o. les deux solutions du sel de la Cendre gravelée qui avec les autres Sublimés ne produisoient presque point de noir; 3^o. celles du Nitre fixé par les charbons; & enfin celles du sel de la Soude, qui est celui qui a d'abord noirci plus que tous les autres, & dont le degré de noirceur est toujours resté le même par rapport à celui qu'avoient excité les autres sels.

La solution de la Pierre à cauterer a aussi noirci d'abord le Sublimé, mais moins que n'avoit fait le sel de la Soude, & d'une nuance moindre que n'avoit fait aussi le sel de la Cendre gravelée.

La première solution de la Potasse n'a d'abord rien fait sur le Sublimé, mais quelque tems après elle l'a fortement bruni, & en est restée là dans la suite, à la différence de la seconde solution du même sel qui a promptement noirci le Sublimé.

Je ne puis passer ici sous silence une autre singularité ou bizarrerie d'expériences, qui m'a paru d'autant plus digne de remarque, qu'elle donne naturellement lieu à une conséquence qui va bien-tôt trouver une juste application.

Je viens d'observer que les premières & les se-

secondes solutions de plusieurs sels de Tartre que j'avois fait depuis peu, avoient d'abord & fortement noirci notre troisieme Sublimé. Cependant un sel de Tartre très alkali, que j'avois fait aussi, mais anciennement, & qui a servi sous le titre d'ancien sel de Tartre dans les expériences précédentes, versé sur ce troisieme Sublimé, incapable de jaunir & de rougir, & susceptible seulement de noircir par les sels fixes & lixiviels, n'y a d'abord rien fait, & l'a seulement bruni à la longue, mais moins que n'avoit fait la premiere solution de la Potasse. Et ce qui fait encore paroître davantage le singulier & l'extraordinaire de ce fait, c'est que cet ancien sel de Tartre qui, en comparaison des premieres & secondes solutions du nouveau sel de Tartre, fait peu de choses sur le troisieme Sublimé, noircit beaucoup & autant les deux premiers Sublimés, que le fait la seconde solution du sel de Tartre nouveau, & plus que la premiere du même sel, & qu'encore plusieurs autres premieres solutions d'autres sels, qui en récompense agissent bien davantage, & plus fortement que l'ancien sel de Tartre sur le troisieme Sublimé, qui semble les dédommager de ce qu'elles ont de moins, & de ce que l'ancien sel de Tartre a de plus qu'elles sur les deux autres Sublimés.

Il n'est pas aisé de rendre raison de cette singularité, non plus que de quelques autres qui ont été rapportées dans ce Mémoire; il nous faudroit pour cela de nouveaux faits, & de nouvelles observations, qui viendront peut-être dans la suite nous éclairer. Ce n'est que

que par les lumieres expérimentales, qu'on peut voir clair dans la Physique, & ce n'est qu'avec de pareils secours qu'un Chimiste doit se permettre d'interpréter la Nature.

Il nous reste présentement à faire usage, & à tirer de justes conséquences de toutes les expériences dont il a été parlé dans ce Mémoire.

1^o. Le fait allegué par Barchusen, du noir qui succede au jaune & au rouge dans le Sublimé corrosif ordinaire arrosé d'huile de Tartre, se trouve parfaitement justifié par l'assemblage & le concours unanime de la multitude d'expériences qui ont été faites sur les deux premiers Sublimés, & sur le Mercure pénétré des acides nitreux, & cela non seulement avec une simple solution du sel de Tartre, mais encore avec ce sel considéré en plusieurs états differens, & avec plusieurs autres sels fixes considérés aussi en differens états, & qui tous, sans se démentir, attestent la vérité de ce fait; de maniere que si, par une espece de mal-entendu, il a été proscrit, & en quelque sorte dégradé dans nos Mémoires, il s'y réhabilite par la foule d'autres faits qui déposent clairement en sa faveur.

2^o. Si, suivant nos observations, le sel de la Cendre gravelée, & celui de la Pierre à cautere, qui à proprement parler sont deux sels de Tartre, excitent bien moins le noir dans les deux premiers Sublimés, que les autres sels de Tartre dont il a été parlé; pourquoi le hazard n'a-t-il pas pu faire tomber entre les mains de feu M. Boulduc, un sel de Tartre qui y a fait encore moins que ceux de la Cendre gravelée, & de la Pierre à cautere, c'est-

c'est-à-dire, rien du tout; ou si peu de chose que l'effet n'en a point été sensible? Le même hazard a bien su me faire retrouver un ancien sel de Tartre de ma façon, qui, sur le troisieme Sublimé seulement, fait presque l'opposé d'autres sels de Tartre que j'ai faits depuis; du moins, au lieu de noircir ce troisieme Sublimé dès qu'il y a été versé, comme le font les autres sels de Tartre, il y demeure longtems, ainsi que nous venons de le remarquer, sans paroître y rien faire, & il n'y produit à la longue qu'un petit effet en comparaison des autres.

Le sel de Tartre de notre Auteur a donc pu être à-peu-près à l'égard de celui de Barchusen sur le Sublimé corrosif ordinaire, qui est celui sur lequel nos premieres expériences ont été faites, ce qu'a été notre ancien sel de Tartre à l'égard du nouveau sur le troisieme Sublimé. Cette conjecture soutenue des expériences qui viennent d'être alléguées en faveur du fait de notre Auteur, tout contradictoire qu'il est à celui de Barchusen, dont nous avons pris la défense; cette conjecture, dis-je, devient une certitude, quand on fait réflexion que M. Boulduc a fait voir en pleine Académie, la vérité du fait avancé contre celui de Barchusen.

Enfin les expériences faites sur notre troisieme Sublimé qui ne contient point d'Arse-
nic, & qui cependant noircit d'abord, & fortement, dès qu'on y verse la solution de quelque sel fixe, non seulement nous fournissent une preuve complete & décisive de la fausseté du moyen dont on s'étoit avisé de

de se servir, pour distinguer & reconnoître le Sublimé corrosif sophistiqué d'Arsenic; mais elles nous indiquent encore de quelle manière, & par quelle aventure cette erreur a pu se glisser, & s'établir, comme elle a fait, pour une vérité. Supposons qu'un Sublimé parfaitement semblable à notre troisième Sublimé; soit tombé entre les mains de quelque Chimiste, capable d'en imposer par sa réputation de probité, & que de l'huile de Tartre répandue par cas fortuit sur ce Sublimé l'ait aussi-tôt noirci; ce Chimiste qui avoit fait plusieurs fois du Sublimé corrosif ordinaire avec le Vitriol, le Sel commun, & le Mercure dissout par l'esprit de Nitre, & qui avoit remarqué que dans l'instant qu'on versoit de l'huile de Tartre sur ce Sublimé, il ne noircissoit pas, mais jaunissoit ou rougissoit, n'a pas manqué de faire ses réflexions sur la singularité du nouveau fait qui, pour ainsi dire, s'étoit présenté de lui-même à sa vue, & sans qu'il l'eût cherché; & la prévention bien ou mal fondée où l'on a toujours été, & où l'on est encore, de la sophistication du Sublimé corrosif par l'Arsenic; lui ayant fait imaginer que ce nouveau Sublimé qui ne jaunissoit ni ne rougissoit point par l'huile de Tartre, pourroit bien ne devoir sa couleur noire qu'au mélange de l'Arsenic, il y a lieu de croire que cette idée lui a tellement plu, qu'il l'a trouvée si juste, & l'a saisie de manière qu'il n'a pas même daigné la vérifier par l'expérience, & que la confiance avec laquelle il l'a distribuée comme un fait constant, & une découverte de sa


sa façon, a pu faire croire aux autres, qu'il s'étoit assuré par l'expérience, de la vérité de la chose, & qu'il seroit dorénavant inutile de la vérifier de nouveau. C'est apparemment ainsi que l'huile de Tartre est devenue l'épreuve du Sublimé corrosif : celui qui en a d'abord été noirci, a été taxé d'être arsénical, & chaque Auteur ayant avancé la même chose sur la foi les uns des autres, cette erreur méconnue, & prise pour une vérité constante, s'est ainsi perpétuée jusqu'à nous, & pourroit subsister encore telle, si le hazard ne s'en étoit peut-être mêlé, c'est-à-dire, si la suite de quelque expérience faite à l'occasion de toute autre chose que de cette erreur, ne se fût heureusement trouvée propre à jeter de la défiance sur son compte, à la faire entrevoir pour ce qu'elle est, & à donner lieu à de nouvelles expériences, dont les conséquences constataient davantage cette erreur. Quant à moi, je fais parfaitement que dans presque toutes les expériences que j'ai faites & avancées, soit pour la justification de Barchusen, soit pour démontrer la fausseté de l'épreuve du Sublimé corrosif par l'huile de Tartre, je n'avois pour objet, en les faisant, ni la justification de Barchusen, ni l'épreuve en question.

Quoique le noir subit qu'acquiert notre troisième Sublimé par l'huile de Tartre, ne prouve rien moins qu'un mélange arsénical dans ce Sublimé, il peut cependant être regardé comme une preuve certaine que ce Sublimé peche par un autre endroit. Et en effet, quand on l'examine, on découvre qu'il
n'est

n'est point dissoluble par l'eau, & qu'il a bien moins de force & de corrosion que celui qui s'y dissout. Qu'enfin quand on le fait sublimer assez de fois, & toujours avec du Vitriol calciné, & du Sel décrépit, les nouveaux acides qu'il acquiert par-là le rendent alors dissoluble dans l'eau, beaucoup plus corrosif qu'il n'étoit auparavant, & susceptible à l'instant, comme les autres Sublimés corrosifs, de la couleur jaune & rouge, par le moyen de l'huile de Tartre; de manière qu'à proprement parler, la couleur noire qu'excite d'abord cette liqueur sur un Sublimé, ne prouve autre chose, sinon qu'il est trop peu chargé d'acides pour être dissoluble, & avoir le degré d'activité & de force du Sublimé corrosif ordinaire. Aussi voyons-nous que le Sublimé corrosif le plus fort, le plus aisément dissoluble dans l'eau, & celui qui jaunit & rougit davantage par l'huile de Tartre, ayant été adouci par la perte de ses acides, & devenu par-là indissoluble dans l'eau, tel que le Mercure doux, & la Panacée, ne contracte plus à l'instant ni jaune ni rouge, mais une couleur très noire, par la solution du sel de Tartre; ce qui arrive encore de même au précipité blanc qui, faute d'un assez grand nombre d'acides, ne se soutient plus dans l'eau, comme il faisoit avant sa précipitation, & lorsqu'il en contenoit davantage.

Je finirai ce Mémoire par une réflexion: c'est qu'il est tout-à-fait triste que la voye des expériences, dont on tire de si grands éclaircissements, quand on fait en faire usage, don-

donne souvent lieu à de fausses inductions, & par conséquent à des erreurs d'autant plus dangereuses qu'elles s'établissent sur le pied de vérités incontestables. Et quoique la découverte de ces erreurs soit moins brillante, & flate moins son Auteur, que celle de quelque vérité, soit purement curieuse, soit utile, soit l'un & l'autre à la fois; cependant si l'on pesoit d'une part les inconvéniens de ces erreurs, & de l'autre les avantages de certaines vérités, on reconnoitroit peut-être qu'il vaudroit souvent mieux se défaire des unes, que de faire acquisition des autres.



RECHERCHES SUR LE TOUR.

SECONDE MÉMOIRE.

Par M. DE LA CONDAMINE.

Examen de la nature des Courbes qui peuvent se tracer par les mouvemens du Tour.

NOUS supposerons dans ce Mémoire toutes les notions préliminaires que nous avons données dans le précédent, concernant le Tour figuré, & sa principale piece appelée *Rosette*.

Outre toutes les différentes situations qu'on peut donner à l'outil, qui changent, comme on a vu, la figure tracée en conservant la même *Rosette*, le contour de la *Rosette* pouvant lui-même être varié à l'infini, il est clair

clair par ce qui a été expliqué, que l'on peut tracer sur le Tour une infinité de Courbes différentes. Mais comme la Courbe tracée, quelle qu'elle puisse être, a dans toutes les situations possibles de l'outil, un rapport nécessaire & dépendant du contour de la Rosette qui l'a produit, c'est ce rapport qu'on se propose d'examiner ici, & par-là de connoître en général la nature des Courbes qu'on peut tracer sur le Tour, en regardant comme connues celles qui forment le contour de la Rosette.

Outre le mouvement de rotation sur l'axe qui fait l'essence du Tour simple, & qui est commun à tous les Tours, & le mouvement de parallélisme qui est particulier au Tour figuré ordinaire, qu'on peut nommer *Tour à Rosette*; j'ai déjà remarqué que l'arbre du Tour pouvoit recevoir un troisième mouvement dans la direction de son axe. Ce mouvement, à l'aide d'une seconde touche, d'un second ressort, & d'une pièce appelée *Couronne*, qui fait en ce sens l'office de Rosette, sert à exécuter des creux & des reliefs sur le plan de l'ouvrage. La plupart des Tours figurés ont ce troisième mouvement, & cette mécanique est à-peu-près celle d'un Tour fort ingénieux & commun en Allemagne, dont on se sert pour copier des médailles. On conçoit que dans un Tour qui a ces trois mouvemens, & qu'on peut appeller *Tour à Rosette & à Couronne*, la pointe de l'outil change de plan, & que par conséquent la Courbe tracée devient à double courbure.

Le principal but qu'on se propose dans ce
Mé-

Mémoire, est d'examiner la nature des Courbes planes que l'outil trace dans le Tour figuré ordinaire, sur un plan parallèle à celui de la Rosette, en faisant abstraction du troisième mouvement qui feroit changer de plan à l'outil; & c'est cette espèce de Courbe plane que nous entendrons désormais sous le nom de *Courbe du Tour*.

Si l'on desire quelque chose de plus, après avoir trouvé, comme on le peut en décomposant les mouvemens du Tour, quelles sont dans un Tour qui a les trois mouvemens, les deux courbes qui seroient tracées chacune à part; l'une sur un plan parallèle à l'axe, en faisant abstraction du mouvement de parallélisme; l'autre sur un plan perpendiculaire à l'axe, en supprimant le mouvement direct de l'arbre: on pourra, par la méthode de M. Clairaut *, trouver la courbe à double courbure qui résultera de la combinaison de ces deux courbes planes considérées comme ses projections. Quant à présent, c'est des courbes planes qu'il est question.

Pour commencer par le cas le plus simple, on supposera d'abord la touche pointue, c'est-à-dire, telle qu'un seul & même point de la touche porte successivement sur tous les points du contour de la Rosette. On examinera ensuite les effets des touches plates, convexes, concaves, à roulette, &c. dont l'usage est réel ou possible; mais jusqu'à ce que nous fassions une nouvelle supposition, il est bon d'avertir que tout ce qui suit doit s'en-

* *Recherches sur les Courbes à double courbure. Paris 1730.*
Mém. 1734.

s'entendre dans l'hypothese de la touche pointue.

Il faut encore observer que par le nom d'*outil*, nous n'entendons qu'une seule pointe qui ne trace qu'un simple trait, telle que l'outil que les Tourneurs nomment *grain d'orge*.

Le rapport de la courbe tracée par l'outil au contour de la Rosette, n'est difficile à appercevoir que parce que l'outil opere sur un plan different de celui de la Rosette, & de plus mobile d'un double mouvement. Pour lever ces deux obstacles, 1°. nous rapporterons la courbe tracée par l'outil au plan de la Rosette, comme on a fait dans les figures du premier Mémoire. 2°. On supposera que l'arbre, & par conséquent que la Rosette n'a plus aucun mouvement, ni de parallelisme, ni de rotation, & on les remplacera par des mouvements équivalens qu'on donnera à l'outil. Tout ceci se concevra mieux par un exemple.

Soit la Rosette quarrée * $T\Theta\theta\tau$, dont le centre & celui de l'arbre du Tour est C . 1°. Le plan de l'ouvrage sur lequel l'outil trace la figure $O\omicron\omega\Omega$, plan qui, dans la construction ordinaire du Tour, est situé à l'autre extrémité de l'arbre, parallelement à la Rosette, sera ici supposé, rapproché & projeté sur le plan même de la Rosette $T\Theta\theta\tau$, tel qu'on le voit dans la figure. Cette supposition ne change rien d'essentiel à la construction du Tour, c'est seulement comme si la longueur de

de l'arbre qui n'est faite que pour la commodité de l'ouvrier, étoit réduite à un point, en sorte que la surface de l'ouvrage ou le plan sur lequel l'outil travaille, se trouvât contigu au plan de la Rosette.

Il est à propos d'observer que comme il a été plus commode dans la Machine du premier Mémoire, de faire faire le mouvement de parallélisme dans la ligne verticale, au-lieu que dans la construction ordinaire du Tour, l'arbre se meut horizontalement; on supposera ici dans toutes les figures, la touche en T au-dessus, & non à côté de la Rosette en t , ce qui ne change rien à l'effet.

22. L'axe de l'arbre réduit à un point étant représenté dans la figure par le centre C , le mouvement du point C , dans le plan de l'ouvrage, le long de la ligne CT , représentera le mouvement de parallélisme de l'arbre du Tour ordinaire; pour remplacer ce mouvement, en supposant la Rosette immobile, il faut concevoir que la touche T , & l'outil O sont adhérens au plan de l'ouvrage devenu par la supposition précédente, contigu au plan de la Rosette, & que ce même plan qui porte la touche & l'outil, est mobile, en sorte que son centre peut décrire la ligne TC .

Pour se bien représenter ce mouvement, il n'y a qu'à imaginer que le plan contigu à la Rosette, dans lequel nous avons fixé la touche & l'outil, porte une rainure ou coulisse dans la direction TC , qui lui permet d'aller & venir le long de cette ligne, en s'approchant ou s'éloignant du point C , pris sur le plan de la Rosette devenue immobile. De cette

maniere, quelle que soit la position de la touche T & de l'outil O ; ce mouvement du plan de l'ouvrage remplacera celui qu'a le centre de la Rosette le long de la même ligne TC , ou tC ; dans la construction ordinaire du Tour.

3°. Enfin, au lieu que le plan de la Rosette $T \odot t$, tournoit sur son centre C , la touche & l'outil demeurant immobiles en T & en O , ce sera le plan parallèle à la Rosette, & contigu, qui porte la touche & l'outil T & O , que nous ferons tourner sur le centre C , en rendant la Rosette fixe, ce qui est encore absolument la même chose.

La rainure TC du plan contigu à la Rosette permettant, par la seconde supposition, à la touche T , fixée sur ce plan, de s'approcher & de s'éloigner du centre fixe C de la Rosette, & par la dernière, le même plan étant mobile sur son centre, il est aisé de concevoir que ces deux mouvemens réunis donneront la facilité de promener la touche T sur les bords de la Rosette, en suivant les inégalités de son contour; l'outil O , entraîné par le même plan qui le porte, décrira le même trait que dans la construction ordinaire du Tour.

Tout ceci bien entendu, la solution de ces Problèmes dont l'un est l'inverse de l'autre, se présente d'elle-même.

P R O B L E M E I.

Le contour d'une Rosette quelconque, & la position respective du centre de la touche & de l'outil

L'outil sur un même plan étant donné; trouver sur ce plan tous les points du dessein qui en résultera?

PROBLEME II.

Un dessein ou un contour quelconque étant donné avec la position du centre de la touche & de l'outil, trouver sur le même plan tous les points du contour de la Rosette qui doit produire un pareil dessein?

Soit tout ce qu'on a déjà supposé dans la figure précédente, l'outil répondant au point O sur le plan de la Rosette, dans le moment où la touche porte sur le bord de la Rosette au point T . Que le plan contigu à la Rosette sur lequel la touche & l'outil sont fixés, commence à tourner sur son centre, en sorte que la touche partant du point T , porte toujours, en tournant, sur le bord de la Rosette; il est clair qu'elle répondra successivement aux points $T, \tau, r, \theta, \Theta$; mais par la même raison, l'outil partant du point O répondra dans le même ordre aux points $O, o, \circ, \omega, \Omega$; car, quand la touche sera arrivée au point T sur l'angle de la Rosette, la ligne TC dans laquelle se meut le centre du plan qui porte la touche & l'outil, la ligne TC , dis-je, sera transportée sur TC ; & la distance de la touche à l'outil étant toujours la même, en prenant sur TC , TO égal à TO , on aura le point O où répondra alors l'outil; on trouvera pareillement tous les points $o, \circ, \omega, \Omega$ de l'outil, correspondans aux points τ, r, θ, Θ , de la touche; on aura donc dans cette position de

T 3 l'outil,

l'outil, la figure. $O O o o \omega \Omega$, semblable à la *Fig. 3.* du premier Mémoire, où les positions de la touche & de l'outil étoient les mêmes.

Avec la même Rosette * $T \tau \theta$, si l'outil ou le crayon est placé de l'autre côté de la touche T au point O dans la ligne TC , prolongée au-delà du centre, on trouvera pareillement tous les points $O, O, o, o, \omega, \Omega$, de la courbe que doit tracer l'outil dans cette situation, en ouvrant le compas de la quantité TO , égale à l'intervalle qu'on a voulu mettre entre la touche & l'outil, & portant cette ouverture du compas TO de chaque point T, τ, τ , &c. du contour de la Rosette en O, o, o , &c. sur les rayons prolongés $TO, \tau o, \tau o$. Dans cet exemple, la courbe tracée sera pareille à celle de la *Fig. 4.* de l'autre Mémoire.

Si la touche étoit entre le centre & l'outil; par exemple, si l'outil étoit au point Q , plus loin du centre que la touche T , il n'y auroit pas plus de difficulté pour trouver les points de la courbe, & on s'y prendra toujours de la même manière, tant que le crayon & la touche seront dans l'alignement du centre, sur quelque point de la droite TC , prolongée ou non prolongée, que soit placé l'outil. Si on le suppose placé en Q , la touche étant en T , on trouvera la courbe $Q A B C E$, semblable à celle de la *Fig. 2.* du premier Mémoire, qui avoit été tracée avec la Machine, dans de pareilles circonstances.

Dans les exemples précédens, on a toujours.

* *Fig. 2.*

jours supposé l'outil dans l'alignement du centre & de la touche. Quand la position de l'outil est oblique, c'est-à-dire, lorsqu'il est placé hors de cet alignement, le cas devient un peu plus composé, mais on ne laissera pas de trouver les points de la courbe tout aussi exactement.

* Supposons, par exemple, l'outil placé hors de l'alignement de la touche & du centre au point O de la *Fig. 3*, la touche étant en T . Quand la touche sera parvenue en T ; on trouvera la place de l'outil ou crayon, en prenant le point O à même distance de la touche T , qu'étoit le point O de T , & sur la ligne TO qui fait le même angle avec le rayon TC , dans lequel est maintenant la touche T que faisoit TO , dans sa première situation, avec le rayon TC . Par la même raison, quand la touche sera arrivée au point t , en tirant to qui fera avec tC le même angle que TO avec TC , & prenant sur to prolongée, la distance to égale à TO , on trouvera le point o , & ainsi des autres, la suite des points $O, \dot{O}, o, o, \omega$, formera un contour semblable à celui de la *Fig. 9*. du premier Mémoire.

On trouvera de la même manière tous les points de la courbe, en quelque point que soit placé l'outil hors de l'alignement de la touche ou du centre, & nous retrouverions ici, en parcourant toutes les positions de la touche & de l'outil, toutes les figures du premier Mémoire, tracées dans les mêmes

cir-

* *Fig. 3.*

T 4

circonstances. Les trois exemples que nous venons d'alleguer, suffisent pour faire voir que dans tous les cas, soit que la position de l'outil soit directe ou oblique, on a un moyen sûr pour trouver tous les points de la figure tracée, ce qui est la résolution du premier Problème proposé : passons au second.

On suppose maintenant que le contour que doit tracer l'outil, est donné, les positions respectives du centre de la touche & de l'outil sont pareillement déterminées ; on cherche la Rosette qui, dans ces circonstances, produira le dessein donné. Il n'y aura pas plus de difficulté que dans l'autre cas.

Pour en donner un exemple sensible & différent des précédens, je suppose que l'on cherche la Rosette qui feroit tracer à l'outil le contour $O\circ o$ de la tête de profil représentée par la * *Fig. 4.* le centre commun de la Rosette cherchée & du dessein donné étant supposé en C , & la touche en T , quand l'outil est en O .

De chaque point O, O, o, o, ω , &c. pris sur le contour du dessein, on tirera par le centre C , les droites $OC, OC, oC, oC, \omega C$, prolongées indéfiniment, & portant une des pointes du compas ouvert de la quantité OT successivement sur tous les points O, O , &c. l'autre pointe marquera sur les lignes OC, OC , &c. prolongées, les points $T, T, t; T, \tau, \theta, \ominus$, qui formeront le contour de la Rosette cherchée ; & l'on aura la résolution du second Problème proposé.

Au-

Autrement, si l'on promène l'extrémité O de la ligne droite OT sur le contour $O, O, o, \&c.$ en sorte que la même ligne OT s'applique successivement sur les lignes $OT, ot, o\tau, \omega\theta, \Omega\Theta$, en passant toujours par le centre C , l'autre extrémité T de la ligne mobile OT tracera le contour de la Rosette $TTt, \&c.$ d'un mouvement continu.

C'est ce qui a donné l'idée de l'instrument dont on va donner la description.

Si la touche étoit supposée hors de l'alignement du centre & de l'outil, par exemple, au point $*T$, lorsque l'outil est en O , en sorte que OT fût un angle avec OC au point O , au lieu de ne faire avec OC qu'une même ligne droite, il faudroit, pour trouver tous les points $T, t, \tau, \&c.$ de la Rosette, observer de faire faire à cette ligne OT , mesure de la distance de la touche à l'outil dans ses différentes positions $OT, ot, o\tau, \&c.$ un angle aux points O, o, o, ω, Ω , avec les lignes $OC, oC, oC, \omega C, \Omega C$, toujours égal à celui que fait OT avec OC dans la première position, comme on l'a observé dans l'exemple de la position oblique. (*Fig. 3.*).

Chacune de ces deux Rosettes est l'unique qui puisse faire tracer à l'outil le contour du profil OOo dans les situations données des points C, T, O ; mais on conçoit que tous les changemens possibles de la situation de l'un de ces trois points, feront trouver une Rosette différente, capable de faire tracer à l'outil le même contour, si on a la liberté de pren-

* *Fig. 5.*

T_5

- prendre ces trois points à volonté, & que le dessein seulement étant donné, on cherche la Rosette la plus propre à le produire. Parmi les diverses positions respectives des points C , T & O , qui donneront autant de différentes Rosettes, on choisira, pour la facilité de l'exécution, celle qui donnera le contour le plus coulant & le moins anguleux, & celui dont les angles feront les moins aigus.

C'est dans cette vue, & en même tems pour plus de simplicité, qu'à moins de quelque raison particuliere, 1°. on prendra le centre C à-peu-près au-milieu de la figure.

2°. On préférera la position directe ou en droite ligne TCO de la touche du centre & de l'outil (*Fig. 30. du 1^{er}. Mém.*) à la position oblique TCO (*Fig. 31. du 1^{er}. Mém.*)

3°. On placera la touche & l'outil des deux côtés opposés du centre en T & en O , plutôt que du même côté du centre.

4°. On prendra le plus petit intervalle TC de la touche au centre, plus grand que le moindre CO du centre à l'outil, afin que le contour de la Rosette soit par-tout plus éloigné du centre commun que celui du dessein, & puisse l'embrasser.

En se rappelant ce qui a été observé plus haut, & dans le premier Mémoire, sur les diverses positions de la touche & de l'outil, on trouvera facilement les raisons du choix de ces circonstances, quelle que soit la situation respective de la touche & de l'outil, soit droite, soit oblique par rapport au centre; nous avons donc un moyen certain pour trouver tous les points

points de la figure cherchée sur le plan de la Rosette donnée, ou tous les points du contour de la Rosette qu'on cherche, sur le plan où est tracée la figure prescrite, ce qui est la résolution du double Problème que nous nous étions proposé préliminairement, pour mieux reconnoître le rapport qu'ont entre eux les deux contours.

Avant que de passer à cet examen purement géométrique, il nous reste à donner la description de l'instrument dont on vient de parler, qui fournit un moyen court & facile de trouver sur le champ, & de tracer d'un mouvement continu, tous les contours possibles des Rosettes, propres à exécuter un dessein donné, & réciproquement tous les desseins possibles que peut produire une Rosette donnée; & cela sans être obligé de limer des modèles en cuivre, comme dans la Machine décrite dans le premier Mémoire.

Cet instrument a les mêmes usages, & peut tenir lieu de la Machine de M. Grammare, dont on a parlé dans le premier Mémoire, qu'il appelloit son *Oracle*, & de laquelle on n'a pu avoir aucune connoissance.

* *ABCD* est une règle de trois pouces de long, percée d'une rainure dans sa longueur; la partie *AB* est percée de plusieurs trous en écrous, afin d'approcher ou d'éloigner plus ou moins la pointe *B*, dont la tête est faite en vis; cette règle est embrassée par les tenons *E*, *G*, d'une seconde règle aussi percée d'une rainure; la première peut glisser sous la seconde

de qui porte un petit barillet L , dont le ressort tire toujours à lui la règle de dessous qui lui est attachée avec un fil en D ; cette même règle porte une seconde pointe N , qui, par conséquent, tend toujours à s'approcher du centre P ; ce centre est déterminé par une troisième pointe P qui traverse les deux règles, & qui est fixée sur la règle de dessus EG , au point où l'on veut, avec l'écrou Z . Voici comme on se sert de cette Machine:

Soit le contour de profil d'une tête $*T$, pour lequel on cherche la Rosette la plus convenable; après avoir découpé ce profil en carte, on le colle sur une autre carte RS , ensuite on prend à volonté un point T pour centre au dedans du contour de la tête; on perce les deux cartes en ce point, & on les attache sur un plan, en y enfonçant la pointe P ; après quoi on pose la pointe N sur le contour de relief de la tête découpée; on tourne ensuite à la main, toute la Machine, en faisant toujours porter la pointe N sur le bord de la découpeure, ou mieux encore, on ne fait que tourner d'une main la carte sur son centre, en tenant de l'autre la Machine fixe, & en ayant attention que la pointe N ne quitte pas le bord de la carte découpée. Dans l'un & l'autre cas, la pointe B portant sur la grande carte RS , y trace le trait VX qui est le contour de la Rosette cherchée; la pointe N , rappelée sans cesse vers le centre P , par l'effort du ressort L , & repoussée par le relief du profil découpé, en suit aisément le:

* Planche I. Fig. B.

le contour, tant que ce contour ne s'éloigne pas du centre en ligne droite; c'est ce qu'il faut éviter autant qu'il est possible, en choisissant au dedans de ce contour, un centre pour placer la pointe fixe *P*. Si on ne peut empêcher que la pointe *N* n'accroche en quelque endroit, comme au-dessous du nez, par exemple, & que le contour découpé ait la pente trop roide, pour repousser la pointe *N* en glissant, il faudra aider un peu avec la main; mais on pourra sauver encore ce petit inconvénient, si on retrace le même trait en tournant le carton d'un sens opposé; de cette manière, la pointe qui ne pouvoit, par exemple, remonter sans le secours de la main, de la narine vers la pointe du nez, glissera sans difficulté, & sera rappelée par la force du ressort, de la pointe du nez vers la narine. En changeant de centre *P*, ou en éloignant plus ou moins les deux pointes *B* & *N*, on fera différens contours, & on choisira le plus coulant & le plus praticable sur le Tour, pour servir de modèle à la Rosette: avant que de la tailler, il est à propos de la vérifier, en découpant une carte sur le trait *VX* de la Rosette trouvée, & faisant porter une pointe sur le contour, pour voir si l'autre pointe *N* redonnera exactement le contour de la tête *T* qu'on se propose d'exécuter.

Dans cet instrument on a supposé la touche, le centre & l'outil en ligne droite, parce que cette situation est plus simple & plus commode pour la pratique. Si on étoit curieux de voir l'effet des positions obliques,

T 7

il

il feroit aisé, en ajoutant à l'extrémité A de la règle AD un petit bras mobile sur un clou qui lui serviroit de centre, de transporter hors de l'alignement du centre & de la touche la pointe B qui trace la Rosette, & de lui faire faire un angle quelconque avec cet alignement.

Nous voici parvenus à notre objet principal. Il est question de découvrir la nature de la Courbe tracée par l'outil du Tour. Le trait de la Rosette & celui du dessein étant rapportés sur un même plan, comme on en a donné les moyens, leur rapport va se manifester de lui-même.

Commençons par le cas le plus simple, & toujours dans l'hypothèse de la Touche pointue.

* Soit la droite AB (*Fig. 6.*) le côté d'une Rosette dont C soit le centre; soit TO pris en ligne droite sur CT , la distance de l'outil O à la Touche T . De l'usage expliqué de l'instrument précédent, & de ses mouvemens démontrés équivalens à ceux du Tour, il s'ensuit que tandis que la Touche T parcourt le côté AB de la Rosette, l'outil O demeurant toujours dans l'alignement de la Touche & du centre, & conservant sa même distance TO , à la Touche T , décrira

1°. La courbe OOO concave à l'égard du centre C , si l'outil est plus éloigné du centre que la Touche T , & situé par exemple en O , de l'autre côté de la ligne AB .

2°. La

* *Fig. 6.*

2°. La courbe $O' O' O'$, convexe par rapport au centre C , si l'outil est plus près du centre que la Touche T , & placé comme en O' en-deçà de la ligne AB .

3°. Enfin la courbe rentrante $O'' O'' O''$, si l'outil est situé par exemple en O'' de l'autre côté du centre C que la touche T .

On voit que les trois cas ont cela de commun que les points O, O', O'' , sont toujours dans les lignes TC, TC , prolongées, ou non prolongées, & que les lignes TO, TO, TO , sont égales entre elles, ainsi que $T O', T O', T O''$, $T O''$.

On reconnoit déjà cette courbe, tant à sa figure qu'à la manière de la décrire, pour la Conchoïde de Nicomede, dont C centre de la Rosette sera le *pole*, AB côté de la Rosette, la *base*, dont T la Touche sera le *point parcourant*, O l'outil le *point décrivant*, & OT distance de l'un à l'autre, la *mesure*. Ceci n'a pas besoin de démonstration, c'est une conséquence évidente de ce qui a été précédemment exposé.

Il faut observer que si d'ordinaire sous le nom de *Conchoïde de Nicomede* on n'entend que la première de ces trois courbes, c'est-à-dire $O O O$, ou quelquefois la seconde $O' O' O'$ produites l'une & l'autre en prenant des parties égales TO ou TO' sur les rayons tirés du pole C soit en-deçà soit au-delà de la base AB , il n'en est pas moins vrai que la courbe $O'' O'' O''$ qui a une portion en-deçà, & l'autre au-delà du pole C , & qui se décrit de la même manière & avec les mêmes conditions que les deux autres, est précisément la

la même espece de courbe, & que ce troisieme cas est renfermé comme les deux premiers dans l'Equation de la Conchoïde de Nicomede.

Mais deux circonstances distinguent la courbe du Tour généralement prise, de la Conchoïde de Nicomede; l'une, que celle-ci a toujours pour base une ligne droite, au-lieu que le côté de la Rosette qui sert de base à la courbe du Tour peut être une courbe quelconque; l'autre, que dans la Conchoïde de Nicomede le point décrivant qui trace la courbe est toujours dans l'alignement du pole & du point parcourant, au-lieu que dans la courbe du Tour la pointe de l'outil peut être située hors de l'alignement du centre & de la Touche, comme dans les positions que nous avons nommées *obliques*, & dont on a donné des exemples.

La courbe du Tour, prise en général, n'est donc pas une Conchoïde de Nicomede; mais comme les differences qu'on vient de remarquer n'alterent point le principe de génération, qui au fond est toujours le même, la courbe du Tour peut être considérée comme une sorte de Conchoïde plus générale que celle de Nicomede.

En effet soit la base * AB (Fig. 7.) représentant le bord de la Rosette, une courbe quelconque, au-lieu d'une droite, comme dans l'exemple précédent. Soit le point C le centre de la Rosette, & T le lieu de la Touche; si l'outil est situé au point O sur
 TC

TC prolongée, il ne manquera à la courbe OO^2O^1 qu'il tracera, pour être une Conchoïde de Nicomède, que d'avoir une base droite; mais si l'outil est situé au point Ω hors de la ligne TC , en sorte que la ligne $T\Omega$, distance de la Touche à l'outil qu'on a nommée la mesure, fasse un angle constant avec la ligne TC qui passe toujours par le pôle C , & que nous nommerons la Règle; la courbe $\Omega\Omega^2\Omega^1$ tracée par le point Ω sera une autre espèce de Conchoïde différente de la première.

De tout ce qui vient d'être observé, on peut tirer les conséquences suivantes, qui sont générales dans l'hypothèse présente de la Touche pointue, & qui, vu ce qui précède, paroîtront évidentes.

1°. Toute figure tracée sur le Tour est composée d'autant d'arcs de Conchoïdes prises au sens que nous venons d'expliquer, qu'il y a de lignes droites ou courbes qui composent le contour de la Rosette.

2°. Chacun de ces arcs de Conchoïde a pour base la partie du contour de la Rosette, le long de laquelle la Touche a glissé pendant que l'outil traçoit la courbe.

3°. Par conséquent ces arcs seront égaux ou semblables entre eux, si les côtés de la Rosette sont égaux ou semblables; ou ils ne le seront pas, si les côtés de la Rosette sont différens.

4°. Le Pole de tous ces arcs de Conchoïdes qui composent la figure tracée par l'outil, est le centre de l'ouvrage ou du plan sur lequel la figure est tracée, & ce centre répond à celui de la Rosette, chacun des deux étant un point de l'axe de l'arbre du Tour.

5°. Le

5°. Le point décrivant de toutes ces Conchoïdes est la pointe de l'outil qui, bien qu'immobile dans la construction ordinaire du Tour, trace sur le plan de l'ouvrage, au moyen du mouvement de l'arbre, la même ligne qu'il décrirait si l'arbre étoit immobile, comme nous l'avons supposé, & que ses mouvements fussent passés dans la touche & dans l'outil.

6°. Le point parcourant des mêmes Conchoïdes, c'est-à-dire, le point qui, dans la description de ces courbes, parcourt la ligne qui leur sert de base, est représenté sur le Tour par la pointe de la touche qui, quoiqu'immobile, fait le même chemin sur les bords de la Rosette tournante, qu'elle feroit si elle étoit proménée sur le contour de la Rosette immobile, comme on l'a fait voir. Ainsi dans la construction ordinaire du Tour, le point parcourant de la courbe tracée n'est pas situé sur la même surface où est tracée la courbe, c'est-à-dire, sur le plan de l'ouvrage, mais sur le plan de la Rosette, lequel lui est parallèle. On a donné le moyen de rapporter le contour de la Rosette & celui de la figure sur le même plan.

7°. La mesure de la Conchoïde, ou la distance entre le point décrivant & le point parcourant, est toujours sur le Tour, l'intervalle entre la pointe de la touche & la pointe de l'outil, rapportées sur le plan de la Rosette, ou sur tout autre plan parallèle, & cela quelle que soit la position de la touche & de l'outil, soit droite, soit oblique.

8°. Enfin la règle de ces mêmes Conchoïdes, ou la ligne tirée du point parcourant, passant par le pôle, & prolongée indéfiniment, sera sur le Tour la ligne tirée de la touche par le centre de la Rosette.

Pour

Pour distinguer les deux* especes de Conchoïdes $O^1 O^2 O^3$ & $\Omega^1 \Omega^2 \Omega^3$ (Fig. 7.) on nommera *Conchoïde directe*, la premiere OOO , dans laquelle la mesure TO est prise sur la règle TC prolongée; ayant déjà nommé *directe*, cette position de l'outil O dans l'alignement de la touche T & du centre C , on nommera par la même raison, *Conchoïde oblique*, la seconde $\Omega\Omega\Omega$, dans laquelle la mesure TO fait un angle Ω / C avec la règle TC , cette position de l'outil O hors de l'alignement de la touche T & du centre C ayant été déjà nommée *position oblique*.

Dans l'hypothese la plus simple que nous examinons actuellement, c'est-à-dire, dans l'hypothese de la touche pointue, dont un seul & même point touche les bords de la Rosette, ce sont donc, généralement parlant, des arcs de Conchoïde que décrit l'outil. Mais pour voir plus particulièrement quelles differences résultent dans la courbe tracée, des diverses suppositions qu'on peut faire, tant sur la figure de la Rosette, que sur la position respective de la touche & de l'outil, nous allons parcourir les divers cas que donne l'hypothese de la touche pointue, avant que de passer aux effets des autres touches; cela nous donnera lieu en même tems, de rappeler ce qui a été fait sur cette matiere; plusieurs des courbes dont il est ici question, s'étant présentées en diverses rencontres à de célèbres Mathématiciens, qui ne les ont pas toujours considérées sous l'aspect de Conchoïdes, sous lequel elles se réunissent.

Ic

* Fig. 7e

Je distingue trois cas principaux, qui comprennent tous les particuliers.

Le premier est celui où le côté de la Rosette est une droite, l'outil étant dans une position directe, ou dans l'alignement du centre & de la touche.

Le second, celui où le côté de la Rosette est courbe, l'outil étant pareillement dans une position directe.

Soit que le côté de la Rosette soit droit ou courbe, je n'en fais qu'un seul cas, lorsque la position de l'outil est oblique, ou hors de l'alignement de la touche & du centre; ce cas, qui est le troisième, est le plus général, & renferme tous les autres; & quoique les Tourneurs n'ayent pas jusqu'ici donné communément de position oblique à l'outil, on a fait voir dans le premier Mémoire, quels étoient ses usages & ses avantages.

Dans le premier cas, la courbe du Tour est une Conchoïde de Nicomede; on l'a vu, & cela est évident (*fig. 6.*

Dans le second il faut distinguer, car les côtés de la Rosette sont des arcs de cercle, ou des portions d'une autre courbe. Si ce sont des arcs de cercle, il y a encore plusieurs subdivisions à faire, car le centre sur lequel tourne la Rosette peut être pris, ou sur un point de la circonférence, ou en dedans, ou en dehors du Cercle-Rosette, & dans tous ces cas la distance de la touche à l'outil peut être égale au diamètre ou au rayon du même cercle, & plus grande ou plus petite qu'à l'un l'autre; on va voir pourquoi nous distinguons chacun de ces differens cas.

Si

Si le contour de la Rosette est circulaire, que le centre sur lequel tourne la Rosette soit pris sur un point de la circonférence du *Cercle-Rosette*, & que la distance de la touche à l'outil soit égale au diamètre du même cercle, la courbe du Tour sera celle sur laquelle M. Carré a donné un Mémoire en 1705*.

Pour le démontrer, il suffit d'observer que la courbe de M. Carré n'est autre qu'une Conchoïde dont la base est un cercle † PBG , le pôle un point de la circonférence P , & la mesure PG un diamètre du même cercle. M. Carré cite sur cette courbe un M. Koersma; à cela près, il la donne pour nouvelle. Cependant M. de Reaumur a démontré ‡ que c'étoit une portion de Cycloïde géométrique, ce qui n'empêche pas que ce ne soit aussi une Conchoïde, car il est vrai que M. Carré abandonne sa courbe au point C , presque à son origine, ne faisant parcourir à l'extrémité B du diamètre mobile PG qui devient βP , Bc & PC , que la demi-circonférence $G B P$ en dedans du cercle, sans doute parce que, pour parcourir l'autre PbG , il eût fallu que le diamètre mobile parvenu en PC , quittât le point fixe ou pôle P , ce qui n'étoit pas un obstacle, pourvu que son alignement prolongé passât toujours par le pôle. En continuant de faire parcourir avec cette condition, l'autre demi-circonférence PBG , au même point B , parvenu en P , du diamètre mobile, par le côté extérieur du cer-

* p. 71.

† Fig. 2.

‡ *Mém. de l'Acad.* 1708, p. 252.

cercle, l'autre extrémité c de ce diamètre décrira la portion CcF de la courbe jusqu'en F ; alors le point G ayant été transporté successivement en β , B , P , B , b & G , aura décrit la circonférence entière du cercle, étant parti du point G , & revenu au même point. Il n'y aura cependant encore que la moitié de la courbe tracée, car faisant parcourir une seconde fois la circonférence au même point b du diamètre mobile actuellement revenu en $F'G$, en faisant prendre successivement à ce diamètre les positions βx , PC , Bc , GP , telles que ce diamètre même ou son prolongement passe par le pôle P , on aura l'autre moitié ponctuée $F'xCcP$ égale & semblable à la première, & les deux ensemble composeront la courbe entière, dont on voit une moitié décrite dans le Traité de M. de la Hire sur les Conchoïdes *; duquel nous allons bien-tôt parler.

Cet Auteur remarque dans le même endroit †, qu'il y a longtems que cette espece de Courbe a été examinée par M. de Roberval; il faut même que M. de Roberval ne fût pas le premier qui en eût parlé, puisqu'il la nomme le *Limaçon* de M. Pascal. Au surplus, quoique la Courbe dont il est proprement question dans l'endroit cité de M. de la Hire, soit à l'œil un peu différente de la précédente, comme on peut voir par la Figure ‡, elle est au fond absolument la même. L'une & l'autre ont pour base un cer-

* *Mém. de l'Acad.* 1702. p. 76. fig. 9.

† *Ibid.* fig. 6.

‡ *Ibid.* fig. 6.

cercle, pour pole un point pris sur la circonférence, toutes deux ont une mesure fixe. Leur seule difference consiste en ce que M. Carré prend pour mesure une ligne égale au diametre PG , & que Mrs. Paschal & Roberval prennent une ligne égale au rayon SP qui fait que leur courbe $SCPCF$ rentre au dedans du cercle, ce qui ne change point la nature de la courbe. D'où il suit que la Courbe de M. Carré & le Limaçon de M. Paschal sont deux cas particuliers de la même courbe.

Quant à l'application de cette dernière au Tour, on voit que la distance entre la touche & l'outil étant prise égale au rayon, au lieu du diametre, comme dans le cas précédent, & le reste de la supposition demeurant le même, l'outil, au lieu de tracer la Courbe de M. Carré, tracera le Limaçon de M. Paschal.

On voit bien qu'en disant que l'outil trace telle courbe, on entend toujours la portion de cette courbe correspondante à l'arc de la Rosette qui sert de base.

Tant que le pole sera pris sur la circonférence du cercle, la figure de la courbe s'éloignera peu des deux précédentes. Si la mesure est prise plus grande que le diametre, la courbe aura dans son contour un point de rebroussement comme dans la *Fig. 8.* où la mesure étoit égale au diametre. Si elle est plus petite, comme *Fig. 9.* le point de rebroussement de la courbe deviendra un nœud d'autant plus petit que la mesure sera plus grande.

Si

Si le pole est pris au dedans du cercle, tant que la mesure sera plus grande que le diametre, la figure de la courbe differera peu de la *Fig. 8*. Elle commencera à avoir un nœud, quand la mesure sera plus petite que le diametre, & à approcher de la *Fig. 9*. Les Figures dans ces deux cas seront les mêmes que les *Fig. 33, 34. &c.* du premier Mémoire, qui appartiennent au Cercle excentrique pris pour Rosette. Il est évident qu'on a dû, pour ce qui concernoit la pratique du Tour, se borner dans le premier Mémoire à ces deux suppositions, puisqu'il ne seroit plus possible de tourner, si le centre de rotation étoit pris hors du contour de la Rosette.

On a vu que pour tracer la courbe entiere, quand le pole étoit pris sur la circonférence du cercle base, il falloit que la mesure parcourût deux fois cette circonférence, & non seulement lorsque la courbe avoit un nœud en dedans, mais lors même qu'elle n'avoit qu'un simple contour. Quand le pole est pris au dedans de la circonférence, il arrive tout le contraire, & soit que la courbe soit simple, soit qu'elle ait un nœud, une seule révolution de la mesure autour du pole suffit pour la tracer.

Enfin si le pole est pris hors de la circonférence, la courbe aura un grand nombre de différentes figures, selon les differens rapports qu'auront entre eux la mesure, le diametre du cercle, & la distance du pole au centre de ce même cercle. Mais la courbe aura toujours deux portions fermées & rentrantes en elles-mêmes; la plus voisine du pole pourra avoir

avoir la figure d'un 8 de chiffre, d'un fer de lance droit ou renversé, d'une amande, d'un ovale, d'un éventail, &c. la plus éloignée du pôle aura constamment une figure assez approchante d'une *lunule*, dont la largeur sera d'autant moindre, & les angles d'autant plus aigus, que la mesure sera plus grande. Tant que la mesure surpassera le rayon, les deux portions de la courbe seront isolées. Elles commenceront à se toucher, si la mesure est prise égale au rayon, & si on la fait plus courte, elles se croiseront.

Toutes ces courbes qui ont un cercle pour base, un pôle & une mesure constante, sont, comme on voit, des *Conchoïdes du cercle*. Quoique j'aye parcouru toutes leurs diverses combinaisons, je ne donne pas ici les figures de chacune en particulier, pour éviter un trop long détail. J'ai déjà remarqué que plusieurs avoient été examinées & considérées sous un autre aspect. Outre ce qui a été cité, on retrouvera trois de ces Courbes dans une Piece de M. Jean Bernoulli, insérée dans les Mémoires de Leipfick, année 1695, page 59, à l'occasion d'un Problème sur la Courbe le long de laquelle doit être suspendu un poids pour retenir un Pont-levis en équilibre dans toutes ses situations possibles.

M. de Reaumur, dans le Mémoire déjà cité, applique à toutes les Courbes possibles, prises pour base, le même principe de génération que M. Carré n'avoit employé que pour le Cercle. De plus, M. de Reaumur laisse la liberté de placer à volonté, en un point quelconque du plan, le point fixe que

Mém. 1734.

V

M.

M. Carré plaçoit seulement sur la circonférence de son cercle ; & par ces deux généralisations non seulement il renferme les cas du Limaçon de M^{rs}. Paschal & Roberval, la Courbe de M. Carré, & toutes celles du même genre qui ont un cercle pour base, mais il embrasse une infinité d'autres courbes.

Ainsi non seulement la Courbe du Tour est celle de M. de Reaumur, lorsque le côté de la Rosette est un arc de cercle ; mais encore quelle que soit la courbure de la Rosette, & en quelque point que soit pris le centre de rotation, ce qui s'étend à tout le second cas, c'est-à-dire, à *toutes les positions directes de l'outil, la Rosette étant à pans courbes*, & ce qui renferme éminemment le premier cas où *les côtés de la Rosette sont supposés droits*.

Il reste le troisieme, qui est le plus composé, & qui les comprend tous. C'est *celui de la position oblique de l'outil, soit que la Rosette soit à pans droits ou courbes*. Et on a fait voir que la courbe tracée dans ce cas étoit la nouvelle espece de Conchoïde prise au sens qui a été expliqué.

Après m'être assuré que la Courbe du Tour étoit une Conchoïde prise dans un sens plus étendu qu'on ne la prend ordinairement ; avant que de m'engager plus avant dans l'examen de sa nature & de ses propriétés, je voulus voir si personne n'en avoit traité. C'est en parcourant les Mémoires de l'Académie que j'ai trouvé ce que je viens de citer de M^{rs}. Carré & de Reaumur. Je tombai ensuite sur le savant Mémoire de M. de la Hire *sur les*

les Conchoïdes en général. La Conchoïde en général, suivant le résultat de sa définition, est une Courbe tracée sur un plan immobile par un point quelconque d'un plan mouvant, dans lequel il y a une ligne droite donnée de position qui passe toujours par un point fixe du plan immobile, tandis que l'extrémité de cette droite parcourt une base droite ou courbe tracée sur le même plan.

Ma surprise fut extrême, en voyant par cette définition qui comprend ce que nous avons nommé *Conchoïde directe*, & ce qu'on a appelé *Conchoïde oblique*, que cette courbe dans le point de vue sous lequel M. de la Hire la considère, est précisément celle dont nous venons de parler, c'est-à-dire, une Conchoïde rendue plus générale que celle de Nicomede, par le retranchement de ces deux conditions particulières, la *base droite*, & le *point décrivant pris dans la règle*, lesquelles restreignoient la courbe de l'ancien Géomètre. La Conchoïde de M. de la Hire * est donc exactement la courbe du Tour qu'il n'avoit pas alors en vue: il est assez singulier qu'en suivant son objet, il n'ait généralisé la Conchoïde ni plus ni moins, mais autant précisément qu'il étoit nécessaire pour rencontrer la courbe du Tour, à laquelle est applicable tout ce qu'il dit de ses Conchoïdes.

Je ne parle point ici d'un savant Ouvrage de Géométrie du R. P. Pierre Nicolas, Jésuite, publié en 1697, sous le titre *De Conchoïdibus & Cissoïdibus*, cet Auteur ayant adopté un

* *Mém. de l'Ac. 1703. p. 41.*

un autre principe de génération pour ses Conchoïdes, dont la mesure n'est constante que lorsque leur base est un cercle, ce qui fait qu'il n'y a que ce seul cas où sa Conchoïde soit la même courbe que la nôtre.

Les termes de *base*, de *pole*, de *mesure*, de *point parcourant*, & de *point décrivant* que j'ai employés, l'ont été dans le même sens par tous les Géomètres; j'ai emprunté de M. de la Hire celui de *règle*, l'ayant regardé non-seulement comme le plus propre, mais comme consacré en ce sens par l'usage qu'en a fait cet illustre Académicien. Les seuls termes nouveaux dont je me suis servi, sont ceux de *Conchoïde directe*, & de *Conchoïde oblique*, pour éviter une longue périphrase.

L'Ouvrage de M. de la Hire, dans lequel il donne des méthodes pour trouver les tangentes, les rectifications & les quadratures d'un grand nombre de courbes, a encore ce mérite particulier, qu'il est presque tout synthétique, & qu'il a par conséquent dû coûter beaucoup plus à l'Auteur.

Il reste peu à glaner dans un champ moissonné par des mains aussi habiles : cependant comme tout ce qu'a donné M. de la Hire ne regarde la courbe du Tour, que dans le cas de la touche pointue, les cas de la touche plate, & de la touche courbe nous restent tous entiers. D'ailleurs M. de la Hire n'a pas donné le moyen de trouver en général le lieu des Conchoïdes, soit *directes*, soit *obliques*, & il paroît même qu'il a au moins douté que ces dernières fussent géométriques, à en juger par ces paroles du Mémoire déjà cité

cité *, toutes les Conchoïdes qui ont pour base des lignes géométriques sont aussi des lignes géométriques, pourvu que dans la description de la Conchoïde, la mesure soit jointe directement à la règle. Avant donc que de passer aux effets des touches droites & courbes, on fera voir que toutes les Conchoïdes, soit directes, soit obliques, sans exception, qui ont pour base des lignes géométriques, sont aussi géométriques, en donnant le moyen d'en trouver toujours l'Equation en ce cas, ainsi que leurs tangentes, & les élémens de leur rectification & de leur quadrature; on fera aussi l'application de la méthode à l'exemple de M. de la Hire où il prend le cercle pour base, ce qui donnera lieu à quelques observations.

PROBLEME III.

La base † TN (Fig. 10.) étant donnée, trouver la Conchoïde directe OM, ou la courbe tracée par le point O pris dans la règle OL, mobile sur le point fixe ou pôle C, en sorte que dans les diverses positions OL, MQ de la règle, la mesure, c'est-à-dire, la partie OT, MN de la règle comprise entre les deux courbes, soit toujours égale à une grandeur donnée?

SOLUTION.

On cherchera deux Equations qui expriment le rapport des coordonnées CR, r ; RN, s de la base aux coordonnées CP, t ; PM, u de la courbe cherchée. On tirera de ces

* Pag. 62.

† Fig. 10.

ces Equations les valeurs de r , s en t & u ; & substituant ces valeurs dans l'Equation donnée de la base, on aura celle de la courbe cherchée.

E X E M P L E.

Soit la mesure ou ligne constante OR , ou $MN = a$, les triangles semblables CRN , CPM fourniront les deux analogies suivantes

$$CM, \sqrt{tt+uu}.CP, t :: NM, a.PR, t-r,$$

d'où l'on tire $t-r = \frac{at}{\sqrt{tt+uu}}$, ou $t - \frac{at}{\sqrt{tt+uu}} = r$.

$$CP, t.PM, u :: CR, t - \frac{at}{\sqrt{tt+uu}}.RN, s,$$

$$t u - \frac{t a u}{\sqrt{tt+uu}} = s,$$

d'où l'on tire $\frac{t u - \frac{t a u}{\sqrt{tt+uu}}}{t} = s$, ou

$$u - \frac{a u}{\sqrt{tt+uu}} = s. \text{ Il ne reste plus qu'à substituer ces deux valeurs de } r \text{ \& de } s \text{ dans l'Equation de la base } TN.$$

Soit cette courbe un cercle dont le diamètre soit CT, e , & l'Equation par conséquent $er - rr = ss$; les valeurs précédentes de r & de s étant substituées, on aura $e t - \frac{a e t}{\sqrt{tt+uu}}$

$$- (t - \frac{a t}{\sqrt{tt+uu}})^2 = (u - \frac{a u}{\sqrt{tt+uu}})^2. \text{ Et}$$

$$\text{divisant tout par } 1 - \frac{a}{\sqrt{tt+uu}} \text{ diviseur commun}$$

mun, on aura $et - t(\bar{t} - \frac{at}{\sqrt{tt+uu}}) = u(u$

$- \frac{au}{\sqrt{tt+uu}})$, ou $et - tt + \frac{att}{\sqrt{tt+uu}} = uu$

$- \frac{auu}{\sqrt{tt+uu}}$, ou $et = tt + uu - \frac{att+auu}{\sqrt{tt+uu}}$,

ou enfin $et = tt + uu - a\sqrt{tt+uu}$, Equation à la Conchoïde OM , & plus simple que celle que M. de la Hire * donne pour le même cas, & que voici $xx + yy + 4rr$

$- 2ry = 4r\sqrt{yy+xx} - \frac{4rry}{\sqrt{yy+xx}}$, ce qui

provient d'une réduction que M. de la Hire a négligé de faire: car en ordonnant ainsi

son Equation $xx + yy - 4r\sqrt{yy+xx} + 4rr = 2ry - \frac{4rry}{\sqrt{yy+xx}}$, on verra qu'en la divi-

fant par $\sqrt{xx+yy} - 2r$, racine quarrée du premier membre, elle se réduira à $\sqrt{yy+xx} - 2r$

$= \frac{2ry}{\sqrt{yy+xx}}$, & enfin à $2ry = yy + xx$

$- 2r\sqrt{yy+xx}$ qui deviendra précisément la même que la nôtre, en appelant t & u , les coordonnées CP , CM , que M. de la Hire a nommé dans son calcul y & x , en nommant e le diametre CT qu'il nomme $2r$, & enfin appelant a la mesure MN qu'il nomme encore $2r$, la supposant égale au diametre.

L'Equa-

* *Mém. de l'Ac. 1703. p. 68.*

L'Equation de cette courbe, de laquelle les inconnues montoient à six dimensions, suivant M. de la Hire *, peut donc s'abaisser au quatrième degré, & par conséquent cette Conchoïde dans le présent cas, est du même ordre que la Conchoïde de Nicomede.

PROBLEME IV.

La Conchoïde directe † OM (Fig. 11.) décrite par le point M sur le pôle C étant donnée, trouver le lieu de la Conchoïde oblique décrite par le point S, perpendiculaire sur la règle CM au point décrivant M de la Conchoïde directe?

SOLUTION.

On cherchera deux Equations qui expriment le rapport des coordonnées CP, t ; PM, u de la Conchoïde directe OM aux coordonnées CQ, x ; QS, y de la Conchoïde oblique cherchée. De ces deux Equations, on tirera les valeurs de t & u en x & y , on les substituera dans l'Equation donnée de la Conchoïde directe, & on aura l'Equation de la Conchoïde oblique que l'on cherche.

EXEMPLE.

On nommera a la perpendiculaire MS donnée, & on fera

$$CS^2(xx + yy) = CM^2(tt + uu) + MS^2(aa).$$

Donc $tt + uu = xx + yy - aa$. (P^{re}. Equation A.)

$CP,$

* Mém. de l'Ac. 1703. p. 62.

† Fig. 11.

$$CP, t. \quad PM, u :: CQ, x. QV, \frac{ux}{t}.$$

$$CP, t. CM \sqrt{tt+uu} :: MS, a. VS, \frac{a\sqrt{tt+uu}}{t}.$$

De ces deux analogies, on tirera.

$$QV, \frac{ux}{t} + VS, \frac{a\sqrt{tt+uu}}{t} = QS, y; \text{ ou}$$

$$ty = ux + a\sqrt{tt+uu}. \text{ (S}^{\text{de}} \text{ Equation B.)}$$

De l'Equation A, je tire $t = \sqrt{xx+yy-aa-uu}$.

& substituant dans B, j'aurai $y\sqrt{xx+yy-aa-uu}$

$$= ux + a\sqrt{xx+yy-aa}, \text{ ou } y\sqrt{zz-uu} = ux + az;$$

en faisant, pour abrégér le calcul, $xx+yy-aa=zz$; d'où l'on peut tirer la valeur de

u en x & en z : car en quarrant, on aura

$$yyzz - uuyy = uuxx + 2auxz + aazz;$$

& résolvant l'Equation, on aura après les ré-

ductions, $u = \frac{zzy - axz}{xx+yy}$ qu'il faut substituer

dans une des premieres Equations pour en

tirer la valeur de t dégagée de u . On choisira

l'Equation B où u n'aura qu'une dimen-

sion, si on prend la précaution de mettre à

la place de $tt+uu$ son égale $xx+yy-aa$,

ou pour le plus court zz ; c'est donc dans

$ty = ux + az$ qu'il faut substituer la valeur

de $u = \frac{zzy - axz}{xx+yy}$, & on aura après les ré-

ductions $t = \frac{zzx + ayz}{xx+yy}$ qu'il n'y a plus qu'à

substituer, en rétablissant la valeur de zz dans

l'Equation de la Conchoïde directe qu'on sup-

posée donnée, pour avoir la Conchoïde oblique, qui est ce qu'il falloit trouver.

PROBLEME V.

*La base * TN (Fig. II.) seulement étant donnée, le pôle étant C, la règle CM, trouver la Conchoïde oblique, ou la courbe tracée par un point quelconque S, situé hors de la règle, la mesure faisant au point N avec la règle CM un angle constant MNS.*

SOLUTION I.

On tirera une perpendiculaire SM du point décrivant S sur la règle CM , cette ligne sera connue étant le sinus de l'angle MNS donné. On cherchera par le Problème III. le lieu à la Conchoïde directe, décrite par le point M de la règle, rencontré par la perpendiculaire SM : cette courbe une fois connue, on trouvera par le Problème précédent, la Conchoïde oblique cherchée.

SOLUTION II.

Pour résoudre le Problème directement, & trouver la Conchoïde oblique, sans chercher la directe, il n'y a qu'à substituer les valeurs t & u des coordonnées de la Conchoïde directe, trouvées en x & y par le Problème précédent, dans les valeurs $r = t - \frac{at}{\sqrt{t^2 + u^2}}$ &

$$s = u -$$

$f = u - \frac{au}{\sqrt{tt+uu}}$ des coordonnées de la base

quelconque (*Probl. III.*). Substituant donc

$z = \frac{zzx+ayz}{xx+yy}$ dans cette valeur de r , en se

ressouvenant que $\sqrt{tt+uu} = xx+yy-aa$,
ou zz pour la facilité du calcul, on aura

$r = \frac{zzx+ayz-axz-aay}{xx+yy}$, & ré-

tablissant la valeur de z , on aura

$r = x + \frac{ay\sqrt{xx+yy-aa}-ax\sqrt{xx+yy-aa}-aay-aax}{xx+yy}$.

De la même manière, en substituant $u = \frac{xy-axz}{xx+yy}$

dans $f = u - \frac{au}{\sqrt{tt+uu}}$, on trouvera

$f = y + \frac{aax-ax\sqrt{xx+yy-aa}-ay\sqrt{xx+yy-aa}-aay}{xx+yy}$.

Ces deux expressions en x & y des coordonnées r & f de la base, serviront de formule générale pour trouver la Conchoïde oblique décrite par un point quelconque S , sans chercher la Conchoïde directe décrite par le point M ; il n'y aura qu'à substituer ces deux valeurs dans l'Equation de la base, & on aura l'Equation de la Conchoïde oblique cherchée.

PROBLEME VI.

La base * TN (Fig. 11.) le pole C, la mesure NS, & l'angle MNS de la mesure avec la

* Fig. 11.

la règle étant donnée, trouver immédiatement la Conchoïde oblique, sans se servir des valeurs des coordonnées de la Conchoïde directe.

S O L U T I O N.

On pourra trouver directement deux Equations entre les coordonnées r & f de la base & les coordonnées x & y de la Conchoïde oblique; on en tirera les valeurs de r & de f en x , & les substituant dans l'Equation de la base, on aura la Conchoïde oblique cherchée.

E X E M P L E.

Ayant nommé MN, a ; MS, b ; CR, r ; RN, f ; CP, x ; QS, y . Pour trouver le rapport de CR, r & RN, f à CQ, x & QS, y , on cherchera deux Equations, comme, par exemple, celles qui suivent, $QV + VS = QS$, & $CV + VM - CN = NM$, dont on trouvera les expressions algébriques par les analogies suivantes,

$$CR, r. RN, f :: CQ, x. QV, \frac{fx}{r}$$

$$CR, r. CN, \sqrt{rr + ff} :: MS, b. VS, \frac{bf}{r}$$

$$CR, r. CN, \sqrt{rr + ff} :: CQ, x. CV, \frac{x}{r} \sqrt{rr + ff}$$

$$CR, r. RN, f :: MS, b. VM, \frac{bf}{r}$$

$$\text{On aura donc } \frac{fx}{r} + \frac{bf}{r} = y, \text{ \& } \frac{x}{r} \sqrt{rr + ff} + \frac{bf}{r} - \sqrt{rr + ff} = a.$$

Il est évident qu'on peut tirer de ces deux Equations les valeurs de r & f en x & y , qui étant substituées dans l'Equation de la base TN , donneront une Equation entre x & y , coordonnées de la Conchoïde oblique tracée par le point S . *Ce qu'il falloit trouver.*

En résolvant ces deux Equations, on trouvera les mêmes valeurs de r & f qu'on a trouvées par une autre voye (*Prob. V.*).

PROBLEME VII.

Rectifier les Conchoïdes..

SOLUTION.

Soit Mm , la base * (*Fig. 12.*); A , le pôle; AMN prolongée indéfiniment, la règle; Tt , un arc infiniment petit de la Conchoïde, & MT qui fait en M , avec la règle, l'angle constant; TMN , la mesure de cette même Conchoïde. Tirez TN , perpendiculaire en N sur la règle AMN , tandis que le point parcourant M décrira l'arc Mm de la base, & le point T l'arc Tt de la Conchoïde oblique, le point N décrira l'arc Nn d'une Conchoïde directe, dont MN sera la mesure. Il est question de trouver la valeur des élémens Nn & Tt ; TM étant donné, ainsi que l'angle TMN , on aura MN qu'on fera $=a$, & $TN=b$.

On supposera que l'on ait l'Equation de la base Mm entre les rayons AM , Am (y),
qui:

* *Fig. 12.*

qui partent tous du pole A , & les arcs infiniment petits (dx) compris entre deux rayons consécutifs AM , Am . On aura donc $dx = MR$, & $dy = Rm$; on aura aussi $Sn = dy$, car SR & mn sont tous deux égaux à MN . Donc de SR & de mn , ôtant ms qui leur est commun, on aura $Rm = Sn$. On fera ensuite les analogies suivantes, pour trouver la valeur des élémens cherchés. Prolongez TN & tn qui se rencontreront en O , on aura AM , y

$$MR, dx :: AN, a+y. NS = \frac{adx+ydx}{y}$$

$= Vt$; NS & Vt étant les restes de deux quantités égales TS & Vn , dont on a retranché deux égales TN & tn , on aura aussi, à cause des triangles semblables ANS , OSn ,

$$MR, dx. AM, y :: SN. AN :: Sn, dy. SO \frac{ydy}{dx}$$

$$\& AM, y. Mr, dx :: TO, b + \frac{ydy}{dx}. TV \frac{bdx+ydy}{y}.$$

$$\text{Or } Tt = \sqrt{TV^2 + Vt^2}, \& Nn = \sqrt{NS^2 + Sn^2}.$$

$$\text{Donc } Tt = \sqrt{\left(\frac{bdx+ydy}{y}\right)^2 + \left(\frac{adx+ydx}{y}\right)^2},$$

$$\& Nn = \sqrt{\left(\frac{adx+ydx}{y}\right)^2 + dy^2}.$$

Il ne reste plus qu'à intégrer ces valeurs de Tt & Nn , pour avoir la rectification de ces deux courbes. Mais il faut pour cela avoir ces valeurs exprimées en une seule variable, ce qu'on tirera de l'Equation de la base qui est supposée donnée. Si l'Equation de la base supposoit des coordonnées perpendiculaires, comme AP , PR , on en tireroit par

par analyse la valeur de AM & Mr en une seule variable.

PROBLEME VIII.

Quarrer les Conchoïdes.

SOLUTION.

On fera les mêmes suppositions que dans le Problème précédent.

Pour avoir la quadrature des courbes décrites par les points * N & T (Fig. 12.) il faut trouver la valeur des deux élémens Mn & Nn & $NnTt$, dont les intégrations donneront les espaces renfermés entre la base Mm & la Conchoïde directe tracée par le point N , entre celle-ci & la Conchoïde oblique tracée par le point T .

Le Trapeze $MmNn$ ou $MRNS$ qui en diffère infiniment peu, & seulement de la différence des deux petits triangles MRm & NSn , est le produit de $\frac{MR+NS}{2} \times MN$, c'est.

à-dire, $\frac{dx + \frac{adx+ydx}{y}}{2} \times a$, qui se réduit

à $\frac{aadx + 2aydx}{2y}$.

Le Trapeze $NnTt$ ou $SnTV$ est $\frac{TV+Sn}{2}$

$\times TN$, ou $\frac{\frac{bdx+ydy}{y} + dy}{2} \times b$, qui se réduit à $\frac{bbdx + 2bydy}{2y}$.

L'Equa-

L'Equation de la base donnée exprimant le rapport de y à dx , on tirera la valeur de l'une ou l'autre de ces deux variables, & l'ayant substituée dans les élémens précédens, on aura leur valeur exprimée en une seule variable, & leur intégration donnera la valeur des espaces cherchés.

P R O B L E M E I X.

Trouver les Tangentes & les Perpendiculaires des Conchoïdes.

S O L U T I O N.

Les mêmes choses supposées que dans les deux Problèmes précédens, pour trouver la tangente * TG (Fig. 13.) de la Conchoïde Tt & sa perpendiculaire TQ , on tirera par le pole A , perpendiculairement sur la règle AM , une ligne qu'on prolongera de part & d'autre vers Q & vers G . Du point T , dont on cherche la tangente, on menera TF parallèle à la règle; & T prolongée rencontrera AF prolongée en quelque point G , & on aura la valeur de la sous-tangente GF par cette

$$\text{analogie, } TV, \frac{b dx + y dy}{y} . Vt, \frac{a dx + y dx}{y} \\ \frac{(a dx + y dx) y + a}{y} \\ \therefore TF, y + a . FG \frac{y}{b dx + y dy} \text{ qui se}$$

$$\text{réduit à } \frac{a + y dx}{b dx + y dy}.$$

$EA,$

* Fig. 13.

FA , prolongée de l'autre côté, rencontrera la perpendiculaire TQ en un point Q , & on aura la valeur de la sousperpendiculaire

FQ par l'analogie suivante, Vt , $\frac{adx+yd x}{y}$

$.TV$, $\frac{bdx+yd y}{y} :: FT, a+y . FQ = \frac{bdx+yd y}{y}$

$\times \frac{y+a}{\frac{adx+yd x}{y}}$ qui se réduit à $\frac{bdx+yd y \times a+y}{adx+yd x}$

$= \frac{bdx+yd y}{dx} = b + \frac{ydy}{dx}$. Donc AQ ou

$FQ - FA = \frac{ydy}{dx}$; d'où il suit que dx , MR

$.dy$, $Rm :: y$, $AM . \frac{ydy}{dx} AQ$. Ce qui fait

voir que les triangles AMQ , MRm , sont semblables, & que MQ est perpendiculaire à Mm , c'est-à-dire, à la base, ce qui donne cette propriété singulière de la Conchoïde Tt , que sa perpendiculaire, celle de la courbe Mm qui lui sert de base, & celle qui coupe la règle AM dans le pôle A se rencontrent au même point Q , ce qui fournit un moyen fort simple de mener une perpendiculaire à la Conchoïde. C'est aussi le résultat de la démonstration de M. de la Hire.

Si c'est la soutangente EF de la Conchoïde directe Nn qu'on cherche, le cas sera plus simple, la règle même AN tiendra lieu de la parallèle TF , & on trouvera la soutangente AE par cette analogie, Sn , dy

$.NS$, $\frac{adx+yd x}{y} :: AS, a+y . AE = \frac{adx+yd x}{ydy}$

×

$$\times \frac{dx \times a + y^2}{y dy}, \text{ \& la foupperpendiculai-}$$

$$\text{re } AL \text{ par celle-ci, } NS, \frac{a dx + y dx}{y} \cdot Sn, dy$$

$$\therefore AS, a + y \cdot AL = \frac{a dy + y dy}{a dx + y dx} = \frac{y dy}{dx}.$$

Dans ces deux cas, en se servant de la première formule une fois trouvée, & faisant $TN, b=0$, on trouveroit les mêmes valeurs pour la foutangente AE & la foupperpendiculaire AL , que par les deux analogies précédentes.

J'ai fait l'application de ces méthodes à divers exemples, en déterminant la base; je ne les mettrai point ici, pour ne pas sortir des bornes d'un Mémoire. Il nous reste d'ailleurs à examiner ce que devient la Courbe du Tour dans les différentes suppositions qu'on peut faire à l'égard de la Touche; tout ce qui précède, comme on en a averti, n'étant applicable qu'à l'hypothèse de la Touche pointue, ou dont un seul & même point toucheroit successivement tous ceux du contour de la Rosette, ce qui est le cas le plus simple, mais qui ne peut être rigoureusement vrai dans la pratique, quand même on se serviroit d'une Touche pointue.

Pour remplir l'objet qu'on s'est proposé, il reste donc à examiner les hypothèses de la Touche droite ou plate, & celles de la Touche courbe. Cet examen & les différens cas qui y sont renfermés me fourniroient seuls la matière d'un Mémoire assez étendu,

étendu, si le tems de notre départ qui approche, & les préparatifs qu'entraîne nécessairement un voyage * tel que celui auquel nous sommes destinés, me laissoient le loisir de mettre en œuvre tous les matériaux que j'ai rassemblés depuis que j'ai entrepris ces recherches. Je me contenterai donc d'en donner ici un extrait abrégé, & d'y joindre quelques Problèmes.

Jusqu'à présent la base de la Courbe du Tour a toujours été le contour même de la Rosette; ainsi qu'il a été démontré, le point parcourant dans l'hypothèse de la Touche pointue n'étant autre chose que la pointe même de la Touche qui suivoit le contour de la Rosette. Mais si on suppose que la touche est une ligne droite AT (Fig. 14.) ce n'est plus le point T qui appuie sur le bord de la Rosette; la courbe qu'il décrit est donc différente du contour de la Rosette, & c'est cette courbe qu'il faut chercher, si l'on veut avoir, dans les differens cas que peut fournir la touche rectiligne, la base de la Conchoïde décrite par l'outil du Tour.

La touche étant droite, le côté de la Rosette ne peut être que droit ou courbe; s'il est droit, il peut être plus petit, plus grand ou égal à la ligne droite qui représente la touche. Qu'il soit égal ou plus petit, on verra que cela revient au même. Si le contour de la Rosette est courbe, la touche rectiligne, si petite qu'elle soit, est plus longue qu'un côté

* Voyage de trois Académiciens envoyés par le Roi pour faire des Observations sous l'Equateur.

côté de la Rosette, qui alors est infiniment petit; mais la touche peut être ou extérieure ou intérieure à la courbe. Ce sont quatre cas différens à examiner.

Hypothese de la Touche rectiligne.

PROBLEME X.

*Trouver la Courbe décrite par le point * T (Fig. 14.) intersection de la Touche ab & de la droite CT, le côté de la Rosette étant AB, le centre C, & la Touche étant la droite ab égale au côté AB de la Rosette.*

SOLUTION.

Ce n'est plus ici, comme dans l'hypothese de la Touche pointue, le côté AB , dont tous les points rencontrent successivement le point T de la touche: ce sont au contraire les angles de la Rosette, par exemple, l'angle A qui glisse le long de la touche, & rencontre successivement tous ses points depuis a jusqu'à b . Ce mouvement peut être remplacé, en faisant mouvoir l'équerre aTO sur les points C & A , en sorte que le côté TO porte toujours sur C , & le côté aT toujours sur A . Il est clair qu'en ce cas le point T ou le sommet de l'équerre décrira un arc de cercle sur le point I qui partage AG en deux également.

Si la touche ab étoit oblique au côté AB de

* Fig. 14.

de la Rosette, l'angle aTO ne seroit plus droit, mais le point T n'en décriroit pas moins un arc de cercle (par la 23^{me} Proposition du 3^{me}. Livre d'Euclide).

La courbe du Tour ou la courbe décrite par le point O fera donc en ce cas la Conchoïde, dont l'arc de cercle décrit par le point T fera la base. Cette Conchoïde sera *directe* ou *oblique*, selon que le point décrivant O sera placé ou sur la règle ou hors de la règle TC .

On voit que soit que la touche soit égale à ab , soit qu'elle soit plus longue, comme FD , cela revient au même, puisque l'angle A de la Rosette ne peut jamais rencontrer la touche qu'au point a , & la quitte au point B .

PROBLEME XI.

*Trouver la Courbe décrite par le point T * (Fig. 15.) le côté de la Rosette étant AB , le centre C , & la Touche étant DF plus courte que AB côté de la Rosette.*

SOLUTION.

On remarquera que ce n'est plus ici le point T , mais le point D ou F qui porte sur le bord de la Rosette. Le point D ou F est donc le point parcourant qui se trouve ici transporté hors de la règle. Ainsi pour avoir un mouvement équivalent à celui du Tour, au-lieu de faire tourner la ligne TCO sur le point

* Fig. 15.

point *C*, en faisant suivre au point *T* le bord de la Rosette, c'est l'équerre entière *OTD* qu'il faut faire mouvoir sur le même point *C*, en faisant décrire au point *D* ou *F* le contour de la Rosette. Le Problème se réduit donc à celui-ci:

*Trouver la Courbe décrite par le sommet de l'équerre * D T O (Fig. 16.) dont la branche T O, prolongée indéfiniment, glisse sur le point fixe C, tandis que le point D de la branche T D parcourt une droite A B.*

On fera $CT = a$; $TD, td = b$; $CL, TG = x$; $GT = y$; $Lt = a + y$; $dG = \sqrt{bb - yy}$, & on dira $LC, x.Lt, a + y :: GT, y.dG, \sqrt{bb - yy}$.

D'où l'on tire $x\sqrt{bb - yy} = ay + yy & bbx - xxyy = aay^3y + 2ay^3 + y^4$, Equation générale de cette courbe qui donne pour les differens cas des figures très différentes, selon que $a > <$ ou $= b$. Ce détail nous meneroit trop loin.

Le point *T* † (Fig. 15.) ne décrit réellement sur le Tour que la portion supérieure à la ligne *AB*, commençant au point *D*, & finissant lorsque le point *D* de l'équerre rencontre le point *A* ou l'angle de la Rosette; alors c'est le point *A* qui glisse le long de la branche de l'équerre *DT*, & on retombe dans le cas du Problème X. Ainsi lorsque la touche *DF* est plus courte que le côté *AB* de la Rosette, le point quelconque *O* décrit à chaque demi-pan de la Rosette deux portions de Conchoïde, l'une qui a pour base la courbe

* Fig. 16.

† Fig. 15.

be précédente, l'autre qui a pour base un arc de cercle.

Si la touche DF n'étoit pas perpendiculaire à la règle CT ; si, par exemple, elle faisoit avec CT l'angle CQF , le sommet T de la fausse équerre décrirait une courbe d'un degré plus élevé, dont la précédente n'est qu'un cas particulier; la recherche de cette courbe seroit absolument étrangère à notre objet, & inutile pour parvenir à la courbe du Tour décrite par le point O dans le cas même où la touche seroit oblique. Il suffit que quel que soit l'angle en T , l'équation précédente donnera toujours la courbe décrite par T , point de concours de la règle CT , & de la perpendiculaire DT tirée du point décrivant D sur la règle, & cette courbe sera toujours la base de la Conchoïde, soit directe, soit oblique, décrite par le point O .

PROBLEME XII.

Trouver la courbe décrite par le point T^* (Fig. 17.) la courbe AB étant le côté de la Rosette, le centre étant C , & la touche étant une droite quelconque DF , tangente à la Rosette successivement dans tous ses points.

SOLUTION.

Pour remplacer ici le mouvement ordinaire du Tour, la double équerre $DTCF$, composée de la règle TC , & de la touche DF doit

doit se mouvoir, en sorte que le point D , par exemple, suive le contour AB de la Rosette, sans que le côté DI coupe jamais la courbe; ce qui est nécessaire, puisque la touche du Tour ne peut que s'appuyer sur le bord intérieur de la Rosette. On voit que dans ce cas, la touche DF , dans toutes ses situations possibles, sera toujours tangente à la Rosette dans le point E , & que la règle passant toujours par le point C , dans toutes les situations de DF , lui demeure toujours perpendiculaire en T . Or M. Clairaut a démontré *, qu'en tirant des perpendiculaires d'un point fixe sur les tangentes successives d'une courbe quelconque, les points de concours de ces perpendiculaires & des tangentes, seront dans une Epicycloïde. Le point T , ou le sommet de notre équerre mobile étant le point de concours de la tangente & de la perpendiculaire, décrira donc une Epicycloïde; & il suit de la même démonstration, que cette Epicycloïde sera sou-double de celle que décriroit le centre de la Rosette, en la faisant rouler sur sa pareille. La courbe du Tour, ou la courbe décrite par le point O sera donc en ce cas la Conchoïde directe ou oblique, dont l'Epicycloïde précédente sera la base.

Il reste un quatrième cas dans la supposition de la touche rectiligne, c'est celui où la touche seroit intérieure à la courbe qui sert de Rosette. Ce cas n'a pas lieu dans la pratique ordinaire du Tour où la touche, quell

* *Recherches sur les Courbes à double courbure, p. 106.*

quelle que soit la figure, ne porte jamais que sur le bord extérieur de la Rosette. Mais il seroit possible de pratiquer un rebord de champ à la Rosette, & en coudant la touche, de faire porter son plat sur ce rebord par dedans, ce qui fournit la matiere d'un nouveau Problème; on va examiner ce cas, parce qu'il en résulte une nouvelle espece de Conchoïde plus générale encore que celle de M. de la Hire.

PROBLEME XIII.

*Trouver la courbe décrite par le point * M (Fig. 18.) la courbe AC étant le côté de la Rosette, le centre étant C, & la touche étant une droite quelconque DMT, qui porte toujours par un point T sur le contour AB de la Rosette, du côté concave vers C.*

SOLUTION.

On voit que la difference du cas présent à celui de la touche pointue, consiste en ce que le point parcourant qui, dans le premier cas, étoit pris dans la règle, comme en *M*, est ici transporté hors de la règle en *T*, en sorte que la courbe donnée *AB* n'est pas, à proprement parler, & suivant la définition précédente, la vraie base des Conchoïdes tracées par les points *O*, *o*, mais une base empruntée, pour ainsi dire, que nous nommerons *fausse base*, pour la distinguer de l'autre

* Fig. 18.

tre qu'on appellera la *vraye base*. Le Problème se réduit donc à trouver la courbe que décrit le point M , ou la tête de l'équerre CMT , tandis que le point T parcourt la courbe donnée AB .

Soit $MT=a$, $CQ=p$, & $TQ=q$, coordonnées de la courbe donnée AB , parcourue par le point T ; $CP=r$, & $PM=f$, coordonnées de la courbe cherchée, tracée par le point M , on aura $MC\sqrt{rr+ff}$, & on fera les analogies suivantes, pour avoir les valeurs de p & q , exprimées en f & r .

$$MC, \sqrt{rr+ff}. MP, f :: MT, a. TR = PQ = \frac{af}{\sqrt{rr+ff}}$$

$$MC, \sqrt{rr+ff}. CP, r :: MT, a. MR = \frac{ar}{\sqrt{rr+ff}}$$

$$\text{Or } CQ = CP + PQ. \text{ Donc } p = r + \frac{af}{\sqrt{rr+ff}},$$

$$\& TQ = MP - MR. \text{ Donc } q = f - \frac{ar}{\sqrt{rr+ff}}.$$

Ces deux valeurs de p & de q , substituées dans l'Equation supposée donnée de la fausse base AB , donneront la courbe tracée par le point M , laquelle sera la base de toutes les Conchoïdes tracées par les points O, o , &c.

Si on veut trouver ces courbes O, o , directement, sans chercher la base Mm , on le pourra par le Problème suivant.

P R O B L E M E X I V.

La fausse base, ou la courbe * AB (Fig. 19.)
tracée

* Fig. 19.

tracée par le point parcourant T, pris hors de la règle CM, étant donnée, le pole étant C; trouver immédiatement la courbe du Tour, ou la Conchoïde tracée par un point quelconque S, sans chercher préalablement la courbe tracée par le point M servant de base à la Conchoïde SI.

SOLUTION.

Soit $SN=a$, $MT=b$, $MN=c$, $CR=p$, $RT=q$, $CP=x$, $PS=y$, $PO=z$; on pourroit se passer de cette troisième inconnue, mais on l'introduit pour la facilité du calcul, & on la fera disparaître ensuite. On aura aussi PR , ou $QH=p+x$, & $CO=\sqrt{xx+zz}$. On pourra faire les analogies suivantes,

$$CP, x. PO, z :: CR, p. RH, \frac{pz}{x}.$$

$$CP, x. CO, \sqrt{xx+zz} :: SN, a. SO, \frac{a\sqrt{xx+zz}}{x}.$$

$$CP, x. PO, z :: MT, b. HM, \frac{bz}{x}.$$

$$CP, x. PO, z :: SN, a. ON, \frac{az}{x}.$$

$$CP, x. CO, \sqrt{xx+zz} :: MT, b. HT, \frac{b\sqrt{xx+zz}}{x}.$$

$$CP, x. CO, \sqrt{xx+zz} :: HQ, p+x. HO, \frac{p+x}{x} \sqrt{xx+zz}.$$

D'où l'on tirera ces trois Equations.

$$SO + OP = PS.$$

$$\text{Donc } \frac{a\sqrt{xx+zz}}{x} + z = y, \text{ ou } a\sqrt{xx+zz} + zx = xy,$$

X 2

RH

$$RH + HT = RT.$$

$$\text{Donc } \frac{pz}{x} + \frac{b}{x} \sqrt{xx + zz} = q.$$

$$\text{ou } pz + b\sqrt{xx + zz} = xq.$$

$$ON + OH + HM = MN.$$

$$\text{Donc } \frac{ax}{x} + \frac{p+x}{x} \sqrt{xx + zz} + \frac{bz}{x} = c.$$

$$\text{ou } a + bz + p + x\sqrt{xx + zz} = cx.$$

Il est évident qu'avec ces trois Equations on peut faire évanouir z , & tirer les valeurs de p & q , coordonnées de la courbe donnée Tt , en x & y , coordonnées de la courbe cherchée Sf , qu'il n'y aura plus qu'à substituer dans l'Equation donnée, pour avoir celle de la courbe Sf que l'on cherche.

C O R O L L A I R E.

En faisant $a=0$, le point S deviendra le point N , & donnera, au-lieu de la Conchoïde oblique Sf , la Conchoïde directe Nn , tracée par le point N situé dans la règle MCN .

Remarquez que la courbe Sf ni la courbe Nn , ne sont Conchoïdes qu'à l'égard de la courbe que trace le point M , qui peut leur servir de base; mais considérée par rapport à la *fausse base* Tt , ce n'est plus une Conchoïde, ou c'en est une d'une nouvelle espèce, dont les Conchoïdes de M . de la Hire ne sont qu'un cas particulier. Au-lieu d'une ligne droite, comme Nicomede, l'Auteur moderne prend pour base une ligne quelconque; & au-lieu de prendre le point décrivant sur la

la règle, il le prend dans un point quelconque du plan. Nous ajoutons quelque chose de plus, ou plutôt nous retranchons une condition qui restreint encore la Conchoïde de M. de la Hire : car s'il laisse la liberté de prendre le point décrivant S hors de la règle MCN , il prend du moins son point parcourant M , toujours dans la règle; au-lieu que le point parcourant de la nouvelle Conchoïde peut, ainsi que le point décrivant, être pris dans un point quelconque du plan, sans aucune restriction.

On en pourra trouver les tangentes & les perpendiculaires, soit par la méthode ci-dessus indiquée, soit par celle de M. de la Hire, en réduisant auparavant la nouvelle Conchoïde à l'espèce dont il a traité, par la recherche de la courbe M , qui lui servira de base, comme on l'a enseigné Problème XII. Quant à la rectification & à la quadrature de la nouvelle courbe, voici le moyen d'en trouver les élémens, & le Problème proposé dans toute sa généralité.

PROBLÈME XV.

*Trouver les élémens * Mm , Nn , Tt (Fig. 20.) des courbes tracées sur le plan immobile, par les points M , N , T , du plan mobile, tandis que le point S du même plan parcourt la courbe donnée Ss . Trouver de plus la valeur des élémens $tTmM$, $SsnN$, pour avoir la quadrature des espaces renfermés entre les courbes Tt , Mm , Nn & Ss .*

S o-

* Fig. 20.

X 3

SOLUTION.

Soit $MT=a$, $MCN=b$, $NS=c$, $CP=x$,
 $PS=y$, on aura $CS = \sqrt{xx+yy}$; CN ,
 $\sqrt{xx+yy-bb}=z$, $CM=b-z$.

Le rayon étant supposé égal à l'unité, on
trouvera la tangente de l'angle $SCP = \frac{y}{x} = t$.

Donc la différentielle du même angle $\frac{dt}{1+t^2}$.

Par la même raison, la tangente de l'angle
 $SCN = \frac{c}{z}$. Donc la différentielle de l'angle

$$SCN = \frac{\frac{-cdz}{z^2}}{1 + \frac{cc}{zz}} = \frac{-cdz}{zz+cc}. \text{ Donc la dif-}$$

férentielle de l'angle $NC P$, ou le petit angle.

$$NCn = \frac{dt}{1+t^2} - \frac{cdz}{zz+cc}.$$

Maintenant pour avoir l'arc Nq , dont le
rayon est CN , on fera 1. $\frac{dt}{1+t^2} - \frac{cdz}{zz+cc}$.

$$\therefore z \cdot \frac{zdt}{1+t^2} - \frac{zcdz}{zz+cc} = Nq; \text{ \& comme}$$

mO , Nq sont des arcs de cercle, & que
 $MN=mn$, il suit que $MO=nq=dz$. Pour
avoir nM , je me fers des triangles sembla-
bles nlM , NCq ; car nlM est semblable à
 OrM , celui-ci à $MC O$, & $MC O$ à MCq ;
on fera donc $CN.NQ :: nl=MT.nM$.
Retranchant nM de OM , j'aurai nO ou tl ,
&c.

& je trouverai mO , en faisant $Cq.Nq :: Cm$
 $.mO = lT$.

Ayant les valeurs de $NQ, nq, mO, OM,$
 tl, lT , on aura tous les élémens des cour-
 bes cherchées Nn, Mm, Tt .

Voilà ce qui regarde la Touche rectiligne,
 il reste à examiner les effets de la Touche
 courbe.

Hypothese de la Touche courbe.

Au-lieu de supposer la touche pointue ou
 rectiligne, on peut supposer que c'est une
 portion de courbe; cette supposition n'a lieu
 dans la pratique, qu'à l'égard du cercle, puis-
 que, comme on a déjà remarqué, pour ren-
 dre le mouvement du Tour plus doux, la
 touche porte ordinairement à son extrémité
 une petite poulie ou roulette, contre laquel-
 le s'appuye le côté de la Rosette.

Tous les cas de l'hypothese de la touche
 courbe se peuvent réduire à deux; celui où
 le côté de la Rosette est une droite, & ce-
 lui où le côté de la Rosette est une courbe.

Si le côté de la Rosette est une droite, il
 est clair que cette droite sera tangente succes-
 sivement aux divers points de la courbe qui
 forme la touche. Le mouvement du Tour,
 en ce cas, sera remplacé, en supposant que
 l'angle mixtiligne * FTC (Fig. 21.) composé
 de la courbe TF qui représente la touche, &
 de la règle TCO , se meut en glissant sur le
 point C , en sorte que le côté AB de la Ro-
 sette est toujours tangent à la courbe TF .

On

* Fig. 21.

On voit qu'il n'y a en ce cas aucun point de la touche qui parcoure le côté AB de la Rosette; la ligne AB n'est donc point ici la base de la courbe tracée par l'outil du Tour situé en quelque point O ou o . Pour avoir cette courbe, il n'est question que d'en trouver une qui puisse lui servir de base, & il suffit pour cela de connoître une des courbes qui, dans le mouvement prescrit, seroit tracée par un des points de la règle TC . Nous choisirons comme la plus simple, celle que trace T , ou le point de concours de la règle OT ; & de la touche TF .

PROBLEME XVI.

Soit la courbe * TF donnée (Fig. 21.) attachée en T à la règle TC , prolongée indéfiniment vers O , & mobile sur le point fixe C . La droite TCO passant toujours par le point C , qu'on fasse mouvoir la courbe DF le long de la ligne donnée AB , qui lui sera tangente dans ses divers points Ff successivement; on demande quelle est la courbe Tt tracée pendant ce mouvement par le point T .

SOLUTION.

Soient $HG = x$, $GT = y$, coordonnées de la courbe cherchée Tt , $PF = u$ & $TP = z$, coordonnées de la courbe donnée TF , dont on connoît par conséquent la tangente $LF = t$, & la soutangente $LP = f$; on aura $LT = f - z$, & la distance donnée du point C à la ligne AB .

* Fig. 21.

AB fera $HC=a$; on cherche l'Equation de la courbe Tt .

Les triangles CTQ , CHL , LPF , LTG font semblables, on aura donc

$$PF, u . LF, t :: HC, a . CL, \frac{at}{u},$$

$$LF, t . LP, f :: CL + LT, \frac{at}{u} + f - z$$

$$CQ, x = \frac{ast + u f f - u f z}{u t}.$$

$$\text{On aura aussi } LT, t . PF, u :: LT, f - z$$

$$GT, y = \frac{f u - u z}{t}.$$

Ayant les valeurs de x & y en u & z , avec l'Equation de la courbe TF , on aura de quoi faire disparaître u & z , & il restera l'Equation de la courbe cherchée Tt , qui étant prise pour base, servira à trouver toutes les courbes que peut tracer l'outil dans ses diverses situations Oo , &c. On eût pu tirer ici, comme dans les Problèmes précédens, les valeurs de u & z en x & y ; mais elles eussent été mêlées de t & f , tangente & soutangente de la courbe TF , desquelles on n'a la valeur qu'en u & z .

Enfin, si le côté de la Rosette est une courbe, la touche étant à roulette, c'est comme si la règle $* MCO$ étoit attachée au cercle IND , & qu'on fît rouler ce cercle sur la courbe AB , en faisant glisser la règle MCO , sans jamais quitter le point C . Tous les points de la règle décriront en ce cas diverses courbes qui seront mutuellement les bases & les Conchoïdes les unes des autres.

X 5

Nous

Nous chercherons , comme la plus simple , celle qui est décrite par le point M , centre du cercle qui forme la roulette de la touche.

PROBLEME XVII.

*Trouver la courbe tracée par le point * M (Fig. 22.) centre du cercle IND , qui roule sur la courbe donnée AB , tandis que MIO , diamètre prolongé du même cercle , glisse sur le point fixe C , sans jamais s'en écarter.*

SOLUTION.

Le cercle IND touche la courbe AB en un point quelconque N , par où passe la tangente commune LN . Tirez LF à volonté , pour servir d'axe à la courbe donnée AB , & à la courbe cherchée MD , dont les coordonnées auront leur origine commune au point fixe C . Soit donc $CP=x$, $PM=y$, $CQ=u$, $QN=z$. MK parallèle à PQ , fera $u-x$. NK , prolongement de QN , fera $y-z$. Le cercle IND , & la courbe AB étant donnés , on aura le rayon $MN=a$, la perpendiculaire $NS=p$, & la sousperpendiculaire $QS=f$.

$$\text{On fera } NS, p . QS, f :: MN, a . MK, u-x = \frac{az}{p}.$$

$$\text{Donc } x = u - \frac{af}{p}.$$

$$NS, p . QS, z :: MN, a . NK, y-z = \frac{az}{p}.$$

$$\text{Donc } y = z + \frac{az}{p}.$$

* Fig. 22.

La

La relation entre u & z étant connue par l'Equation de la courbe donnée AB , on fera disparaître u & z , & on aura l'Equation cherchée en x & y de la courbe MD . Cette courbe peut servir de base à toutes les Conchoïdes décrites par les points O , o , &c. Et en donnant la courbure MD à la Rosette, & supposant la touche pointue, l'outil traceroit les mêmes courbes que dans le cas présent de la touche en roulette, & de la Rosette AB .

Si la règle prolongée IM ne passoit pas par le centre du cercle, mais en étoit une corde, ou si on supposoit à la touche une autre courbure que la circulaire, supposition qui n'a pas lieu dans la pratique, on ne pourroit employer avec le même avantage la perpendiculaire & la souperpendiculaire de la courbe AB . Il faudroit chercher plusieurs analogies entre les coordonnées des trois courbes, & on pourroit se servir des méthodes employées dans quelques-uns des Problèmes précédens; mais le calcul en seroit long, & d'ailleurs inutile au but que nous nous sommes proposés: ainsi nous nous en tiendrons là.

On a donc démontré que dans le cas de la touche pointue, la courbe tracée par l'outil du Tour étoit toujours une Conchoïde prise suivant la définition de M. de la Hire; & quoique cela ne soit plus vrai hors de cette hypothèse, pour ramener la courbe du Tour au même point de vue dans toutes les suppositions qu'on peut faire sur les diverses figures de la touche, on a donné le moyen de considérer toujours la courbe tracée par

X 6.

l'outil,

l'outil, comme une Conchoïde, en cherchant dans les divers cas de la touche rectiligne ou curviligne, la courbe qui peut servir de base à celle du Tour prise pour Conchoïde, c'est-à-dire, pour en faire l'application au Tour, la courbe dont il faudroit que la Rosette eût la figure, pour faire suivre à l'outil le même trait, en supposant la touche pointue.

Quelle que soit la figure de la Rosette & de la touche, & quelle que soit la position de l'outil, on a donc le moyen de reconnoître la nature & l'espece de courbe tracée par l'outil du Tour, ce qui est l'objet qu'on s'étoit proposé.

Je n'ai point parlé des Tours dont l'arbre fixe par une extrémité, n'est mobile que par l'autre, comme un levier de la seconde espece. La seule difference entre l'effet de ceux-ci, & l'effet du Tour parallele que nous avons décrit, consiste en ce que dans ceux dont il est ici question, la figure tracée peut, en conservant ses proportions, devenir plus ou moins grande, en approchant ou en éloignant seulement l'ouvrage de la Rosette; au-lieu que dans le Tour parallele, la distance de la Rosette à l'outil, n'apporte aucun changement dans les dimensions de la figure.

Il y a aussi des Tours dans lesquels l'arbre, au-lieu de se mouvoir parallelement à lui-même, est porté par deux poupées mobiles, sur un axe commun parallele à l'arbre, en sorte que l'axe de l'arbre, au-lieu de se mouvoir dans un plan, se meut dans la superficie d'un cylindre, & que le centre de la Rosette,

au-






Fig. A.





T

t

4.

Ω

ω


o

o



&c

Fig. 10.






Fig. 16.





Fig. 15.

B

Fig. 14.








Fig. 19.





au-lieu de décrire une droite, comme il la décrit dans son mouvement alternatif de parallélisme, que nous avons expliqué, décrit un arc de cercle. Il est vrai que la hauteur des poupées étant d'un ou deux pieds, le rayon de ce cercle est si grand par rapport au petit arc que décrit le centre de la Rosette, que cet arc peut être pris sensiblement pour une ligne droite; & la construction de ce Tour n'est faite que pour en éviter une plus composée, que demanderoit le mouvement de parallélisme proprement dit.

A l'égard de la courbe du Tour qui en résulte, c'est une Conchoïde plus composée encore que toutes celles dont nous avons parlé, puisque cette construction du Tour fait à l'égard de la courbe tracée, le même effet que si la règle que nous avons toujours supposée droite, devenoit circulaire. Les mêmes méthodes que nous avons employées feroient trouver l'Équation de cette nouvelle Conchoïde; le calcul seulement en feroit plus long, & il n'a rien qui invite à en surmonter les difficultés.

Au-lieu de supposer la règle circulaire, on pourroit la supposer courbe d'une courbure quelconque, supposition très éloignée de la pratique, & qui ne feroit que des cas particuliers de tout ce que nous avons donné de plus général: mais ce Mémoire n'est déjà que trop long.



CINQUIEME MEMOIRE SUR L'ELECTRICITE,

*Où l'on rend compte des nouvelles découvertes sur
cette matiere, faites depuis peu par M. Gray;*

*Et où l'on examine quelles sont les circonstances
qui peuvent apporter quelque changement à l'E-
lectricité pour l'augmentation ou la diminution
de sa force, comme la température de l'air, le
vuide, l'air comprimé, &c.*

Par M. DU FAY. *

PENDANT que je travaillois aux expé-
riences dont j'ai rendu compte à l'Acadé-
mie dans mes précédens Mémoires, M.
Gray a continué ses recherches à Londres, &
il a publié ses découvertes dans les Transac-
tions Philosophiques, Nos. 423 & 426. Je
vais en donner un extrait en peu de mots;
premierement, parce qu'ayant donné dans
mon premier Mémoire, la suite historique de
tout ce qui avoit été fait sur cette matiere
jusqu'au moment que j'ai commencé d'y tra-
vailler, il est nécessaire de faire voir les pro-
grès qui ont été faits depuis; & en second
lieu, parce qu'on trouvera que ces découver-
tes sont très curieuses, & qu'elles concourent
avec

avec les miennes pour donner quelques idées sur les causes de l'Électricité.

* M. Gray a trouvé dans l'Électricité deux propriétés nouvelles; l'une, qu'elle est permanente, c'est-à-dire, qu'elle peut subsister dans les corps très longtems après qu'elle y a été excitée; & l'autre, qu'elle s'y trouve dans certains cas, sans que les corps ayent été frottés. Voici de quelle maniere il a éprouvé que l'Électricité étoit permanente; il a fait fondre dans une cuillier de fer différentes matieres résineuses séparément, comme de la résine blanche, de la noire, de la poix, de la gomme-lacque, de la cire & du souphre. Lorsque ces différentes matieres avoient pris la forme de la cuillier en s'y refroidissant, il chauffoit de nouveau la cuillier un moment, afin d'en faire détacher les matieres, qui se trouvoient de cette maniere conserver la forme d'un segment de sphere.

M. Gray a remarqué que lorsqu'il frottoit ces corps, tandis qu'ils étoient encore chauds, ils ne devenoient point électriques, & ils ne commençoient à avoir une vertu sensible que lorsque leur chaleur étoit à-peu-près celle d'un œuf qui sort de dessous la poule. La vertu électrique augmentoit ensuite à mesure que le corps refroidissoit, & paroissoit décuplé de ce qu'elle avoit été d'abord. M. Gray envelopoit alors ces différens corps dans du papier, dans de la flanelle, ou dans toute autre matiere semblable, & ils y ont conservé leur électricité pendant plusieurs mois, & même.

même jusqu'au tems qu'il écrit, qui étoit environ un an & demi après ses premières expériences. Il a fait la même chose avec un cone de foupbre, & avec un cylindre de même matiere, ce dernier moulé dans un tube de verre, & le premier dans un verre à boire. D'où il résulte que l'électricité n'est point une qualité qui se dissipe peu de tems après avoir été excitée, comme on l'avoit cru jusqu'à présent, mais qu'elle est permanente, & se peut conserver très longtems dans les corps. J'ai vérifié ces expériences, qui m'ont réussi de même qu'à M. Gray; & j'ignore, aussi-bien que lui, quel terme on peut assigner à la durée de la vertu électrique.

Il y a encore un fait très curieux que M. Gray a remarqué, qui est qu'il y a des corps qui n'ont pas besoin d'être frottés pour devenir électriques. M. Hauksbee * avoit déjà remarqué que la poix étant encore chaude, attiroit les feuilles d'or à la distance d'un ou de deux doigts, sans avoir été frottée, & cela lui a paru très singulier : il en est néanmoins demeuré là, & s'il eût poussé ses observations aussi loin que M. Gray, il auroit reconnu qu'il y a plusieurs matieres dans le même cas, & que tous les corps résineux font de ce nombre. Voici de quelle maniere on doit proceder pour s'en appercevoir.

Après avoir fondu dans une cuillier de fer, comme nous venons de le dire, quelque corps résineux, comme de la poix, de la gomme-lacque, de la cire, &c. & l'avoir fait for-

* *Experiences Physico-mechan.* p. 92. & 100.

sortir de la cuillier en la chauffant un moment, si on le laisse refroidir dans cet état posé sur une table ou sur toute autre matiere, il devient électrique de lui-même & sans qu'on y touche en aucune façon, & cependant il ne commence à le devenir que lorsqu'il est presque froid. Pour s'appercevoir, dans ces expériences, de la plus petite électricité sensible, M. Gray attache un fil très délié & un peu long au bout d'un bâton, & l'approchant peu-à-peu du corps électrique, on remarque très facilement la moindre vertu qu'il peut avoir.

Pour faire cette expérience avec un cone de souphre, il n'y a qu'à verser le souphre fondu dans un verre à boire bien sec & un peu chauffé; on peut le laisser refroidir dans cet état même pendant plusieurs jours, ainsi que je l'ai observé: on renverse ensuite le verre, & on l'enleve de dessus le cone de souphre: si l'on en approche alors un fil, il l'attire fortement. Et comme on pourroit soupçonner qu'en retirant le verre, on feroit l'effet d'une espece de frottement sur le cone, j'ai pris toutes les précautions nécessaires pour m'assurer qu'il n'y en avoit point, & le souphre a toujours été électrique, & même l'électricité a été sensible à travers le verre, ainsi que l'a remarqué M. Gray; car le fil étoit attiré avant qu'on eût ôté le verre de dessus le cone de souphre: mais cette attraction est très foible, & au bout de quelques jours elle ne m'a plus paru sensible, tandis qu'elle étoit encore très forte dans le cone de souphre, lorsque j'en ôtois le verre duquel j'avois soin de

de le recouvrir pour conſerver ſon électricité qu'il a encore depuis plus d'un an, & qu'il conſervera encore très longtems ſuivant toutes les apparences, à en juger par le peu de diminution qui y eſt arrivé pendant cet eſpace de tems. M. Gray a auſſi remarqué qu'un gâteau de ſouphre d'environ douze onces, conſervoit très longtems une foible électricité, ſans être envelopé ni couvert d'aucune matiere. Il avertit enſuite qu'il travaille actuellement ſur l'attraction du Verre & de quelques autres corps pour la rendre permanente de même que celle de ces premiers, & il ſoupçonne que la température de l'air y apporte plus de dérangement qu'aux autres.

M. Gray rapporte à la fin de ce Mémoire les expériences ſuivantes, qu'il a faites avec la Machine pneumatique. Il a frotté une boule de verre de deux pouces de diamètre, & l'ayant rendue électrique, il l'a ſuspendue par un fil de cuivre au haut d'un récipient, en ſorte qu'on la pouvoit facilement abaiſſer ou élever pour l'approcher plus ou moins de feuilles d'or qu'il avoit placées ſur un papier ſoutenu par une ſoucoupe poſée ſur la platine de la Machine pneumatique ; après avoir pompé l'air, il n'a trouvé dans la vertu électrique de cette boule aucun changement ſenſible, non plus que lorsqu'il y a laiffé rentrer l'air. Il a fait la même expérience avec du ſouphre, de la gomme-lacque, de la réſine & de la cire blanche, ſans que l'attraction d'aucune de ces matieres parût moins forte dans le vuide que dans le plein ; il a même pris

pris pour faire ces expériences avec précision, toutes les mesures que l'on peut attendre de son exactitude & de son attention. On trouve dans Boyle & dans le Livre de M. Hauksbee plusieurs expériences dans le même genre, mais nous aurons occasion d'en parler dans la suite de ce Mémoire, lorsque nous examinerons les changemens qui arrivent à l'électricité dans le vuide. Nous devons maintenant suivre le travail de M. Gray, & dire un mot de ses dernières découvertes.

On les trouve dans deux Lettres insérées dans les Transactions Philosophiques, N°. 426. Dans la première, il rapporte qu'ayant suspendu un fil dans le récipient de la Machine pneumatique, & ayant ensuite frotté ce récipient pour le rendre électrique, après en avoir pompé l'air, le fil avoit été attiré avec beaucoup de vigueur. Le tube électrique attiroit aussi ce fil suspendu dans le vuide, & on lui communiquoit divers mouvemens suivant que l'on en approchoit, ou que l'on en éloignoit avec plus ou moins de vitesse le tube, ou simplement la main : le fil étoit pareillement attiré, lorsqu'il y avoit deux récipients l'un sur l'autre, & même M. Wheler, au rapport de M. Gray, ayant mis l'un dans l'autre cinq récipients, le fil étoit également attiré, quoiqu'ils fussent tous vuides d'air. Il est à observer que pour mieux réussir dans ces expériences, il faut que le récipient soit joint à la Machine pneumatique avec un ciment de cire & de terebenthine, & non simplement posé sur un cuir mouillé à la manière ordinaire, parce qu'en pompant l'air, il s'élève

leve de ce cuir des vapeurs aqueuses qui diminuent considérablement l'électricité.

M. Gray a aussi remarqué que les corps opaques n'arrêtoient point la vertu électrique, en sorte qu'un morceau de liège barbouillé de miel, suspendu sous une cloche de métal posée sur une glace, attiroit les feuilles d'or, lorsqu'on approchoit le tube de la cloche. Je rapporte cette expérience de M. Gray, quoique le résultat n'en soit que le même que celui de plusieurs expériences insérées dans mon troisième Mémoire; mais je suis très aisé de la conformité qui se trouve entre les siennes & les miennes, cela ne peut que confirmer la vérité des unes & des autres. Il est même arrivé, comme on le va voir, que nous en avons fait chacun de notre côté, qui sont presque entièrement semblables, & il n'est pas impossible que cela ne nous arrive encore très souvent, si nous continuons l'un & l'autre à suivre le même travail: mais cette espèce de concurrence, dont en mon particulier je suis extrêmement flatté, ne peut que tourner au profit des Sciences, & nous faire avancer plus promptement dans la connoissance des phénomènes de l'électricité.

M. Gray passe ensuite à diverses expériences sur la transmission de l'électricité au moyen de deux enfans, dont l'un étoit suspendu sur des cordes de crin, & l'autre avoit sous chacun de ses pieds un gâteau de résine de huit pouces de diamètre, & de deux pouces d'épaisseur. En approchant le tube de l'un de ces enfans, l'électricité se communiquoit à l'autre, soit qu'ils se tinssent par la main, ou qu'ils tins-

sent.

rent chacun un bout d'une longue perche, ou d'une corde; il les a mis ensuite tous deux sur des gâteaux de résine, & les a fait communiquer l'un avec l'autre de diverses manières, soit avec le doigt, avec des cordes, ou seulement par les plis de leurs habits. Après avoir fait ainsi plusieurs combinaisons différentes & très curieuses de cette expérience, il fait voir que l'électricité se peut communiquer sans que ce soit par un corps continu, & pour cela il suspend horizontalement sur deux foyes une perche de deux pièces de 34 pieds de long, & à deux pieds de distance d'un des bouts de cette première il en suspend une seconde de 5 pieds de long qui fait un angle droit avec la première; lorsqu'on approche le tube du bout de l'une de ces perches, l'électricité se communique au bout le plus éloigné de la seconde, malgré le changement de direction, & l'interruption de deux pieds qui est entre l'une & l'autre. On peut voir dans mon troisième Mémoire que j'ai fait la même chose avec des cordes, & ce qui est arrivé lorsque j'ai interposé différents corps entre les bouts des deux cordes. M. Gray finit cette Lettre par le détail des expériences qu'il a faites, en éloignant plus ou moins l'une de l'autre les baguettes ou les ficelles, & il a trouvé que l'attraction étoit encore sensible après les avoir éloignées à 47 pouces Anglois l'une de l'autre.

Dans la seconde Lettre, M. Gray rapporte encore quelques expériences singulières sur la communication de la vertu électrique, sans que ce soit par un corps continu. Il fait

fait passer une corde vers le centre d'un cerceau de 20 pouces de diametre, suspendu par des foyes, ou soutenu sur un piédestal de résine dans une situation verticale, & ayant rendu sa corde électrique par l'approche du tube, tout le cerceau l'est devenu, quoique sa circonférence fût éloignée d'environ 10 pouces de la corde qui passoit par son centre. On voit dans la suite de cette Lettre, que la même expérience a réussi avec un cerceau de 40 pouces de diametre, soutenu verticalement par un cylindre ou gros tuyau de verre, & que toute sa circonférence est devenue assez sensiblement électrique pour attirer un fil blanc à un demi-pouce de distance.

La vertu électrique donnée par le moyen du tube à une corde tendue, s'est pareillement communiquée à une boule de liège soutenue par un roseau vertical qui avoit pour pied un entonnoir de verre renversé, & l'attraction de la boule a été sensible, quoiqu'elle fût distante de la corde d'environ deux pieds. Enfin M. Gray termine sa seconde Lettre par une expérience un peu différente des précédentes, & qui mérite attention. Il posa son cerceau de 40 pouces de diametre sur le gros cylindre de verre dans une situation verticale, & fit passer à l'ordinaire une ficelle par le centre; il approcha le tube du cerceau, alors non-seulement toute la circonférence du cerceau devint électrique, mais la ficelle & une boule d'yvoire qui étoit à son autre extrémité le devinrent aussi; il fit ensuite glisser la boule dans le centre même du cerceau, mais alors le fil qu'il présentait,

pour

Pour éprouver la force de l'attraction, fut repoussé par la boule, au-lieu d'en être attiré; & lorsqu'il présentoit ce même fil aux autres parties de la corde, il en étoit attiré à l'ordinaire, comme dans les expériences précédentes.

Ce fait qui paroît très singulier s'explique naturellement par le principe que j'ai établi dans mon quatrième Mémoire, & l'on peut le regarder comme une nouvelle preuve de mon hypothèse; car, lorsque la boule est placée au centre du cerceau, & qu'elle est devenue électrique par la communication du cerceau qui l'est devenu lui-même par l'approche du tube, on ne peut approcher le fil de cette boule, qu'en le plongeant dans le tourbillon électrique qui circule sans cesse de la boule au cerceau; ce fil doit donc devenir lui-même électrique, & suivant l'hypothèse que j'ai avancée, il fera repoussé par la boule, puisque j'ai fait voir que deux corps empreints d'une électricité de même nature se repoussent au-lieu de s'attirer. Ce fil, au contraire, sera attiré par la ficelle dans tous les points qui seront éloignés du cerceau, parce qu'alors étant hors de l'étendue du tourbillon électrique du cerceau, il ne contracte aucune vertu, & par conséquent il doit être attiré par la ficelle ou par la boule, si on l'éloigne du centre du cerceau, & qu'on le promène le long de la corde.

Je me suis un peu étendu sur l'explication de cette expérience, parce que, comme c'est à M. Gray que nous la devons, & que même elle lui a paru singulière, j'ai cru qu'il étoit important de faire voir combien elle s'accorde

de

de naturellement avec mon hypothese qui ne se trouve jusqu'à présent contredite par aucune expérience, & qui, au contraire, quadre avec toutes celles dont l'explication avoit paru jusqu'à présent la plus difficile.

Après avoir rendu compte des découvertes de M. Gray, qui, jusqu'à ce jour, sont venues à ma connoissance, je vais continuer le plan que je me suis proposé de suivre, & rapporter en peu de mots les observations que j'ai faites sur les divers changemens que la température de l'air peut causer à l'Electricité. La plupart des Physiciens ont remarqué, que l'air humide apportoit beaucoup d'obstacle aux expériences de l'Electricité: M. Gray l'a pareillement observé, & il ajoute dans une des Lettres dont nous venons de rendre compte, que l'attraction du verre est encore plus susceptible de ces changemens que celle de l'ambre & des autres corps semblables. J'avois dessein de faire sur ce sujet des observations exactes, mais cela n'est pas possible, à cause de plusieurs difficultés qui sont absolument insurmontables. Premièrement, on ne sauroit s'assurer de frotter plusieurs fois de suite le tube, ou tout autre corps électrique, d'une force à-peu-près égale; ainsi cela fait une premiere cause d'irrégularité. Secondement, les corps que l'on présente pour être attirés, sont de nature à ne pouvoir pas être toujours disposés de la même maniere; s'ils sont suspendus, le moindre mouvement dans l'air les agite; s'ils sont posés sur quelque corps que ce soit, ils y adherent plus ou moins fortement, suivant des

les circonstances qui nous sont absolument imperceptibles. Enfin le lieu où l'on conserve le tube cause encore des variations; s'il a été quelque tems à l'air, sa vertu est plus difficile à exciter que s'il a été envelopé: la matiere dont on se sera servi pour l'enveloper, apporte encore du changement, de même que le froid ou le chaud du lieu où on l'a conservé. Toutes ces difficultés m'ont empêché de faire ces observations avec autant d'exactitude que je me l'étois proposé, & je n'en suis tenu à celles qui sont assez sensibles pour être facilement apperçues; je doute même qu'il fût d'aucune utilité de les faire avec plus de précision, & je ne crois pas que cela nous donnât plus de connoissance sur la nature des écoulemens électriques.

Il est certain que l'humidité nuit infiniment à l'action des corps électriques: cet obstacle est tel que lorsque le tems est humide, on frotte quelquefois le tube pendant 4 ou 5 minutes, sans lui avoir communiqué aucune vertu, & même celle qu'il acquiert, lorsqu'on s'obstine à le frotter, est toujours très peu de chose en comparaison de celle qu'il a dans un beau tems. On doit aussi observer que quoique le tems soit, lors de l'expérience, beau, sec, & tel qu'on le peut désirer, on a quelquefois de la peine à exciter la vertu du tube; ce qui vient de ce que les jours précédens auront été humides, & que l'humidité s'est attachée aux parois intérieures du tube: il faut alors le nettoyer soigneusement, en y introduisant avec une baguette un peu de coton sec & un peu chaud; il est

bon aussi de l'essuyer par dehors avec un linge, ou une étoffe de laine un peu chauffée, cela le met en état de devenir plus promptement électrique.

J'ai aussi remarqué que le tems chaud n'est pas le plus propre à l'Electricité, soit que cela vienne des vapeurs insensibles qui sont alors plus abondamment élevées de la terre, soit que l'on s'échauffe trop vite en frottant le tube, & que la transpiration du corps ralentisse le cours de la matiere électrique, ou en occupe une partie; quoi qu'il en soit, il est certain que les expériences ne réussissent jamais si bien dans un jour fort chaud, ni dans les heures les plus chaudes d'un jour ordinaire.

On auroit pu croire que le vent eût été un obstacle aux écoulemens électriques; on a vu cependant dans mon troisieme Mémoire, que lorsque je fis l'expérience dans laquelle la vertu électrique fut transmise le long d'une corde, à la distance de 1256 pieds, il faisoit un vent très violent, ce qui n'empêcha pas néanmoins qu'elle ne réussît parfaitement: d'où il résulte que l'air agité n'entraîne point la matiere électrique, ou du moins s'il y apporte quelque dérangement, il n'est pas assez considerable, pour qu'on s'en aperçoive sensiblement.

Enfin pour réunir toutes les circonstances qui m'ont paru les plus favorables à l'Electricité, il faut choisir un tems sec & serein, un vent de Nord, & un jour médiocrement chaud, ou même une belle gelée, qui pourroit bien être le tems de tous qui y seroit le

le plus propre : on trouvera que dans ces circonstances, l'électricité est infiniment plus forte que dans les tems couverts, ou humides. Voilà tout ce dont j'ai pu m'assurer par rapport à la température de l'air, & ces observations sont conformes à celles de M. Hauksbee, & de M. Gray. Voyons maintenant quels changemens le vuide, ou du moins l'air extrêmement raréfié, peut apporter dans les expériences de l'Électricité.

* M. Hauksbee rapporte qu'ayant ajusté à un tube de verre un robinet, pour le pouvoir appliquer à la Machine pneumatique, & en ayant pompé l'air, le tube, quoique frotté à l'ordinaire, n'avoit presque aucune vertu sensible, il agitoit seulement les plus petites feuilles de laiton, lorsqu'on l'en approchoit très près : mais ayant laissé rentrer l'air, le tube devint tout à coup électrique, sans l'avoir frotté de nouveau, & il attiroit les feuilles à la même distance à laquelle il ne leur donnoit aucun mouvement, étant vuide d'air ; il n'avoit pas cependant autant de vertu qu'à l'ordinaire, mais ayant été ensuite frotté de nouveau, il recouvra toute son électricité.

† Le même Auteur ajoute dans un autre endroit, qu'ayant enduit intérieurement un globe de verre de cire d'Espagne, & l'ayant fait tourner sur son axe, après en avoir pompé l'air, ce globe étoit devenu électrique, en posant la main dessus pendant son mouvement de rotation ; mais qu'il ne l'étoit qu'aux

* *Exper. Physico-mechan.* p. 39.

† *P.* 108.

qu'aux endroits qui étoient intérieurement enduits de cire d'Espagne, n'ayant aucune vertu dans quelques autres où il n'y avoit point de cire. Il est vrai que laissant rentrer l'air dans le globe, les endroits enduits de cire devenoient encore plus électriques qu'auparavant, ce qu'il reconnoissoit par des fils qu'il laissoit pendre librement au-dessus de ce globe.

* M. Hauksbee a dit aussi qu'un tube rempli d'air libre, ou un cylindre de verre solide, frotté dans un récipient vuide d'air, n'acqueroit aucune vertu; d'où il conclut que l'air a beaucoup de part aux phénomènes de l'électricité: il pense, par exemple, que lorsqu'il y a de l'air dans l'intérieur du tube, cet air empêche la matière électrique d'y entrer si librement, & par conséquent la fait agir au dehors; au contraire, lorsque le tube est vuide d'air, cette même matière s'y porte avec beaucoup de facilité, & par conséquent n'a plus d'action au dehors. A l'égard de l'air qui environne le tube extérieurement, M. Hauksbee pense que c'est lui qui transporte les corps légers vers le tube, & qui est cause de tous leurs mouvemens; d'où il conclut que si on vient à ôter cet air extérieur, ou, ce qui est la même chose, si l'on frotte le tube dans le vuide, tout l'effet apparent de l'électricité doit être anéanti. Il explique par les mêmes principes, la tendance, ou la direction des fils vers le centre du globe de verre rendu électrique, lorsque l'expérience est

est faite dans l'air libre, & la cessation de cette tendance lorsque le globe est vuide d'air, ou lorsqu'en étant rempli à l'ordinaire, on ôte l'air extérieur en faisant l'expérience dans le vuide.

Ces dernières expériences de M. Hauksbee ne paroissent pas trop s'accorder avec celle de M. Gray que je viens de rapporter, qui consiste à rendre une boule de verre électrique par le frottement, & la suspendre ensuite dans le récipient de la Machine pneumatique; & il a remarqué qu'alors l'électricité ne souffroit aucune diminution, soit que le récipient fût rempli d'air ordinaire, soit qu'il en fût vuide, ou qu'ensuite on le fît rentrer. Ces especes de contrariétés m'ont engagé à apporter l'attention la plus scrupuleuse, lorsque j'ai refait ces expériences, & même à les combiner de différentes manieres, ainsi qu'on le va voir.

J'ai commencé par celles de M. Hauksbee avec le tube de verre, & elles m'ont réussi de même qu'à lui, en sorte qu'il est constant que lorsque ce tube est vuide d'air, il n'acquiert presque point d'électricité, & qu'il la recouvre dès qu'on y laisse rentrer l'air, quand même on ne le froteroit pas de nouveau: j'ai observé de plus, que lorsqu'il est vuide d'air, il ne produit point, à l'approche des mains, ou du visage, ces petillemens qui arrivent toujours lorsqu'il est rempli d'air à l'ordinaire; mais cette observation tient à celles qui concernent la lumière, & qui doivent faire le sujet d'un autre Mémoire.

Pour faire avec plus de commodité & d'ex-

actitude les expériences dans le vuide, je me suis servi d'un petit Barometre que M. de Mairan a eu la bonté de me communiquer, & qui rend toutes les expériences du vuide infiniment plus faciles à faire qu'elles ne le sont avec un récipient, auquel est ajusté un Barometre ordinaire, ou même avec le tube appliqué à la Machine pneumatique, comme cela se pratique en Angleterre, & dans lequel le Mercure s'éleve à proportion que le ressort de l'air diminue dans le récipient.

Le Barometre de M. de Mairan est semblable pour la forme aux Barometres ordinaires, si ce n'est qu'il n'a en tout que 3 pouces de long ou environ; on le remplit tout entier de Mercure, ainsi que la partie inférieure de la boule, & on l'ajuste sur un petit pied, afin qu'il puisse demeurer dans une situation verticale. Lorsqu'on veut connoître par le moyen de cet instrument, la quantité dont l'air est dilaté dans le récipient, on le pose sous ce récipient sur la platine de la Machine pneumatique; on conçoit assez que les premiers coups de piston ne font aucun effet sur ce Barometre, mais lorsque l'air est dilaté au point que le Barometre ordinaire seroit descendu de 24 pouces ou environ, celui-ci commence à agir, & si on le fait descendre de 2 pouces, on doit juger que le Barometre ordinaire seroit descendu de 26 pouces, & ainsi du reste. On ajuste à ce Barometre une petite règle de cuivre divisée en pouces & en lignes; & si l'on veut que les opérations soient faites avec toute la justesse que l'on peut desirer, il faut avoir égard à la hauteur actuelle.

actuelle du Barometre ordinaire lors de l'expérience, mais communément il n'est pas nécessaire d'apporter une si grande précision. Pour celles dont il est question présentement, il ne s'agit que de juger de la quantité d'air qui reste dans le récipient, & il est très aisé de le faire, au moyen de la petite règle de cuivre qui indique en lignes la difference de hauteur entre le Mercure contenu dans le vuide du tube, & celui qui est dans la boule.

On feroit de pareils Barometres un peu plus longs; si on avoit besoin de connoître les degrés d'un vuide moins parfait: mais il arrive rarement qu'on en ait besoin; il n'y a que ceux qui sont dans l'habitude de faire de pareilles expériences, qui puissent connoître le prix d'une invention aussi simple: mais pour moi j'avoue que je l'ai trouvée d'une commodité infinie, & j'ai cru ne pas devoir négliger l'occasion de la rendre publique.

Pour m'assurer ensuite si les differens corps frottés dans le vuide acquerroient de l'électricité ou non, j'ai pris un récipient ouvert par le haut; une boîte de bois cylindrique d'environ 4 pouces de haut entroit dans cette ouverture du récipient, & y étoit exactement cimentée; le fond & le couvercle de la boîte étoient percés d'un trou d'une ligne & demie de diametre, & elle étoit entièrement remplie de plusieurs cuirs appliqués les uns sur les autres, percés aussi dans le milieu, & graissés de façon que l'air ne pût s'introduire ni entre les cuirs, ni entre eux & les parois de la boîte; un fil de fer poli traversoit d'un bout à l'autre la boîte & tous

ces cuirs, & l'un de ces bouts qui entroît dans le récipient, étoit taillé en vis pour, au moyen d'un peu de filasse, y ajuster une boule percée, d'ambre, de verre, ou tout autre corps semblable; le bout supérieur de ce fil de fer qui étoit au-dessus de la boîte, & hors du récipient, étoit garni d'une petite bobine, ou poulie de bois, on faisoit tourner cette bobine avec un archet, & par ce moyen le fil de fer & la boule qui y étoit attachée, tournoient dans le récipient avec beaucoup de rapidité, sans que l'air pût en aucune façon y entrer.

Pour que cette boule pût être frottée par ce mouvement, j'avois ajusté une espece de pince plate & recourbée, garnie d'étoffe, qui embrassoit la boule & la serroit foiblement; cette pince étoit attachée fixement au tuyau de la platine de la Machine pneumatique; enfin il y avoit des fils suspendus au dedans du récipient, pour pouvoir reconnoître si la boule étoit devenue électrique.

Tout étant ainsi disposé, je commençai par faire l'expérience sur une boule d'ambre: je l'ajustai pour cet effet au bout du fil de fer, & je la fis descendre entre les branches de la pince garnie d'étoffe; je pompai l'air alors jusqu'à ce que le Mercure fût descendu dans le petit Barometre à 3 lign. près du niveau; je frottai ensuite la boule d'ambre en faisant tourner la bobine par le moyen de l'archet, après quoi soulevant la bobine, je retirai la boule d'entre les branches de la pince, ce qui la fit rencontrer vis à-vis des fils que j'avois disposés à cet effet; elle les atti-

ra.

ra fortement, & tout de même, à ce que j'en puis juger, qu'elle auroit fait dans l'air libre. Il rentra si peu d'air dans le récipient pendant le cours de cette expérience, que le Barometre ne monta que d'environ une demi-ligne. J'ai répété plusieurs fois cette expérience, & elle a toujours réussi de la même manière, en sorte qu'il peut demeurer pour constant, que l'ambre frotté dans le vuide devient électrique de même que dans l'air ordinaire.

J'ai fait la même expérience avec une boule de crystal de roche, après avoir gardi de papier les branches de la pince, parce qu'il m'a paru que le papier faisoit mieux que l'étoffe pour le verre & les matieres semblables; ayant pompé l'air au même point que dans l'expérience précédente, j'ai trouvé que la vertu électrique étoit considérablement diminuée, & qu'elle étoit rétablie, lorsqu'ayant laissé rentrer l'air, je frottois la boule de nouveau: d'où il résulte que le verre & les corps semblables, frottés dans le vuide, n'acquièrent que très peu d'électricité, quoiqu'ils la conservent dans le vuide, s'ils ont été précédemment frottés dans l'air libre; & que les corps, dont l'électricité est de la nature de celle que nous avons appelée *résineuse*, acquièrent cette vertu étant frottés dans le vuide, de même qu'ils feroient dans l'air libre: ce qui établit encore une nouvelle différence entre ces deux électricités.

Ayant fait ces expériences dans le vuide, j'ai voulu voir ce qui arriveroit en comprimant l'air dans le tube; & pour connoître

exactement la quantité dont l'air seroit comprimé, j'ai cherché une machine qui me pût donner les degrés de condensation, comme celle que je viens de décrire me donnoit ceux de dilatation.

La voye la plus simple n'est pas pour l'ordinaire celle qui se présente la première; il me vint d'abord des idées assez compliquées, & d'une exécution difficile; enfin je m'arrêtai à un moyen très facile, & plus simple encore, s'il est possible, que le Baromètre dont je viens de parler. C'est un Tube de 5 ou 6 pouces de long, de demi-ligne ou environ de diametre intérieur, ouvert par un de ses bouts, & fermé par l'autre. Ce Tube est porté par une petite monture de cuivre divisée en pouces & en lignes, & dans laquelle il peut glisser avec un peu de force, en sorte que l'on place l'une de ses extrémités sur la division que l'on veut, & qu'il y demeure. La monture de cuivre qui enveloppe le tube, est fendue suivant sa longueur, en sorte qu'on voit le tube d'un bout à l'autre par cette fente.

J'ai vu depuis dans le Livre de M. Hales sur l'Analyse de l'Air, une méthode qu'il emploie pour connoître la profondeur de la Mer, qui a quelque rapport à cette machine, & qui auroit pu m'en faire naître l'idée, si je l'avois connue plutôt, mais qui est encore moins simple que celle que je propose ici. Ayant disposé le tout de la manière que je viens de le décrire, on fait entrer dans le tube une goutte de mercure, & avec un fil de fer on la place vis-à-vis une des divisions de

de la monture. Comme on peut mouvoir le tube dans la monture, & la goutte de mercure dans le tube, on arrange l'un & l'autre en sorte que l'air compris entre le bout fermé du tube & la surface inférieure de la goutte de mercure réponde à un certain nombre de lignes sur la monture. Le tout étant disposé de la sorte, on l'ajuste sur le canal du robinet, & on l'introduit dans le tube.

On conçoit facilement que lorsque l'air viendra à être comprimé dans le tube, il pressera sur la goutte de mercure, & la fera baisser dans le petit tuyau de verre jusqu'à ce que l'air contenu sous la goutte soit dans un degré de condensation égal à celui du tube; or comme ce degré de condensation est très aisé à connoître par la quantité de lignes dont le mercure descend, on connoit pareillement la condensation de l'air du grand tube.

On me peut faire une objection qui est bien fondée, mais qui est de très peu de conséquence; cependant je n'ai pas cru devoir négliger d'y répondre. On peut dire, que le poids de la goutte de mercure comprime un tant soit peu l'air du petit tuyau, & qu'ainsi cet air n'est pas précisément dans le même degré de dilatation que l'air extérieur; on ajoutera, que lorsque l'air est comprimé à un certain point, cette même pesanteur ne fait presque plus aucun effet sur la petite colonne inférieure, en sorte que cela ne peut pas indiquer bien précisément le degré de condensation. Mais je réponds à cela, que l'erreur est trop légère pour mériter qu'on y fasse at-

tention; de plus, pour peu que l'on voulût s'y arrêter, il seroit facile de la corriger par le calcul; enfin, si l'on veut entierement l'éviter, il n'y a qu'à poser le petit tube dans une situation horizontale.

Avec ce petit instrument, que j'appellerai *Elatérometre*, j'ai fait les expériences suivantes. Par un beau tems, le tube étant fort électrique, en sorte qu'à la distance de 33. pouces il attiroit un assez gros fil suspendu librement, j'introduisis avec la pompe de l'air dans le tube, en sorte que l'espace entre le fond du petit tube & la surface inférieure de la goutte de mercure, qui étoit de 54. lignes dans son état ordinaire, fut réduit à 18 lignes; l'air étoit donc alors trois fois plus comprimé que dans son état ordinaire: je fermai ensuite le robinet, & ayant frotté le tube, il n'attiroit qu'à peine le fil à la distance de 3. pouces; mais je n'en fus pas surpris, parce que cela me paroissoit très-sensiblement venir d'une vapeur grasse que l'air avoit entraînée avec lui en passant par la pompe, & qui s'étoit attachée aux parois intérieures du tube: l'ayant frotté pendant quelque tems, il a recouvré assez d'électricité pour attirer le fil à la distance de 20. pouces, ce qui n'est néanmoins arrivé qu'après que la vapeur, dont je viens de parler, a été dissipée, & a monté vers le haut du tube. J'ai ensuite ouvert le robinet pour laisser sortir l'air, & le tube, après l'avoir frotté, est devenu aussi électrique qu'il l'étoit auparavant.

Ayant réitéré l'expérience, & comprimé l'air.

l'air au même point, il est arrivé précisément la même chose que la première fois. Quelques heures après je l'ai répétée une troisième fois, & le succès a été à-peu-près le même.

La quatrième, fois je comprimai l'air un peu davantage, en sorte que la goutte de mercure baissa de 39 lignes, c'est-à-dire que l'air qui dans son état de liberté occupoit 54 lignes, & dans les expériences précédentes n'en occupoit plus que 18, étoit dans celle-ci réduit à 15; ce qui est à-peu-près tout ce que je puis faire avec ma pompe, car les derniers coups de piston ne font plus d'effet sensible, d'ailleurs je craindrois qu'une plus forte compression ne brisât le tube. Je frottai le tube dans cet état, & il n'attira que très foiblement le fil à la distance de 3 pouces. J'ouvris alors le robinet, & je laissai sortir l'air avant que le nuage intérieur fût disparu, & que la vertu fût recouvrée, comme il étoit arrivé dans les premières expériences: je voulois voir s'il n'attiroit pas par ce moyen le fil de plus loin sans l'avoir refrotté de nouveau, mais cela n'arriva point, & sa vertu resta aussi peu considérable; il est vrai que venant ensuite à le frotter pendant quelques instans, il acquit autant d'électricité qu'il en avoit jamais eu.

Il semble qu'il résulte de-là, que l'air introduit dans le tube par le moyen d'une pompe, y porte avec lui une vapeur grasse qui nuit à l'électricité; & on ne peut empêcher que cela n'arrive, car si l'intérieur de la pompe & le piston n'étoient enduits de graisse, l'air

ne pourroit y être contenu lorsqu'on vient à le comprimer, & cet air appuyant fortement contre les parois onctueuses, il se charge nécessairement de quelques parties grasses qu'il porte avec lui dans l'intérieur du tube. Si l'on mouilloit la pompe au lieu de la graisser, l'air porteroit pareillement dans le tube une vapeur aqueuse, qui nuiroit pour le moins autant que celle-ci à l'électricité.

Ces raisons m'ont obligé d'avoir recours à d'autres moyens pour comprimer l'air dans le tube, sans y introduire d'humidité, ni de vapeurs grasses. Je me suis d'abord servi de l'expédient le plus simple de tous, qui est de chauffer le tube après lui avoir ôté la communication avec l'air extérieur en fermant le robinet. Il est vrai que de cette manière je n'augmentoie pas la quantité d'air dans le tube, mais je rendois sa compression plus considérable, en augmentant son élasticité. J'ai donc chauffé le tube le plus qu'il m'a été possible, ou plutôt, autant que j'en ai pu supporter la chaleur au travers du papier dont je me servois pour le frotter; mais la compression de l'air a beaucoup moins augmenté que je ne l'aurois cru, car la goutte de mercure n'a descendu que de 6 lignes, ce qui ne dénote que l'augmentation d'un neuvième dans le ressort de l'air: dans cet état, le tube frotté attiroit le fil à la distance de 36 pouces, ce qui est de 3 pouces plus loin que dans les expériences précédentes. Mais il est à croire qu'une aussi petite augmentation de la compression ou du ressort de l'air, n'étoit pas la cause de ce que le tube attiroit le fil plus loin;

bin; il est plus naturel d'attribuer ce fait à la chaleur du tube, parce que j'ai remarqué que dans tous les cas la chaleur augmentoit l'action des corps électriques. La crainte que j'ai eue de casser le tube en l'exposant à une plus forte chaleur, jointe à la difficulté de le froter quand il est fort chaud, a fait que je n'ai pas tenté d'augmenter davantage par cette voye le ressort de l'air intérieur, & j'ai imaginé de me servir de la maniere suivante.

J'ai fait faire un globe de cuivre creux d'environ 10 pouces de diametre, à ce globe étoit soudé un tuyau de 3 pieds de long, recourbé par son extrémité; le tout étoit très exactement soudé de soudure forte, & je me servis de ce globe de cuivre, comme d'un éolipile, pour introduire de l'air & le comprimer dans le tube. Pour cet effet, le bout recourbé du tuyau de cuivre portoit une vis qui s'ajustoit au robinet du tube de verre, & cette extrémité du tuyau étoit recourbée, afin qu'on eût la commodité de chauffer la boule de cuivre, & que son tuyau étant horizontal, le tube de verre pût être dans une situation verticale, & qu'ainsi on pût distinguer facilement les degrés de condensation, par le moyen du petit Elatérometre dont nous venons de parler.

Je pris d'abord toutes les précautions nécessaires, pour que l'air qui passeroit de la boule dans le tube ne fût chargé d'aucune humidité, & pour cela je la fis bien chauffer d'abord sans y ajuster le tube de verre, & en ayant fait sortir le plus d'air qu'il me fut possible par ce moyen, je la retirai du feu

pour

pour la faire refroidir: mais afin qu'il n'y rentrât qu'un air très sec, je mis le bout recourbé du tuyau de cuivre très proche du feu jusqu'à ce que la boule fût entièrement refroidie, & que par conséquent elle fût remplie de tout l'air qu'elle pouvoit contenir dans son état naturel; je bouchai ensuite exactement le tuyau, jusqu'au moment que je fis l'expérience.

Ayant alors débouché ce tuyau, j'y ajustai le tube garni de son robinet & de l'Elatérometre, & ayant mis la boule sur le feu, je condensai l'air dans le tube jusqu'à ce que le mercure fût descendu de 27 lignes, c'est-à-dire, précisément du double de ce qu'il étoit dans l'état naturel; je fermai alors le robinet, & je détachai le tube du tuyau de la boule, je le frottai à l'ordinaire, & même beaucoup plus longtems que je n'avois coutume de faire, il n'acquit cependant qu'une très médiocre électricité; je continuai à le frotter, mais sa vertu demeura toujours très foible; j'ouvris alors le robinet, pour laisser sortir l'air qui y étoit retenu; l'ayant ensuite frotté pendant quelques instans, il recouvra son électricité ordinaire. Je refis trois fois de suite la même expérience, & elle réussit toujours de la même manière.

Je voulus voir ce qui arriveroit en la faisant dans l'obscurité. Lorsque l'air fut condensé du double de l'état naturel, j'eus beau frotter le tube, je ne pus pas appercevoir la moindre lumière, & il ne parut aucune étincelle lorsque j'approchois du tube les doigts ou le visage: mais à peine eus-je fait sortir
l'air.

l'air condensé, que le tube devint lumineux au moindre frottement, & que tous les autres phénomènes qui accompagnent l'électricité reparurent comme à l'ordinaire.

Il demeure donc pour constant, que l'air comprimé dans le tube, nuit considérablement à son électricité. J'avoue que je m'attendois à un effet tout contraire, & que je pensois avec M. Hauksbee, que si le tube perdoit son électricité lorsqu'il est vuide d'air, c'est que la matiere électrique trouvant plus de facilité à se mouvoir par l'absence de l'air, se portoit en abondance dans l'intérieur du tube, & par conséquent agissoit plus foiblement au dehors; j'inférois de-là, qu'en augmentant dans l'intérieur du tube la quantité de l'air, on multiplioit les obstacles qui s'opposoient aux écoulemens électriques, & que par conséquent leur action devoit se porter au dehors, & faire un effet plus considérable que lorsque le tube ne contenoit que de l'air dans son état naturel. Lorsque je trouvois que l'expérience étoit contraire à ma conjecture, je l'attribuois à la qualité de l'air humide ou gras que j'avois introduit dans le tube: mais je ne puis rien soupçonner de semblable dans cette dernière expérience, j'ai pris toutes les précautions possibles pour que l'air que j'y introduisois fût dénué de graisse & d'humidité, & cependant l'électricité a été très sensiblement arrêtée. Peut-être dira-t-on que l'air qui sort de la boule de cuivre échauffée, porte avec lui quelques parties sulfureuses qui nuisent à l'électricité; mais comme ce n'est-là qu'une conjecture faite au hazard,

hazard, & que je n'imagine aucune maniere d'introduire de l'air dans le tube qui ne soit sujette à plus d'inconvéniens que cette dernière, je me contenterai de dire que l'air comprimé dans le tube nuit à l'électricité, puisque toutes les expériences concourent à me le prouver. Il est vrai qu'il paroît fort singulier que l'air comprimé & l'air dilaté produisent un effet semblable par rapport à l'électricité, & que cet effet soit précisément le contraire de ce qui arrive dans l'air libre; mais l'explication de ce fait tient peut-être à quelque principe qui ne nous est pas encore connu, & loin d'être découragés par ces especes de contrariétés apparentes, cela nous doit animer de plus en plus dans nos recherches, nous prouver la nécessité de l'examen scrupuleux des faits, & nous faire tenir en garde contre les conséquences que nous sommes souvent tentés de tirer d'une expérience à une autre par le rapport & l'analogie que nous croyons trouver entre elles, & qui pourroient nous induire en erreur, parce que ce rapport ne nous est presque jamais connu dans toutes ses parties.

DE LA GRANDEUR
DES SATELLITES DE JUPITER,

Et des erreurs qui se glissent dans les Observations de ces Satellites.

Par M. M A R A L D I.

LEs Satellites de Jupiter sont si éloignés de la Terre, qu'ils sont invisibles à la vue simple, & ils nous paroissent même très-petits avec les plus longues & les plus excellentes Lunettes; l'angle que leurs images font au foyer de ces Lunettes, ne sauroit être mesuré par le Micrometre dont on se sert ordinairement pour mesurer les diametres des corps célestes.

Simon Marius, peu de tems après la découverte de ces Satellites, en détermina fort grossièrement la grandeur. On ne pouvoit pas alors avoir beaucoup de précision. On jugeoit du rapport des Satellites à Jupiter, seulement par estime & conjectures; les Lunettes, qui venoient d'être inventées, n'avoient pas la perfection des nôtres, & ne pouvoient pas donner le moyen de déterminer la grandeur des Satellites qu'elles nous fournissent aujourd'hui. On voit par nos Lunettes, les Satellites entrer sur le disque de Jupiter, & en sortir; ainsi en observant le tems qu'ils employent à entrer sur le disque de Jupiter, ou à en sortir, & le comparant

à celui qu'ils mettent à le parcourir, lorsqu'ils passent par le centre, on aura les diametres de ces Satellites. Il paroît que feu M. Cassini a employé cette méthode pour trouver le tems de la demi-demeure des centres de ces Satellites sur le disque de Jupiter, & le tems qu'ils employent à entrer sur ce disque, & à en sortir, dont il nous a donné des Tables. Il s'en est servi pour trouver le rapport du diamètre du 1^{er} Satellite au diamètre de Jupiter, qu'on voit dans une Lettre écrite au P. Gottignés, imprimée à Bologne en 1665.

Il est très difficile de faire ces observations avec exactitude; j'ai voulu essayer d'en faire, mais j'avoue que je n'y ai pas réussi. La lumière de Jupiter les rend très douteuses. On hésite pendant longtems si le Satellite touche le bord de Jupiter, & s'il est entierement entré sur le disque. J'ai souvent perdu de vue un Satellite qui n'étoit pas à moitié entré sur le disque, & je n'ai pu le voir à sa sortie que lorsqu'il étoit à moitié sorti. Cependant on trouve plusieurs de ces observations dans les Registres de l'Observatoire, qui paroissent avoir été faites avec précision. J'en rapporterai trois faites par feu M. Cassini, qui m'ont paru les plus propres pour déterminer les diametres des Satellites.

En 1695.

Le 8 de Fév. à 10^h 46' 20" le 1^{er}. Satellite touche le bord de Jupiter.

10 53 20 il entre entierement.

13 13 21 il commence à sortir.

13 20 30 il se sépare de Jupiter.

Le

Le 9 de Fév. à $8^h 35' 30''$ le 2^d. Satellite touche le bord de Jupiter.

8 45 15 il se cache derrière le disque.

11 45. 0 il est à moitié sorti.

11 49 35 il sort entièrement.

Le 9 de Fév. à $10^h 1' 55''$ le 3^{me}. Satellite touche le bord de Jupiter.

10 11 45 il est entré.

13 53 17 il commence à paraître.

14 5 23 il se détache du bord de Jupiter.

Jupiter étoit au tems de ces observations à $210^{\circ} \frac{1}{2}$ du Lion, à 7-degrés du nœud descendant des Satellites. On voit par ces observations que le 1^{er}. Satellite a employé 7 minutes à entrer sur le disque de Jupiter, & qu'il y est resté $2^h 27'$; que le 2^d Satellite a été $9' 40''$ à entrer, & qu'il a employé $3^h 4' 20''$ à parcourir le disque, & que le 3^{me} a été $12' 6''$ à sortir du disque de Jupiter, & qu'il y a demeuré $3^h 43' 38''$; à l'égard du 4^{me} j'ai conclu des Tables qu'il est environ 15 minutes à entrer sur le disque de Jupiter, & qu'il lui faut 5 heures pour le parcourir. Le tems que ces Satellites demeurèrent sur le disque de Jupiter étant divisé par le tems de leur entrée ou de leur sortie, donne pour le 1^{er}, le 2^d & le 4^{me} Satellite 20 au quotient, & 18 un peu plus pour le 3^{me}; d'où j'ai conclu que le diamètre du 3^{me} Satellite est la 18^{me} partie du diamètre de Jupiter, & les diamètres des trois autres en sont la 20^{me} partie.

Pour

Pour comparer la grandeur de ces Satellites à la grandeur de la Terre, & à celle de la Lune, qui est le Satellite de la Terre, il est nécessaire de connoître la grandeur de Jupiter, que divers Astronomes ont donné différente; & comme la différence est grande, je rapporterai l'observation dont je crois que M. Cassini s'est servi pour déterminer le diamètre de Jupiter, car elle est très rare par rapport aux circonstances qui l'accompagnent.

En 1690, le 27 de Septembre, feu M. Cassini ayant mesuré la distance entre les foyers d'une Lunette de 34 pieds, il la trouva de 404 pouces, & il remarqua que l'image de Jupiter comprise entre deux fils parallèles qui étoient au foyer de l'oculaire dressés suivant le cercle du mouvement journalier de Jupiter, entre lesquels il marchoit, touchant l'un & l'autre, étoit précisément la 10^{me} partie d'un pouce, qui étant comparée à la distance des foyers de la Lunette, donne par la Trigonométrie un angle de 51 secondes qui mesure le diamètre apparent de Jupiter.

Cette Planete avoit été le jour précédent à 7^h 18' du soir en opposition avec le Soleil, & elle étoit très proche de son périhélie; deux circonstances favorables pour observer les diamètres des Planetes: en toute autre situation il faut avoir égard, 1^o. à leurs aspects avec le Soleil, car ils sont plus ou moins éclairés suivant leur éloignement; mais le défaut de lumière dans Jupiter ne peut jamais être par cette raison que comme dans la Lune un jour avant ou après son plein, ou comme le sinus verse de 11 degrés, qui est la pa-
ral-

allaxe annuelle de cette Planete dans les quadratures. Il faut avoir égard en second lieu leur distance à la Terre, car les diametres apparens des Planetes varient en raison réciproque des distances à la Terre. La variation du diamètre de Jupiter peut monter jusqu'à 19''; car par les hypotheses de feu M. Cassini, la plus petite distance de Jupiter à la Terre, qui est dans l'opposition avec le Soleil qui arrive dans le périhélie, est à sa plus grande distance qui est dans la conjonction avec le Soleil qui arrive dans l'aphélie, comme 43450 à 70950, ou comme 29 à 47; & supposé que ce diamètre apparent soit de 51 secondes quand il est le plus grand, il sera de 32 secondes quand il sera le plus petit, de sorte que la variation qui peut arriver au diamètre de Jupiter est de 19 secondes. Mais toute cette variation ne lui sauroit arriver qu'en six années, qui est l'intervalle entre la conjonction qui arrive à l'aphélie, & l'opposition qui arrive au périhélie; cependant elle peut monter à 17 secondes dans l'espace de six mois, qui est entre l'opposition de Jupiter avec le Soleil & sa conjonction, car dans cet intervalle de tems la variation de la distance de Jupiter à la Terre, en l'année que Jupiter est dans son périhélie, est comme 43450 à 65637, ou environ comme 4 à 6; donc la variation de son diamètre sera comme 6 à 4, ou comme 51 secondes à 34 secondes.

Comme la différence du lieu de Jupiter au tems de cette opposition, au lieu de son périhélie, n'est tout au plus que de 5 degrés, la distance de Jupiter à la Terre ne varie pas sensiblement par cet éloignement du pé-
ri-

rihélie, nous avons supposé que Jupiter étoit à sa moindre distance de la Terre au tems de cette observation, & que le diametre observé étoit le plus grand qu'il est possible.

Or la moindre distance de Jupiter à la Terre est à la moyenne distance du Soleil à la Terre, suivant M. Cassini, comme 43450 à 11000, ou comme 79 à 20, ou environ comme 4 à 1. Donc le diametre de Jupiter, vu d'une distance égale à la distance moyenne du Soleil à la Terre, seroit de quatre fois 51 secondes, qui font 3' 24".

Mais le diametre de la Terre, vu de la même distance, selon la détermination de feu M. Cassini, qui est à la fin de la recherche de la Parallaxe de Mars, est égal à la 100^{me} partie du diametre du Soleil, qui dans les moyennes distances est de 32' 10", ce qui fait 19" $\frac{2}{15}$ pour le diametre de la Terre; d'où l'on tire que le diametre de la Terre est un peu moins de la 10^{me} partie du diametre de Jupiter. Nous avons trouvé que le diametre du 3^{me} Satellite est la 18^{me} partie du diametre de Jupiter, & que les diametres des trois autres sont la 20^{me} partie de celui de Jupiter; donc leurs diametres sont au moins la moitié de celui de la Terre, leurs surfaces sont le quart de celle de la Terre, & les globes sont la 8^{me} partie du globe de la Terre. Mais on trouvera que les globes de ces Satellites sont plus de six fois plus grands que celui de la Lune; car, suivant M. Cassini, le diametre de la Lune est au diametre de la Terre comme 27 à 100; les diametres des Satellites sont la moitié du diametre de la Ter-

Terre; donc le diametre de la Lune sera aux diametres de ces Sateillites comme 27 à 50, les surfaces comme 729 à 2500, & les globes comme 19683 à 125000, c'est-à-dire, comme 1 à 6, un peu plus; d'où il paroît que ces Satillites sont plus petits que la Terre, mais plus grands que la Lune.

On a remarqué, & il est rapporté dans plusieurs endroits des Mémoires de l'Académie, que la proportion des Satellites entre eux ne se trouve pas toujours la même. Le 4^{me} Satellite, qui le plus souvent paroît plus petit que les autres, paroît quelquefois le plus grand; le 3^{me}, qui ordinairement paroît le plus grand, paroît quelquefois égal aux autres, & même plus petit. Ces Satellites paroissent aussi plus petits, lorsqu'ils sont proche de Jupiter, que quand ils en sont éloignés, ce qui fut d'abord remarqué par Galilée; dont on a attribué la cause à la lumiere prochaine de Jupiter, qui offusque à notre égard celle des Satellites, comme fait la Lune aux Astres dont elle approche. Feu M. Cassini a de plus remarqué que le tems qu'un Satellite met à entrer dans le disque de Jupiter, ou à en sortir, ne paroît pas avoir toujours la même porportion au tems qu'il met à parcourir le diametre de Jupiter; & la durée de l'immersion qui dans la même conjonction devoit être égale à la durée de l'émer-sion, se trouve souvent inégale.

Il est vrai que l'obliquité de la ligne du mouvement d'un Satellite à la circonférence du disque de Jupiter, à mesure qu'un Satellite passe plus ou moins éloigné du centre,

cause un peu de difference; comme aussi le défaut de lumiere d'un Satellite & de Jupiter, dont ils doivent manquer vers les quadratures avec le Soleil, comme nous avons dit ci-dessus. Mais ces causes n'étant pas suffisantes pour expliquer la difference considerable du tems qu'un même Satellite met à entrer sur le disque de Jupiter & à en sortir, M. Cassini a cru pouvoir en attribuer une partie aux taches des Satellites, comme M. Godin l'a expliqué dans l'Histoire de l'Académie de 1694; il en rejette une autre partie sur la grande difficulté de déterminer précisément l'instant des phases de ces Satellites. Je suis persuadé que cette cause est la principale, & qu'il se glisse, dans les observations des Satellites de Jupiter, des erreurs qu'il est impossible d'éviter, & dont j'ai remarqué un effet très singulier dans les differences des Méridiens qu'on conclut des observations des Immersions des Satellites dans l'ombre, & de leurs Emersions.

La difference des Méridiens entre Greenwich & Paris, déterminée par les Eclipses des Satellites de Jupiter, résulte sensiblement plus grande par les observations des Immersions des Satellites dans l'ombre que par les Emersions, comme on peut voir par la comparaison que nous avons faite des unes & des autres. Il n'y a pas de doute que la difference ne vienne des erreurs glissées dans les observations; il paroît que les erreurs sont dans les observations faites à Greenwich. Car puisque la difference des Méridiens qui résulte des observations des Immersions est plus gran-

grande que celle qu'on conclut des observations des Emerfions, c'est une marque qu'on a observé à Greenwich les Immerfions trop tôt, & les Emerfions trop tard. En voici la preuve. Greenwich est plus occidental que Paris; & par conséquent on compte moins de tems dans le même instant à Greenwich qu'à Paris; il faut donc soustraire le tems d'une observation faite à Greenwich, du tems de la même observation faite à Paris, pour avoir la difference des Méridiens; donc la difference sera plus grande, lorsque le tems observé à Greenwich sera moindre qu'il ne doit être, & elle sera plus petite, lorsque le tems observé à Greenwich sera plus grand. Mais la plus grande difference des Méridiens résulte des observations des Immerfions; donc le tems auquel on a marqué ces phases à Greenwich a été moindre qu'il ne doit être; donc on a observé les Immerfions trop tôt, & la plus petite difference des Méridiens résulte des observations des Emerfions; donc le tems auquel on a marqué ces phases à Greenwich a été plus grand qu'il ne doit être; donc on a vu les Emerfions trop tard. Nous allons appliquer ce raisonnement à un exemple tiré des deux premières observations, afin de le rendre plus clair.

En l'année 1677 on observa à Greenwich l'Immerfion du premier Satellite dans l'ombre de Jupiter le 16 de Juin à $14^h 5' 46''$, & à Paris à $14^h 15' 10''$, qui donne la difference des Méridiens de $10' 24''$. Si au lieu d'avoir marqué à Greenwich l'Immerfion totale à $14^h 5' 46''$, on eût vu le Satellite une minute plus

plus tard à Greenwich, & qu'on n'eût marqué l'Immersion qu'à $14^h 6' 46''$, la difference ne seroit que de $9' 24''$; de même dans l'Emersion du même Satellite du 18 Septembre de la même année; si au-lieu d'avoir vu le Satellite à $11^h 42' 56''$ à Greenwich, & à Paris à $11^h 51' 46''$, ce qui donne $8' 50''$ seulement pour la difference des Méridiens, on eût vu le Satellite plutôt à Greenwich, & marqué l'Emersion à $11^h 41' 56''$, on auroit eu la difference des Méridiens de $9' 50''$, à 26 secondes près de celle qui résulte des observations des Immersions, au-lieu qu'il y a une difference d'une minute 30 secondes. Si on suppose que les erreurs sont dans les observations faites à Paris, & qu'on y applique le même raisonnement, on augmentera l'erreur dans la difference des Méridiens, au-lieu de la diminuer. On m'a assuré qu'à Londres & aux environs l'air est moins pur qu'à Paris, ce qui peut être une source de ces erreurs. La difference des Lunettes pourroit aussi y avoir quelque part; car M. Cassini, étant à Londres en 1698, observa une Immersion du 1^{er} Satellite avec une Lunette de 16 pieds, pareille à celles dont on se sert à l'Observatoire de Paris, & détermina par la comparaison de l'observation correspondante faite à Paris, la difference des Méridiens, entre Londres & Paris, de $9' 41''$, & celle entre l'Observatoire de Greenwich & celui de Paris de $9' 10''$, qui s'accorderoit à la difference moyenne qui résulte de nos Observations comparées à celles qui sont rapportées dans le

1^e Livre de l'Histoire Céleste de M. Flamsteed, telles qu'on les a marquées ci-dessous.

OBSERVATIONS

des Eclipses des Satellites de Jupiter faites
à Paris,


Avec les Correspondantes faites à Greenwich.

IMMERSIONS.

Immersions observées à Paris.					Les mêmes observées à Greenwich.				Differ. des merid.	
Jours. H. M. S.					Jours H. M. S				M. S.	
1677	Juin	16	14	16 10 Im. P.	16	14	5 46	10	24	
	Juillet	2	12	29 0 Im. P.	2	12	18 56	10	4	
1680	Oct.	21	14	56 48 Im. P.	21	14	47 20	9	28	
		23	9	25 44 Im. P.	23	9	15 46	9	58	
1681	Oct.	26	12	39 46 Im. P.	26	12	29 36	10	10	
1681	Nov.	18	12	47 48 Im. P.	18	12	37 40	10	18	
	Dec.	21	8	43 40 Im. S.	21	8	33 15	10	25	
1682	Oct.	29	15	45 21 Im. P.	29	15	35 18	10	3	
	Dec.	7	14	0 25 Im. P.	7	13	50 12	10	13	
	Dec.	14	15	50 17 Im. P.	14	15	41 0	9	17	
1684	Fevr.	12	9	36 52 Im. P.	12	9	27 10	9	42	
1690	Août	30	11	30 58 Im. P.	30	11	21 26	9	32	
1691	Oct.	9	7	33 42 Im. P.	9	7	23 40	10	2	
1692	Août	14	12	47 34 Im. P.	14	12	36 45	10	49	
1694	Mars	27	13	37 24 Im. T.	27	13	27 44	9	40	
1695	Janv.	21	18	11 29 Im. P.	21	18	1 32	9	57	
	Oct.	19	17	34 24 Im. P.	19	17	24 6	10	18	
1697	Mars	14	11	12 50 Im. S.	14	11	1 23	11	27	
1698	Fevr.	9	14	44 28 Im. P.	9	14	34 24	10	4	

E M E R S I O N S.

Emerfions obfervées à Paris.					Les mêmes obfervées à Greenwich.				Differ. des Merid.	
Jours. H. M. S.					J. H. M. S.				M. S.	
1677	Sept. 18	11	51	46 Em. P.	18	11	42	56	8	50
	Sept. 27	8	18	30 Em. P.	27	8	9	40	8	50
1682	Mars 15	10	12	40 Em. s.	15	10	3	53	8	47
1688	Sept. 6	9	46	7 Em. T.	6	9	36	40	9	27
1690	Nov. 9	9	5	20 Em. F.	9	8	56	8	9	12
1691	Fevr. 13	6	42	14 Em. s.	13	6	33	20	8	54
	Dec. 19	11	59	15 Em. s.	19	11	47	17	7	58
1693	Mars 4	9	15	25 Em. P.	4	9	5	54	9	31
1694	Mai 1	9	31	51 Em. P.	1	9	24	8	7	43
1695	Avril 11	12	3	13 Em. T.	11	11	54	47	8	26
1696	Juin 23	10	4	53 Em. P.	23	9	56	40	8	13
1697	Avril 27	8	33	38 Em. s.	27	8	25	25	8	13
	Mai 17	13	5	38 Em. P.	17	12	56	56	8	42
1701	Nov. 8	10	25	43 Em. P.	8	10	16	28	9	15



SUR LES COURBES TAUTOCHRONES.

Par M. FONTAINE. *


PAR COURBE TAUTOCHRONE, j'entends une Courbe dont tous les arcs, comptés du point le plus bas, seront descendus ou remontés dans des tems égaux.

Je distingue deux manieres d'être Tautochrone, parce que quoique dans quelques hy-

* 17 Février 1734.

hypothèses une même Courbe le soit en même tems des deux, il doit y en avoir une infinité d'autres où elle ne pourra l'être que d'une seule.

On a la détermination de ces Courbes pour quelques cas particuliers, mais on n'a point encore de Méthode générale pour toutes les hypothèses de pesanteur & de résistance, & voici en quoi consiste la difficulté. Soit la Courbe $AMM'B$, on veut que cette courbe soit telle que tous ses arcs AM , AM' , &c. soient parcourus en tems égaux, soit en montant, soit en descendant, ou plus généralement on veut que les tems soient commune fonction donnée des arcs & des abscisses correspondantes.



On voit d'abord que pour donner une origine fixe aux abscisses, il faut toujours concevoir le corps partant de A , & que pour représenter la descente, au-lieu que le milieu retarde, il n'y a qu'à imaginer qu'il accélère, & du reste naturellement on s'y prendroit ainsi, on commenceroit par déterminer la vitesse dans un point quelconque m de l'arc AM , pour avoir le petit tems de m en μ ;

ayant ce tems, on en prendroit la FLuente, & on auroit le tems de A en m , on substituerait pour les lignes Am , Ap , les lignes AM , AP , & on auroit généralement pour toute courbe le tems de A en M , on égaleroit ce tems à la fonction donnée, & cette Equation détermineroit la courbe $AMM'B$. Mais 1°. il n'y a que quelques hypotheses ou l'on puisse avoir la vitesse; 2°. Quand bien même on auroit cette vitesse, on ne pourroit pas intégrer l'élément du tems. Dans les cas où l'on peut avoir la vitesse, voyons ce que M^{rs}. Newton & Bernoulli nous ont donné.

Soit, en premier lieu; le milieu sans résistance, & soit la force telle qu'on voudra; décrivez une courbe, telle que la partie de cette force qui retardera le long de ses petits côtés soit toujours comme l'arc parcouru, cette courbe sera tautochrone.

Car soit l'arc à parcourir $AM = X$, l'arc parcouru $Am = x$, l'arc que le corps parcourt actuellement $= \dot{x}$, la vitesse qu'a le corps en $m = y$, celle qu'il perd de m en $\mu = \dot{y}$, le tems total de A en $M = T$, le tems écoulé de A en $m = t$, le tems présent $= \dot{t}$, & soit la force

$= nx$, on aura $(-nx) \cdot \frac{\dot{x}}{y} = \dot{y}$, ou $nx\dot{x}$

$+ y\dot{y} = 0$, donc $nx^2 + y^2 = nX^2$, & $\dot{y} = n^{\frac{1}{2}}$

$(X^2 - x^2)^{\frac{1}{2}}$, donc $\dot{t} = \frac{n^{-\frac{1}{2}} \dot{x}}{\sqrt{X^2 - x^2}}$ &

$t = FL$

$$z = FL\left(\frac{x^{-\frac{1}{2}}}{\sqrt{X^2 - x^2}}\right), \text{ mais } FL\left(\frac{x^{-\frac{1}{2}}}{\sqrt{X^2 - x^2}}\right)$$

est une fonction de dimension nulle de X & de x ; donc si on avoit cette FLuente, & qu'on substituât pour x , X , on auroit T égal à une fonction de dimension nulle de X , c'est-à-dire, à un nombre constant.

Soit en second lieu la résistance du milieu $= \frac{y^2}{n}$, & soit la force égale à la gravité or-

dinaire $= g$, l'abscisse verticale $Ap = z$, on aura $(-\frac{g z}{x} \pm \frac{y^2}{n}) \cdot \frac{\dot{x}}{y} = \dot{y}$,

$$\text{ou } g z \mp \frac{1}{n} y^2 x + y \dot{y} = 0,$$

$$\text{ou } g C^{\mp \frac{2}{n} x} \cdot z \mp \frac{1}{n} C^{\mp \frac{2}{n} x} \cdot y^2 x + C^{\mp \frac{2}{n} x} y \dot{y} = 0,$$

(par C j'entends le nombre dont le logarithme

est 1) ou $g FL(C^{\mp \frac{2}{n} x} z) + \frac{1}{2} C^{\mp \frac{2}{n} x}$

$\cdot y^2 = g FL(C^{\mp \frac{2}{n} x} Z)$ donc $y = \sqrt{2g \cdot C^{\mp \frac{1}{n} x}}$

$\cdot \sqrt{FL(C^{\mp \frac{2}{n} x} Z) - FL(C^{\mp \frac{2}{n} x} z)}$ &

$$z = \frac{C^{\mp \frac{1}{n} x}}{x}$$

$$\sqrt{2g} \cdot \sqrt{FL(C^{\mp \frac{2}{n} x} Z) - FL(C^{\mp \frac{2}{n} x} z)}$$

Pour que T soit un nombre constant, il faut
ro. que la quantité précédente soit une fon-
Z 5 tion:

tion de dimension nulle de deux autres fonctions; 2°. que l'une de ces fonctions devienne l'autre, lorsque x deviendra $=X$, & que toutes les deux soient $=0$, lorsque x & X seront $=0$.

Soit $z = \sqrt[m]{\frac{2n}{m}} x \pm \sqrt[m]{\frac{2n}{m}} C^{\pm \frac{1}{n} x} \cdot \dot{x}$, & on

trouvera que $\frac{C^{\pm \frac{1}{n} x} \cdot \dot{x}}{x}$

$\sqrt[FL]{C^{\pm \frac{2}{n} X} Z} - \sqrt[FL]{C^{\pm \frac{2}{n} x} \dot{x}}$
est une fonction de dimension nulle de

$(\sqrt[m]{\frac{n}{m}} C^{\pm \frac{1}{n} x} \pm \sqrt[m]{\frac{n}{m}})$ & de $(\sqrt[m]{\frac{n}{m}} C^{\pm \frac{1}{n} X} \pm \sqrt[m]{\frac{n}{m}})$,

& que par conséquent la courbe est tautochrone.

Maintenant voici une méthode qui ne demande point qu'on ait la vitesse, & qui paroît générale pour tous les Problèmes de ce genre: mais avant tout je dois avertir que comme j'ai été obligé, dans mes calculs, de faire varier les mêmes lignes de deux manières différentes, il a fallu que je désigne leurs variations différemment; j'ai marqué les unes à la façon des Anglois par des *fluxions*, les autres par des *différences*, à notre manière, en sorte qu'ici dx ne fera pas la même chose que $\dot{x}$, $d\dot{x}$ que $\ddot{x}$, &c.

EXEMPLE I.

Dans l'hypothèse de la gravité ordinaire & d'un

d'un milieu sans résistance, on deman-

de que $T = \frac{x^m}{A^m}$.

Soient ici les mêmes dénominations que précédemment; & soit de

plus $z = px$, $p = qx$,

$q = rx$, &c. on au-

ra $(-gp) \cdot \frac{z}{y} = \ddot{y}$,

ou $gpz + yy = 0$.

Il faut à présent faire en sorte que lorsque x devien-

dra $= X$, $FL(\frac{x}{y})$

devienne $= \frac{x^m}{A^m}$.

Pour cet effet, je prends sur la courbe $AMMB$ un autre arc AM' infiniment peu différent du premier, & je fais ce nouvel arc à parcourir $AM' = X'$,

le tems pour le par-



Z 6

l'arc

l'arc parcouru $Am' = x'$, la vîtesse au point $m' = y'$, le petit arc $m'\mu' = x'$, la vîtesse que le corps perd de m' en $\mu' = y'$, & on aura ici,

comme dans l'autre arc, $gp'x' + y'y' = 0$. Soit $X' - X = dX$, $x' - x = dx$, $y' - y = dy$, $\dot{x}' - \dot{x} = d\dot{x}$, $\dot{y}' - \dot{y} = d\dot{y}$.

Et on aura $(gp'x' + y'y') - (gp'x + y'y) = d(gp'x + y'y) = 0$. Donc $gp'dx + gq'xdx + ydy + ydy = 0$. Je suppose $dx = \phi dX$, & par ϕ , j'entends une fonction de X & de x .

Soit $\phi = \gamma x$, $\gamma = \lambda x$, $\lambda = \mu x$, &c. Donc $dx = \gamma x dX$. Pour avoir dy , je fais la proportion suivante qui renferme les conditions du Problème, $FL(\frac{\dot{x}}{y}) : FL(\frac{\dot{x}}{y}) :: T$, ou $(\frac{X^m}{A^m}) : T$, ou $(\frac{X^m}{A^m})$. Ou, en divisant, $dFL(\frac{\dot{x}}{y})$

$: FL(\frac{\dot{x}}{y}) :: m dX : X$. Donc $dFL(\frac{\dot{x}}{y}) = \frac{m dX}{X} FL(\frac{\dot{x}}{y})$. Donc $d(\frac{\dot{x}}{y}) = \frac{m dX}{X} (\frac{\dot{x}}{y})$.

Donc $y d\dot{x} - \dot{x} dy = \frac{m dX}{X} y \dot{x}$. Donc $dy = \gamma y dX - \frac{m y dX}{X}$ & $d\dot{y} = \gamma \dot{y} dX + \lambda y \dot{x} dX - \frac{m \dot{y} dX}{X}$.

Substituons ces valeurs dans notre Equation fluxio.

fluxio-differentielle, & elle deviendra $gp\dot{\gamma}\dot{x}$

$$+ gq\dot{\varphi}\dot{x} + 2\gamma\dot{y}\dot{y} + \lambda y^2 \dot{x} - \frac{2m\dot{y}\dot{y}}{X} = 0, \text{ ou}$$

$$g\left(\frac{p\gamma + q\varphi}{2\gamma - \frac{2m}{X}}\right)\dot{x} + \frac{\lambda}{2\gamma - \frac{2m}{X}}y^2 \dot{x} + \dot{y}\dot{y} = 0.$$

Faisons que cette Equation soit la même,

terme à terme, que celle-ci, $gp\dot{x} + \dot{y}\dot{y} = 0$, & par-là nous aurons les deux Equations sui-

vantes, $\lambda = 0$, $\frac{p\gamma + q\varphi}{2\gamma - \frac{2m}{X}} = p$. Donc $\lambda\dot{x} = 0$.

Donc $\gamma = M$. Donc $\gamma\dot{x} = M\dot{x}$. Donc $\varphi = Mx + N$. Mais φ doit être $= 0$ lorsque $x = 0$, & $= 1$ lorsque $x = X$; car au commencement du mouvement, la difference des arcs parcourus en tems proportionnels est nulle, & à la fin elle est égale à la difference totale des deux arcs. Donc $N = 0$ &

$M = \frac{1}{X}$. Donc $\varphi = \frac{x}{X}$ & $\gamma = \frac{1}{X}$. Je substitue ces valeurs dans la seconde Equation, & elle devient $\frac{p + qx}{2 - 2m} = p$, ou $(1 - 2m)$

$p = qx$. Donc $(1 - 2m) \frac{\dot{x}}{x} = \frac{q\dot{x}}{p}$, & par conséquent $(1 - 2m) \int \frac{\dot{x}}{x} = (1 - 2m) \int \frac{q}{p}$.

Donc $b^{2m-1} x^{1-2m} = p$. Donc $p\dot{x} = \dot{z}$ $= b^{2m-1} x^{1-2m} \dot{x}$. Donc enfin $z = e^{2m-1}$

x^{2-2m} . Si $m = 0$, on aura $ez = x^2$, comme.

me on le fait depuis longtems ; si $m = \frac{1}{2}$, on aura $z = x$, ou en général, si nous eussions pris la fluente autrement, $z = nx$.

EXEMPLE II.

Supposons à présent que le mouvement se fasse dans un Milieu qui résiste en raison de la vitesse, & qu'on veuille une Courbe où tous les tems soient égaux, l'Equation sera

$$(-gp \pm ny) \frac{\dot{x}}{y} = \dot{y}, \text{ ou } gp\dot{x} \mp ny\dot{x} + y\dot{y} = 0,$$

& sa difference $gpdx + gqxdx \mp nydx \mp nx dy + ydy + ydy = 0$. Substituons pour dx & $d\dot{x}$, dy & $d\dot{y}$ leurs valeurs, & nous aurons cette Equation-ci

$$gp\dot{y}\dot{x} + gq\dot{\phi}\dot{x} \mp 2ny\dot{y}\dot{x} + 2y\dot{y}\dot{y} + \lambda y^2\dot{x} = 0,$$

$$\text{ou } g. \left(\frac{p\dot{y} + q\dot{\phi}}{2y} \right) \dot{x} \mp ny\dot{x} + \frac{\lambda}{2y} y^2\dot{x} + y\dot{y} = 0,$$

dont les termes, comparés avec ceux de la premiere, donneront $\lambda = 0$ & $\frac{p\dot{y} + q\dot{\phi}}{2y} = p$.

Si on fait ces deux Equations, comme dans l'exemple précédent, on trouvera $z = e^{-1} x^2$.

EXEMPLE III.

Soit la résistance $= \frac{y^2}{n}$, & qu'on veuille la Tautochrone de cette hypothese, l'Equation

tion fera $(-gp \pm \frac{1}{n} y^2) \frac{\dot{x}}{y} = \dot{y}$, ou $gp \dot{x}$

$\mp \frac{1}{n} y^2 \dot{x} + y \dot{y} = 0$, la difference fera $gp dx$

$+ gq x dx \mp \frac{1}{n} y^2 dx \mp \frac{2}{n} y x dy + y dy$

$+ y dy = 0$, & après la substitution on aura

$gp \dot{x} + gq \phi \dot{x} \mp \frac{3}{n} \gamma y^2 \dot{x} + 2\gamma y \dot{y} + \lambda y^2 \dot{x} = 0$,

ou $g(\frac{p\gamma + q\phi}{2\gamma}) \dot{x} + (\frac{\mp \frac{3}{n} \gamma + \lambda}{2\gamma}) y^2 \dot{x} + y \dot{y} = 0$;

& en comparant $\frac{\mp \frac{3}{n} \gamma + \lambda}{2\gamma} = \mp \frac{1}{n}$ &

$\frac{p\gamma + q\phi}{2\gamma} = p$, donc 1°. $\mp \frac{1}{n} \gamma \dot{x} + \lambda \dot{x} = 0$,

donc $\mp \frac{1}{n} \phi + \gamma = M$, ou $\pm \frac{1}{n} \dot{x} = \frac{\gamma \dot{x}}{\phi \mp nM}$,

donc $\pm \frac{1}{n} \dot{x} = l(\phi \pm nM) + lN$, & par

conséquent $N\phi \pm nNM = C^{\pm \frac{1}{n} x}$, & en remplissant les conditions que ϕ soit $= 0$ au commencement & $= 1$ à la fin, on aura

$\pm nNM = 1$ & $N \pm nMN = C^{\pm \frac{1}{n} x}$, d'où

l'on tirera $M = \pm (\frac{1}{nC^{\pm \frac{1}{n} x}} - n)$ &

$N = C$

$$N = C^{\pm \frac{1}{n} X} - 1, \text{ donc } \varphi = \frac{C^{\pm \frac{1}{n} x} - 1}{C^{\pm \frac{1}{n} X} - 1}$$

$$\& \gamma = \frac{\pm \frac{1}{n} C^{\pm \frac{1}{n} x}}{C^{\pm \frac{1}{n} X} - 1}. \quad \text{Donc}$$

$$2^{\circ}. \frac{\pm \frac{1}{n} C^{\pm \frac{1}{n} x} x}{C^{\pm \frac{1}{n} x} - 1} = \frac{qx}{p}, \text{ donc}$$

$$l(C^{\pm \frac{1}{n} x} - 1) = lp + lm, \& \text{ par conséquent } mp = C^{\pm \frac{1}{n} x} - 1, \text{ donc } mp x$$

$$= mz = C^{\pm \frac{1}{n} x} x - x, \text{ donc } mz = \pm$$

$$nC^{\pm \frac{1}{n} x} - x \mp n; \& \text{ si l'on veut avoir une Equation sans quantité exponentielle, il}$$

$$\text{n'y aura qu'à faire } \pm nC^{\pm \frac{1}{n} x} = mz \pm n \mp x$$

$$\& \pm nC^{\pm \frac{1}{n} x} = \frac{\pm mnz \pm nx}{x}, \& \text{ on tirera}$$

$$\pm mnz = mz x \mp nx.$$

EXEM

EXEMPLE IV.

Soit la résistance $= \frac{y^2 + my}{n}$, & trouvons encore la Tautochrone de cette hypothese, qui est celle de la nature, quoiqu'apparemment cette courbe ne puisse être d'aucun usage, attendu que si les oscillations de gauche à droite sont isochrones, celles de droite à gauche ne le feront pas. Dans ce cas-ci,

$$\text{nous aurons } (-gp \pm \frac{1}{n} y^2 \pm \frac{m}{n} y) \frac{\dot{x}}{y} = \dot{y},$$

$$\text{ou } gp \dot{x} \mp \frac{1}{n} y^2 \dot{x} \mp \frac{m}{n} y \dot{x} + y \dot{y} = 0. \text{ Pre-}$$

$$\text{nons la difference } gp dx + g q x dx \mp \frac{1}{n} y^2 dx$$

$$\mp \frac{2}{n} y x dy \mp \frac{m}{n} y dx \mp \frac{m}{n} x dy + y dy$$

$$+ y dy = 0. \text{ Substituons, \& elle deviendra}$$

$$gp \dot{x} + g q \dot{x} \mp \frac{3}{n} y y^2 \dot{x} \mp \frac{2m}{n} y y \dot{x}$$

$$+ 2 y y \dot{y} + \lambda y^2 \dot{x} = 0, \text{ ou } g \left(\frac{p y + q \phi}{2 y} \right)$$

$$\dot{x} + \left(\frac{\mp \frac{3}{n} y + \lambda}{2 y} \right) y^2 \dot{x} \mp \frac{m}{n} y \dot{x} + y \dot{y} = 0.$$

Comparons, & nous trouverons les mêmes équations que dans l'hypothese précédente, ce qui prouve que la Tautochrone l'est aussi de celle-ci.

PRE-

PREMIERE REMARQUE.

Soit en général la force le long des petits côtés de la courbe $=f$, la résistance $=p$, le tems $=T$, & $dT = SdX$, & on aura $(-f \pm p) \frac{\dot{x}}{y} = \dot{y}$, ou $f\dot{x} \mp p\dot{x} + y\dot{y} = 0$, & $dy = y - \frac{S}{T}y$: mais il arrivera très-souvent que les deux Equations fluxionelles qui dans les exemples précédens ont toujours été comparables, ne le seront pas ; alors il faudra, par le moyen de ces deux Equations, faire disparoitre les y ; & ensuite T ou z étant donné, tâcher de déterminer l'autre par les méthodes ordinaires, & en remplissant les deux conditions de ϕ .

SECONDE REMARQUE.

Il est évident que si au lieu de l'Equation des forces, on avoit toute autre Equation entre le parametre A de la courbe AB , l'abscisse totale X , l'abscisse partielle x , l'ordonnée y , en termes finis ou en fluxions, il est évident que la méthode précédente pourroit également servir non seulement à trouver ce que deviendrait

$FL \left(\frac{\dot{x}}{y} \right)$, mais toute autre fonction donnée de ces lignes (comme $FL (y\dot{x})$ ou $FL (\dot{x}^2 + \dot{y}^2)^{\frac{1}{2}}$ ou, &c.) lorsque x deviendrait $=X$, ou réciproquement à faire que
cette

cette fonction devint une quantité donnée, x devenant $= X$, & qu'ainsi il peut y avoir une infinité de Problèmes qui dépendent de cette méthode fluxio-differentielle.

ANALYSE DES PLÂTRAS.

Par M. PETIT le Médecin. *

J'AI donné un Mémoire † sur la précipitation du Sel marin dans la fabrique du Salpêtre, dans lequel j'ai dit ‡ que la liqueur qui fournit le Salpêtre est une lessive faite avec de l'eau passée plusieurs fois sur des Cendres, & des Plâtras brisés presque en poussière. Les Cendres fournissent un sel fixe. Les Plâtras sont empreints de deux especes de sel armoniac, l'un nitreux, & l'autre salin; ce qui sera prouvé dans un Mémoire que je donnerai sur cette matiere. Ce Mémoire est l'analyse de l'Eau-mere de salpêtre, que je m'étois proposé de donner: j'y ai travaillé; mais j'y ai trouvé tant de choses à examiner, que je me suis trouvé obligé de le diviser en trois parties. La premiere fera l'analyse des Plâtras. La seconde sera un détail des expériences faites sur le Sel fixe de bois neuf & de bois flotté, & de plusieurs autres sels fixes de plantes capables de produire du salpêtre avec l'impregnation de Plâtras.

* 26 Juin 1734.

† V. les Mém. de l'Académie, an. 1729. p. 319.

‡ p. 326. 327.

tras, & avec l'esprit de nitre. La troisieme sera sur l'Eau mere de Salpêtre. Je vais donner l'analyse des Plâtras.

Il s'agit d'abord de savoir si le salpêtre se trouve dans les plâtras, comme le croient les salpêtriers, & comme ils l'ont fait croire au public; ou dans les cendres; ou bien s'il se forme de la combinaison des parties salines qui sont contenues dans l'un & dans l'autre: & c'est ce que nous pouvons découvrir par l'analyse de l'un & de l'autre.

Les salpêtriers croient que les plâtras contiennent du salpêtre, parce qu'ils en ont effectivement retiré sans le secours des cendres; mais ils n'ont pas pris garde qu'ils avoient mis eux-mêmes le salpêtre dans les plâtras qu'ils avoient en réserve dans leurs hangars, & sur lesquels ils ont coutume de jeter les écumes & les fondrilles de leur cuite, & le plus souvent leur eau-mere. Toutes ces matieres contiennent beaucoup de salpêtre & de sel marin, qu'ils peuvent retirer sans le secours des cendres. Mais comme ce salpêtre ne leur paroissoit pas si beau que celui où l'on a employé la cendre, ils ont cru que cette cendre ne servoit qu'à dégraisser les plâtras. Ainsi lorsqu'on se propose de travailler sur les plâtras, il ne faut pas en prendre chez les salpêtriers, il vaut mieux prendre immédiatement ceux que l'on trouve dans les démolitions des maisons; mais il y a un choix à faire. Les salpêtriers disent que pour connoître les bons plâtras il faut en mettre sur la langue, & que ceux qui ont le goût piquant & salé, sont les meilleurs.

leurs. Il faut joindre à cela que ces plâtras sont un peu gris, & qu'étant mis en poudre & jettés sur les charbons ardents, ils produisent des étincelles de feu: plus ils en produisent, meilleurs ils sont. Ils ont outre cela une certaine onctuosité en les frottant entre les doigts, que les autres plâtras n'ont pas. On les trouve dans les vieilles maisons, dans les lieux bas, où le Soleil ne donne pas, & où l'on ne fait point de feu, & même dans les maisons de moyen âge, principalement si on les prend des démolitions des murailles d'écuries & de latrines; & ce sont de ces plâtras que j'ai choisis dans la maison où je demeure, où l'on a été obligé d'abbattre une cloison de plâtre qui separoit l'écurie des latrines. J'ai trouvé ces plâtras très bons & très propres à exécuter le dessein que j'avois d'en faire l'analyse.

J'ai pris douze livres de ces plâtras battus en poudre grossiere, je les ai mis dans une grande bassine d'étain avec 18 livres d'eau, je les ai fait chauffer sur un fourneau pendant 3 ou 4 heures, en les remuant de tems en tems, pour tirer plus promptement la teinture des plâtras; je l'ai filtré par le papier gris. On peut se dispenser de la faire chauffer si l'on veut; car soit que l'on fasse couler de l'eau froide ou chaude dessus ces plâtras en maniere de lessive, soit qu'on les mette tremper à froid dans des vaisseaux de terre ou d'étain pendant 8 ou 10 jours, en remuant les plâtras plusieurs fois dans la journée, on tire toujours la même teinture, qui est plus ou moins forte selon la bonté des plâ-

plâtras, & selon la quantité d'eau qu'on emploie. Je l'ai fait de toutes ces manieres; j'ai trouvé peu de difference dans la teinture qui est ordinairement jaune, transparente, amere & d'une légère âcreté.

Sa pesanteur spécifique est pour l'ordinaire à celle de l'eau, comme 38 à 37, ou comme 32 à 31, & quelquefois comme 27 à 26.

Après bien des essais, j'ai tiré à plusieurs fois la teinture de 50 livres de plâtras avec 72 livres d'eau; j'ai filtré cette teinture par le papier gris, je l'ai fait évaporer jusqu'à ce que je me suis apperçu qu'elle étoit bien chargée de parties salines *, ce qui est marqué par une âcreté plus forte & une plus grande amertume, & la couleur rougeâtre; sa pesanteur spécifique étoit à celle de l'eau comme 4 à 3; il y en avoit 4 livres, elle étoit limpide, gris-de-lin: je l'ai fait évaporer jusqu'à consistance d'extrait liquide; car je n'ai pu la faire évaporer jusqu'à ficcité; mais lorsqu'elle a été refroidie, elle s'est trouvée plus ferme que du beurre. Cette matière se résout facilement à l'air en une liqueur qui a la consistance de syrop. Je l'ai filtrée, sa pesanteur est à l'eau comme 5 à 3, & plus. Si l'on continue de la laisser à l'air, elle s'imbibé de plus en plus de l'humidité de l'air, & diminue de pesanteur spécifique. C'est avec cette impregnation que j'ai fait les expériences suivantes.

10. Elle

* C'est le seul moyen de la faire très forte, & l'on n'en viendroit pas à bout, en reversant plusieurs fois la même impregnation ou teinture sur de nouveau plâtras; l'on consommeroit beaucoup de plâtras inutilement, & l'on perdrait bien du tems.

1^o. Elle rougit le papier bleu d'un rouge pourpre. Il y a des impregnations qui le rougissent plus les unes que les autres.

2^o. Mêlée avec partie égale d'esprit de nitre, elle n'a produit aucun changement. La même chose est arrivée avec l'esprit de sel.

3^o. J'ai mis une feuille d'or dans le mélange d'impregnation & d'esprit de nitre, elle se dissout en 5 ou 6 minutes, si on la remue pendant ce tems-là. La liqueur étoit plus transparente deux heures après avoir mis cette feuille, qu'elle n'étoit auparavant.

J'ai mis une feuille d'or dans le mélange d'impregnation & d'esprit de sel, cette feuille s'est dissoute de même en 5 ou 6 minutes. Je n'ignore pas que de très habiles Chimistes ont cru * que l'esprit de sel seul dissolvoit l'or; mais ils n'avoient pas pris garde apparemment que cet esprit de sel étoit peut-être fait avec du sel marin des salpêtriers. J'ai même pris de l'esprit de sel chez de fameux Chimistes, qui dissolvoit l'or †. Mais M. Geoffroy & M. Boulduc ont apporté à l'Académie, chacun en particulier, de l'esprit de sel qu'ils avoient fait eux-mêmes, qui n'a pu dissoudre des feuilles d'or, quoiqu'on l'ait fait chauffer très fort; j'ai ajouté de l'impregnation de plâtras à cet esprit de sel, qui a pour-lors dissous les feuilles d'or.

4^o. J'ai fait dissoudre une feuille d'argent dans l'esprit de nitre, j'y ai mêlé l'impregnation.

* V les Mém. de l'Académie, 1700. p. 87. 1706. p. 177.

† Mém. 1711. p. 72.

tion. Le mélange s'est troublé, il s'est fait un précipité blanc dont une partie est tombée au fond de la liqueur, & l'autre a nagé dessus.

5°. Notre impregnation s'est coagulée avec partie égale d'huile de vitriol *, le mélange a fermenté avec une grande chaleur, & a donné des vapeurs rouges qui sentoient l'eau forte, & en a donné pendant plusieurs jours toutes les fois que j'ai remué ce mélange. Si l'on ajoute encore de l'huile de vitriol, elle fermente avec chaleur & fumée, le tout devient plus liquide & fait un précipité très blanc au fond de la liqueur transparente.

Si l'on met une feuille d'or* sur ce mélange, elle se dissout presque par la vapeur qui s'en exhale.

J'ai fait le même mélange, j'ai mis de l'eau pour dissoudre les sels, & retenir les vapeurs, je l'ai laissé jusqu'au lendemain, j'ai tiré la liqueur fumageante & claire, j'y ai mis une feuille d'or, elle s'y est dissoute en 12 heures, du moins elle a été divisée en une poussière très menue †.

6°. L'im-

* Cette huile de vitriol étoit concentrée, & sa pesanteur spécifique étoit à l'eau commune comme 28 à 15.

† L'esprit de nitre ne fait aucun effet sur le coagulum produit par le mélange d'impregnation de plâtras avec l'huile de vitriol; il n'en fait point du tout, ni sur la liqueur transparente en particulier, ni sur le précipité.

L'esprit volatil d'urine fermente très fort avec le mélange d'impregnation de plâtras & d'huile de vitriol, mais sans produire beaucoup de chaleur; tout le coagulum se dissout, & ne laisse qu'un très léger précipité.

L'esprit

6°. L'impregnation ne s'est point d'abord mêlée avec l'huile de tartre par défaillance, & ces deux liqueurs se sont tenues séparées *, il ne s'est pour-lors exhalé aucune odeur urineuse; j'ai mêlé les deux liqueurs, je les ai bien remuées avec une verge de verre, le mélange s'est coagulé en consistance de beurre blanc, & avoit l'odeur urineuse.

Si on ajoute à ce mélange un peu de dissolution de sublimé corrosif, on ne s'apperoit plus d'odeur urineuse; la même chose arrive, si au-lieu d'impregnation on se sert de dissolution de sel armoniac; si l'on remue très fort le mélange, elle se fait encore sentir, mais elle cesse en ajoutant de la solution de sublimé corrosif: c'est sans doute parce que l'esprit de sel & de nitre s'unit avec les sels volatils, & les empêche de s'exhaler; & une preuve de cela, c'est que l'esprit de nitre ou de sel mis à la place de la solution de sublimé, produit le même effet, mais il fermente avec l'huile de tartre, & dissout le coagulum, puis il se fait un précipité salin.

Si on ajoute de l'huile de vitriol au mélange

• L'esprit de sel armoniac par la chaux n'a produit qu'un peu de chaleur & de fumée, sans fermentation.

Si l'on ajoute de l'huile de tartre au mélange d'impregnation & d'huile de vitriol, il se fait une grande fermentation, puis beaucoup de précipité.

* L'impregnation est tombée au fond de l'huile de tartre, parce qu'elle étoit plus pesante; sa pesanteur étoit à celle de l'eau commune, comme 5 à 3, & celle de l'huile de tartre étoit comme 3 à 2; ainsi la pesanteur de l'impregnation étoit à celle de l'huile de tartre comme 50 à 45, ou comme 10 à 9.

Mém. 1734.

A a

lange de l'impregnation de plâtras & d'huile de tartre par défaillance, le tout fermente avec une grande chaleur, il se fait beaucoup de précipité.

L'esprit de nitre produit le même effet, mais il dissout le coagulum sans laisser de précipité, à moins d'y ajouter beaucoup d'esprit de nitre. L'on demande la raison pourquoi le mélange d'impregnation de plâtras & d'huile de vitriol, ou bien d'huile de tartre, produit un coagulum: je crois que cela ne vient que de la quantité de parties salines que ces matieres contiennent, mais principalement de la quantité de terre plâtreuse qui se trouve dans l'impregnation; & ce qui le prouve très bien, c'est que si l'on prend la dissolution de la matiere qui reste dans la cornue dans laquelle on a distillé l'esprit de sel armoniac avec la chaux, cette dissolution fait un coagulum très épais avec l'huile de tartre par défaillance; voici encore une autre preuve. J'ai pris une once & demie de sel de chaux, c'est cette matiere qui se forme sur l'eau de chaux; je l'ai mis dans deux onces & demie d'esprit de nitre, qui a dissout ce sel avec chaleur & une grande effervescence, il s'est fait un précipité. J'ai ajouté de l'eau, je l'ai filtrée & évaporée de maniere qu'elle étoit bien chargée de matiere dissoute, j'en ai mêlé avec l'huile de tartre par défaillance, je l'ai bien remuée, elle est devenue épaisse comme du beurre; ce qui est une seconde preuve que la partie terreuse est la principale matiere qui fait ce coagulum. On peut ajouter à ceci, que l'impregnation, fa

fait un coagulum avec les fortes dissolutions de vitriol d'Angleterre, de vitriol de Chypre, de vitriol blanc, & avec la dissolution d'alun, toutes matieres qui contiennent beaucoup de terre.

J'ai dit ci-dessus, qu'il faut bien remuer le mélange d'impregnation & d'huile de tartre par défaillance, sans cela on ne feroit point de coagulum; ce que j'ai voulu experimenter. J'ai mis de l'impregnation dans un gobelet, j'y ai versé partie égale d'huile de tartre, je ne les ai point remuées, ces deux liqueurs se sont toujours tenues séparées sans se mêler, on voyoit au contact des deux liqueurs une légère coagulation. Quinze jours après, l'impregnation étoit séchée en un sel blanc qui n'avoit aucune âcreté, il avoit un goût de salpêtre terreux mêlé de lixiviel: j'en ai mis sur les charbons ardens, il n'a jetté que quelques étincelles, & a bouilli; ce sel, en se formant, avoit laissé des vuides qui étoient entre des lames & des aiguilles, ce qui marque une crySTALLISATION. J'ai mis de ce sel dans de l'esprit de nitre, il a fermenté comme du sel fixe de tartre, & a produit un peu de précipité salin. L'huile de tartre qui étoit au fond du gobelet, dessous le sel dont je viens de parler, étoit devenue jaune & âcre; elle a fermenté avec l'esprit de nitre, comme l'huile de tartre ordinaire, & a fait un précipité salin. J'ai brouillé ensemble ce qui me restoit d'huile de tartre, de sel & d'impregnation dans le gobelet, pour voir si j'en formerois un coagulum en forme de beurre; mais il ne s'en est point produit, le sel est tombé

au fond de la liqueur jaune, & ne s'y est point dissout.

7°. Si l'on mêle de l'impregnation avec partie égale de dissolution de sublimé corrosif, il n'arrive aucun changement, quelque agitation que vous donniez à ce mélange; mais si on ajoute de l'huile de tartre par défaillance, le mélange se trouble, & en le remuant avec un stilet ou verge de verre, il devient comme du beurre très blanc *. Si on y ajoute de la solution de sublimé corrosif, il devient orangé, & à force de le remuer il devient blanchâtre, & enfin fait un précipité blanc au fond de la liqueur transparente. Ainsi on ne sera pas étonné de voir que le mélange d'huile de tartre & de solution de sublimé corrosif, qui devient d'abord orangé, devienne blanc après y avoir ajouté de l'impregnation de plâtras. On ne sent aucune odeur urineuse dans ces mélanges, à moins qu'on y ait mis trop peu de solution de sublimé, car pour-lors cette odeur se fait sentir en remuant très fort & un peu longtems le mélange; mais on la fait cesser dans l'instant, en y ajoutant un peu de solution de sublimé, pour les raisons que j'ai dites ci-devant.

8°. On produit les mêmes changemens, si au-lieu d'huile de tartre, on emploie l'eau de chaux; elle y a de même excité une odeur urineuse, & toute la différence qu'il y a, c'est que

* Cette expérience est équivoque par rapport à la blancheur qui y arrive, & si ce n'étoit l'odeur urineuse que l'on y apperçoit, cela ne pourroit prouver que l'impregnation contient du sel armoniac, puisqu'on produit la même blancheur avec la dissolution de sel marin.

que le mélange ne devient pas épais, comme il devient avec l'huile de tartre, & que lorsque l'on mêle d'abord l'eau de chaux avec la solution de sublimé, & qu'on y ajoute après cela l'impregnation, le mélange ne devient pas blanc avec autant de facilité, il faut plus de tems & plus de mouvement qu'avec l'huile de tartre *.

9°. L'impregnation de plâtras a produit le même coagulum avec l'esprit d'urine, qu'elle a produit avec l'huile de tartre par défaillance; mais elle n'a fait aucun coagulum avec l'esprit de sel armoniac fait par la chaux, ce qui n'est arrivé que parce que l'esprit d'urine étoit très chargé de sel volatil, & que l'esprit de sel armoniac en contenoit peu. On s' imagine pour l'ordinaire que l'esprit volatil de sel armo-

* L'eau de chaux que j'ai employée dans ces expériences, a été faite avec une livre de chaux & quatre livres d'eau, & pesoit plus que l'eau, sa pesanteur spécifique étoit à celle de l'eau comme 56 à 57.

La solution de sublimé corrosif contient une partie de sublimé sur 15 parties d'eau, qui n'en a pas pu tenir davantage en dissolution à froid. J'ai eu des sublimés dont la dissolution étoit transparente, chaude ou froide; *tel étoit celui du Frere Simon, Chartreux*. J'en ai eu d'autres dont la dissolution étoit très transparente pendant qu'elle étoit chaude, & qui peu à peu devenoit blanche-opaque en refroidissant; *tel étoit celui de M. Boulduc*.

J'observerai encore, que j'ai eu des sublimés dont une partie s'est tenue en dissolution à froid dans 12 parties d'eau, d'autres dans 14, d'autres dans 16 parties, plus ou moins: ces dissolutions étant faites dans la même température d'air, les cristaux de sublimé sont fort differens; il y en a de grêles & longs depuis 2, 3, 4 lignes, jusqu'à 2 pouces; il y en a d'autres plus courts qui se forment en éventail, & cela arrive suivant le plus ou le moins de sublimé qui se cristallise,

armoniac ou d'urine, & le plus vif à l'odorat & le plus pénétrant, est plus chargé de parties salines; ce qui ne se trouve pas vrai, car l'esprit volatil de sel armoniac, ou l'esprit d'urine par la chaux, est plus pénétrant que l'esprit de sel armoniac par le sel fixe de tartre, qui est plus chargé de parties salines, & que l'esprit d'urine fait sans aucun mélange.

10°. Si on trempe dans l'impregnation, du linge ou du papier, que l'on les laisse sécher, ce linge ou ce papier allumé fuse comme s'il avoit été trempé dans la dissolution de salpêtre.

Il paroît par la 2^{de}. 3^{me}. 4^{me}. 5^{me}. 6^{me}. 7^{me}. & 10^{me}. expérience, que l'impregnation de plâtras contient un sel armoniac salin & nitreux. Car si l'on substitue la dissolution de sel armoniac salin; & qu'on y ajoute de l'esprit de nitre empreint de sels volatils urineux à la place de l'impregnation, elle produit dans toutes ces expériences les mêmes changemens, & toute la difference que j'y ai trouvée, c'est que la dissolution de sel armoniac blanchit plus vivement & plus promptement avec la dissolution de sublimé, & elle ne se coagule pas avec l'huile de tartre par défaillance, ni avec l'huile de vitriol, ni avec l'esprit d'urine, comme fait l'impregnation de plâtras, parce que cette solution n'est pas si chargée de sel & de bitume que l'impregnation de plâtras.

Pitton de Tournefort * a fait quelques-unes de

* Célèbre par le nouveau système qu'il a donné sur la Botanique, & qui a été de cette Académie.

de ces expériences, par lesquelles il a reconnu que l'infusion de plâtras contient du sel armoniac *, (son infusion étoit très foible, eu égard à celle que j'ai employée :) mais je ne crois pas qu'il ait eu raison de dire que cette infusion ou impregnation contient un sel alkali fixe, parce que l'infusion de noix de galles fait un coagulum avec cette impregnation, & qu'elle en fait un avec l'huile de tartre par défaillance. Il n'a pas fait attention que l'infusion de noix de galles se trouble avec la solution de sel commun.

On devroit dire par la même raison, que l'impregnation contient de l'alun, puisque l'huile de tartre par défaillance se coagule avec la dissolution d'alun, & que l'impregnation se coagule avec l'un & avec l'autre.

L'impregnation se coagule avec la dissolution de vitriol verd, de vitriol bleu & de vitriol blanc, comme elle fait avec l'huile de tartre par défaillance ; dira-t-on pour cela que cette impregnation contient des especes de vitriol ? ce qui est d'ailleurs une preuve assez certaine que ces sortes de coagulations se produisent par la quantité de sels qui se trouvent dans les dissolutions.

Il dit que l'on sépare du sel marin de l'impregnation ou infusion de plâtras, & que l'on y reconnoit le salpêtre par la détonation.

Je n'y ai trouvé ni salpêtre ni sel marin, par aucun procédé ; il n'est pas possible d'en retirer des plâtras, à moins d'y ajouter un sel

* Dans la Préface de son Histoire des Plantes des environs de Paris.

sel fixe; l'on voit seulement que le linge ou le papier trempés dans l'impregnation & séchés, ont fusé vivement sur les charbons ardens, mais ce n'est point du salpêtre, c'est du sel armoniac nitreux; on produit la même chose avec le mélange d'esprit de nitre & d'esprit volatil d'urine fermentés ensemble: si l'on fait bruler du linge ou du papier trempés dans cette liqueur, il se fait une déflagration très vive.

Si l'on fait évaporer jusqu'à pellicule le mélange d'esprit de nitre & de sel volatil d'urine, on en retire des crystaux en longues aiguilles qui se terminent en pointe; ils sont quelquefois formés par des pieces articulées, principalement dans les dernieres crySTALLIFICATIONS; mais ces crystaux ne sont pas hexagones: on ne peut les avoir bien secs, ils se fondent facilement à l'air, & encore plus facilement à la chaleur; ils fusent très vivement sur les charbons ardens. J'en ai mis sur une pêle que j'ai exposée au feu, les crystaux se sont fondus, puis ils se sont enflammés avec détonation; ils ne fulminent quelquefois pas sur la pêle, mais très vivement sur les charbons ardens.

Il résulte des expériences que je viens de rapporter, qu'il y a dans les plâtras un esprit de nitre & un esprit de sel, qui avec des sels volatils urineux forment un sel armoniac nitreux, & un sel armoniac salin; & c'est ce que nous allons encore prouver par la distillation de l'impregnation de plâtras.

Je me suis porté d'autant plus volontiers à ce travail, que je m'étois apperçu que cette
impre-

l'impregnation contient un bitume qui se fait sentir en faisant évaporer cette liqueur. Outre cela, j'avois lieu de croire qu'elle contenoit quelque autre matiere avec le sel armoniac, & que je pourrois découvrir par la distillation.

J'ai d'abord voulu voir quelle liqueur je retirerois en faisant distiller l'impregnation dans une cucurbite des plus hautes à un feu très lent; mais il n'a distillé que du flegme qui sentoit le bitume, & après bien des essais, j'ai reconu que plus je retirois de flegme, plus il avoit l'odeur de bitume, ce qui me faisoit présumer que ce bitume étoit aussi volatil que l'eau, ou bien si adhérent à l'eau, qu'il ne pouvoit s'en séparer; & il m'a paru égal de distiller cette impregnation dans une cucurbite, ou dans une cornue.

J'ai donc rempli une grande cornue de verre d'impregnation qui n'étoit point évaporée, je l'ai mise dans le sable, j'y ai joint un récipient sans le lutter, j'ai fait un feu lent, il a distillé une liqueur claire transparente, ayant l'odeur de bitume & d'un goût très desagréable. La liqueur qui a distillé le second jour avoit une odeur de bitume plus forte, ce qui m'a obligé de lutter le récipient le troisieme jour. J'ai continué de la distiller pendant deux jours; il distilloit peu de chose la nuit, car j'y mettois seulement du charbon en me couchant; & enfin le quatrieme jour je me suis apperçu qu'il ne distilloit plus rien. Je voyois pourtant la matiere bouillir dans la cornue, comme une bouillie très épaisse. J'ai cessé le feu; la cornue étant refroidie, je l'ai retirée du sable, & j'ai vu au fond de cette

cornue une matiere qui paroissoit dure & jaunâtre. Je l'ai remise dans le sable, j'y ai luté le même récipient vuide de la liqueur qu'il contenoit. Elle sentoit très fort le bitume *, elle n'a fait aucun changement avec le vinaigre ni l'esprit de vinaigre, elle avoit la même pesanteur que l'eau commune.

J'ai mis le feu au fourneau, je l'ai poussé par degrés le plus fort que j'ai pu; les vapeurs se sont élevées fort rouges dans la cornue & dans le récipient, dans lequel elles ont eu de la peine à passer. Il a distillé peu de liqueur, les vapeurs ont subsisté toute la journée dans la cornue & dans le récipient, de maniere que je n'y découvrois ni sel ni liqueur. Ces vaisseaux se sont éclaircis le soir; j'ai remarqué que le récipient s'est éclairci le premier, & que les vapeurs ont subsisté encore quelque tems dans la cornue. J'y ai vu un sel blanc, dont une partie s'étoit rangée & comme sublimée sur les côtés de la cornue. Le tout étant refroidi le lendemain, j'ai retiré le récipient, dans lequel il y avoit seulement cinq gros de liqueur, qui, à toute épreuve, s'est trouvée de l'eau régale †. J'ai mis de l'eau chaude dans la cornue pour dissoudre le

* Il m'est arrivé dans cette occasion, ce qui est arrivé à ceux qui ont voulu adoucir l'eau de la mer, & la rendre potable, en la faisant distiller: mais ils n'ont pu empêcher le bitume que l'eau de la mer contient, de s'élever avec l'eau, & c'est ce bitume qui la rend d'un très mauvais goût: ce qui me fait soupçonner que le bitume qui est dans notre impregnation, est semblable à celui de l'eau de la mer.

† M. Lémery en a aussi tiré de l'eau régale. *V. Mém.* 1717. p. 63.

le sel blanc; la dissolution étoit toute blanche comme du lait; il s'est précipité une terre blanche au fond de la liqueur, qui est restée transparente. Je les ai séparés l'un de l'autre, j'ai bien lavé la terre, & après l'avoir séchée, elle ne m'a paru être que du plâtras *.

La dissolution de ce sel étoit transparente & sans couleur, âcre & amère, avec une odeur aromatique. Si l'on frotte cette liqueur entre les doigts, on lui trouve une onctuosité semblable à celle de l'huile d'olive ou de l'huile de tartre par défaillance; elle est très pesante, sa pesanteur spécifique est à l'eau comme 11 à 6.

J'ai répété cette distillation deux fois, mais je n'en ai retiré que de l'esprit de nitre à toute épreuve, au lieu d'eau régale. J'en donnerai la raison, lorsque je parlerai ci-après de la distillation des plâtras dont je n'ai tiré que de l'esprit de nitre. Au reste, j'ai retiré dans les deux dernières distillations de l'impregnation de plâtras, le même sel blanc, âcre & amer. Je me suis imaginé que l'odeur aromatique qu'il avoit, ne lui venoit que d'un peu d'esprit de nitre ou d'eau régale mêlée avec du bitume qui n'est que la vapeur rouge que l'on voyoit dans la cornue, & qui n'ayant pu être poussée dans le récipient, est retombée sur le sel qui étoit dans la cornue; & voici des observations qui peuvent rendre cette idée vraisemblable.

1°. Ayant exposé cette liqueur à l'air, elle a perdu peu à peu son odeur aromatique au bout de trois jours.

A a 6

2°. Si

* C'est ce qui produit la magnésie dans l'eau-merc.

2°. Si l'on mouille du papier bleu avec cette liqueur avant qu'elle ait perdu son odeur, elle rougit ce papier, mais elle ne le rougit plus lorsqu'elle a perdu son odeur.

3°. J'ai fait rougir un creuset entre les charbons ardens, j'y ai jetté peu à peu six onces d'impregnation de plâtras évaporée autant qu'il a été possible; je l'ai calciné à blancheur, j'ai dissout, filtré & évaporé cette dissolution; elle n'avoit aucune odeur aromatique, parce qu'étant calcinée à l'air, le bitume a enlevé avec lui toute l'eau forte qu'il a pu enlever, & dont les acides ne sont point bien unis avec les sels alkalis volatils; ainsi cette liqueur ne rougit point le papier bleu, & ne diffère point de celle que j'ai retirée après la distillation de la même impregnation, & qui, exposée à l'air, a perdu son odeur aromatique *. L'une & l'autre de ces deux liqueurs ont produit les mêmes effets que l'impregnation de plâtras avec les esprits de nitre & de sel, qu'elles ont rendu capables de dissoudre l'or. Elles ont fait le même coagulum avec l'huile de vitriol, & la même fermentation. La chose a été un peu différente

te
* J'ai retiré du flegme de l'impregnation de plâtras, qui rougissoit bien le papier bleu, & qui avoit l'odeur de bitume. J'en ai mis pendant quinze jours à l'air dans un gobelet, il a perdu cette odeur; il rougit encore le papier bleu, mais pas si bien. J'en ai, qui depuis deux ans étoit dans une fiole qui n'étoit pas exactement bouchée, qui rougit bien le papier bleu; mais il faut prendre garde que c'est de l'esprit de nitre qui est dans le flegme, & qui est séparé des autres matières; au lieu que dans la dissolution de ce sel il n'y a plus d'esprit de nitre séparé, & que ce qu'il y en a s'évapore.

e avec l'huile de tartre par défaillance, & avec l'esprit volatil d'urine; car quoiqu'il se fasse le même coagulum, il arrive pourtant une fermentation après le coagulum formé par le mélange de cette huile & de la dissolution de sel de plâtras, qui n'arrive pas avec le mélange de cette huile & de l'impregnation de plâtras. L'esprit d'urine produit le même effet que l'huile de tartre avec ces liqueurs; le coagulum qui est très blanc se dissout par la fermentation, & le mélange devient liquide comme de la crème de lait; & enfin il se fait un précipité blanc: cette fermentation n'arrive pour-lors, que parce que les acides nitreux & salins sont plus à découvert dans ce sel, que dans l'impregnation qui contient du bitume.

Cette dissolution de sel de plâtras a la même pesanteur que l'impregnation de plâtras. Nous examinerons la cause de cette pesanteur en parlant de l'eau-mere. J'oubliois de dire que la dissolution du sel de plâtras, mêlée avec la dissolution de sublimé corrosif, ne fait aucun changement; si l'on y ajoute de l'huile de tartre, le mélange devient orangé; mais à force de le remuer il devient blanc, puis il se fait un précipité blanc.

Voilà donc encore une fois les sels armoniacs nitreux & salins bien démontrés dans notre impregnation de plâtras; & en conséquence, j'ai voulu voir si le sel de plâtras pourroit se sublimer comme le sel armoniac; j'en ai rempli la moitié d'une fiole; je l'ai mis dans le sable, & j'ai poussé le feu par degrés autant qu'il m'a été possible; le sel s'est fon-

du, & s'est affaïssé en se séchant; il s'y est formé plusieurs trous, d'où sortoient des vapeurs qui avoient l'odeur d'eau forte, mais il ne s'est fait aucune sublimation.

Après les expériences que je viens de rapporter sur l'impregnation de plâtras, j'ai voulu voir si je ne retirerois point de l'eau régale de la distillation de pareils plâtras. J'en ai mis 14 livres dans une grande cornue de grès, que l'on a placée dans un fourneau de reverbere; on y a adapté un balon, on a mis le feu au fourneau à 8 heures du matin, que l'on a augmenté par degrés jusqu'à 11 heures, c'est-à-dire, pendant 3 heures: il y avoit déjà beaucoup de liqueur distillée, mais qui n'avoit produit aucune vapeur apparente. On a ensuite poussé le feu le plus fort qu'on a pu, ce qui a donné des vapeurs rouges jusqu'à 4 heures après midi qu'elles ont cessé, & l'on n'a plus continué le feu; on n'a retiré les vaisseaux que le lendemain; la cornue s'est trouvée fêlée, ce qui a causé la perte de quantité de vapeurs, comme nous l'allons voir.

Je cassai tout-à-fait la cornue pour en retirer les plâtras, il y en avoit 9 livres 8 onces, & il n'y avoit que 2 livres 14 onces de liqueur dans le balon, ce qui fait en tout 12 livres 6 onces; il y a donc eu 26 onces de perte, soit esprit, soit flegme.

Cette liqueur distillée avoit l'odeur d'eau forte, mais foible; elle étoit à l'eau, pour la pesanteur, comme 61 à 60, ce qui m'a obligé de la déflegmer, & pour cela je l'ai fait distiller dans une cucurbite: j'en ai tiré

24 onces 4 gros de liqueur qui n'avoit pas plus de pesanteur que de l'eau commune, & qui avoit une très légère odeur d'esprit de nitre; elle n'a fait aucun changement au papier bleu, elle n'a causé aucun mouvement avec l'huile de tartre par défaillance : il est resté dans la cucurbite 21 onces 3 gros de liqueur qui sentoient bien l'esprit de nitre, & qui a fermenté foiblement avec l'huile de tartre, elle a rougi le papier bleu, elle étoit à l'eau comme 23 à 20, elle n'a dissout ni l'or, ni l'argent, ni le cuivre. Je l'ai déflegmée encore une fois; j'en ai retiré 16 onces 2 gros ou environ, de flegme semblable au précédent, mais qui avoit pourtant l'odeur d'esprit de nitre un peu plus forte; il est resté 5 onces de liqueur dans la cucurbite, dont la pesanteur spécifique étoit à l'eau comme 3 à 4, & qui, à toute épreuve, étoit de bon esprit de nitre *, il a bien dissout l'argent, mais il n'a point touché à l'or; j'ai mis quelques gouttes d'esprit de sel dans un gros de cet esprit, il a très bien dissout l'or.

J'ai lessivé les plâtras restés dans la cornue avec de l'eau bouillante, je l'ai filtrée; cette liqueur s'est coagulée avec l'huile de tartre par défaillance, en beurre assez ferme; elle n'a donné qu'une très légère odeur d'esprit urinaireux.

Elle s'est troublée très fort avec l'esprit d'urine, mais elle n'a pas pris la consistance de beurre.

Mélée.

*. M. Boulduc a tiré de l'esprit de nitre des plâtras. *V. l'Hist. de l'Acad. de M. Dabamel, année 1696, pag. 416. & 417.*

Mélée avec l'esprit de nitre, elle a dissout l'or bien plus promptement que l'impregnation de plâtras mêlée avec de pareil esprit.

Elle n'a point blanchi le mélange d'huile de tartre & de sublimé, non plus que le mélange d'eau de chaux & de sublimé.

Enfin, j'ai fait évaporer jusqu'à pellicule, ce qui me restoit de cette liqueur. Deux jours après, j'ai trouvé au fond de la liqueur une matiere qui n'avoit aucune figure déterminée, elle ressembloit à du sel de chaux, sans aucun goût, quoique la liqueur qui surnageoit fût d'un goût très amer, salé, un peu âcre, & de couleur jaune; sa pesanteur spécifique étoit à l'eau comme 7 à 6; la matiere terreuse n'a pu se dissoudre dans l'esprit de nitre, & le sel de chaux s'y est dissout avec fermentation.

J'ai encore fait évaporer ma liqueur jusqu'à pellicule; deux jours après, j'ai trouvé au fond de cette liqueur, de vrai sel marin, bien figuré, mais très petit, salé, & en petite quantité, par rapport à d'autre sel qui y étoit en bien plus grande quantité, & qui n'étoit point figuré; ce dernier sel n'étoit point si salé: j'ai d'abord cru que c'étoit du salpêtre, mais outre qu'il n'en avoit pas la figure, c'est qu'il n'a point fusé sur les charbons.

Il s'agit de savoir pourquoi je n'ai retiré que de l'esprit de nitre des plâtras, & de quelque distillation d'impregnation de plâtras; & pourquoi le sel marin que je n'ai retiré par aucun procédé de l'impregnation de plâtras, qu'en y ajoutant un sel fixe; comment, dis-je,

ce sel marin se trouve tout formé dans l'essive des plâtras distillée.

1^o. Il faut observer qu'il y a moins d'esprit de sel dans les plâtras que d'esprit de nitre, tous les plâtras n'ont pas la même quantité d'esprit de sel & d'esprit de nitre *.

J'ai fait voir dans un Mémoire†, que dans une cuite qui contenoit 350 livres de salpêtre, il se trouvoit environ 150 livres de sel marin; preuve qu'il y a beaucoup plus d'esprit de nitre dans les plâtras que d'esprit de sel.

2^o. Que les esprits acides ne peuvent se retirer par la distillation des matieres avec lesquelles ils sont combinés, que par le moyen des matieres sulphureuses & bitumineuses que l'on y mêle; on le voit dans la distillation de l'esprit de nitre & de l'esprit de sel: ou bien lorsqu'elles y sont naturellement mêlées; & c'est ce que l'on voit dans la distillation du vitriol, & dans celle des plâtras & de l'impregnation de plâtras.

3^o. Qu'il n'y a qu'une certaine petite quantité de matiere bitumineuse dans les plâtras & dans leur impregnation, qui étant consommée par la distillation d'une certaine quantité d'esprit, il ne peut plus s'élever d'esprit, quelque feu que l'on fasse. On sait que l'esprit de nitre a plus de facilité à s'élever que l'esprit de sel; il y a apparence que la matiere bitumineuse s'unit plus facilement à l'esprit

* Nous verrons dans un autre Mémoire, une Analyse qui m'a donné plus de sel marin que de salpêtre.

† *V. Mém. de l'Acad. 1729. p. 319. & suiv.*

prit de nitre qu'à l'esprit de sel, & qu'elle s'éleve avec cet esprit; ainsi s'il n'y a qu'une suffisante quantité de bitume capable d'enlever l'esprit de nitre qui s'y trouve, il ne s'élèvera point d'esprit de sel, quelque feu que l'on fasse. Voilà pourquoi nous n'avons eu que de l'esprit de nitre dans la distillation des plâtras, & de son impregnation, & c'est ce que nous verrons dans la distillation d'eau-mere & dans sa calcination. Il n'y a pas même toujours assez de matiere bitumineuse pour enlever tout l'esprit de nitre, mais il s'en trouve aussi quelquefois plus qu'il n'en faut pour la quantité d'esprit de nitre, & pour lors il s'éleve une portion d'esprit de sel, & produit de l'eau régale; mais s'il ne s'en trouve pas pour enlever de l'esprit de sel, cet esprit agité par un feu violent se détache en partie des esprits urinaires, & comme il manque de véhicule pour l'enlever, il se mêle avec la terre du plâtre, il s'y unit, & forme un sel concret, & pour dire en un mot, un vrai sel marin; ainsi il peut se faire que le sel marin que j'ai retiré de la lessive des plâtras distillés, ne se soit formé que pendant la distillation. On ne manquera pas de me dire, que si l'on fait distiller des esprits acides, ils s'élèvent, sans que pour cela on ait besoin d'une matiere sulphureuse pour les aider: cela est vrai; mais si ces esprits sont adhérens à des sels fixes, à de la terre, à des sels volatils, ils ne s'élèveront point qu'il n'y ait quelque matiere capable de les détacher de ces sels, & c'est ce que produisent les matieres sulphureuses.

Les vapeurs d'eau forte qui se sont élevés lorsque j'ai mêlé de l'huile de vitriol avec l'impregnation de plâtras, m'ont donné lieu d'espérer que je tirerois de l'eau régale par la distillation de ce mélange, puisque l'on retire de l'esprit de sel du sel marin, en le mêlant avec l'huile de vitriol.

J'ai mis dans une cucurbite de verre 10 onces d'impregnation de plâtras, évaporée autant qu'il a été possible; j'ai ajouté à cette cucurbite, qui pèse 11 onc. 6 gros 36 grains, un chapiteau tubulé, auquel j'ai adapté un matras pour récipient; le tout accommodé sur un bain de sable, j'ai fait un petit feu pour liquéfier l'impregnation, puis j'ai versé environ un gros d'huile de vitriol, ce qui a fait fermenter la matière; puis j'en ai ajouté peu à peu autant, à mesure que je voyois la fermentation cesser, jusqu'à 24 gros 36 grains, & à chaque fois je bouchois l'entrée du tuyau avec un bon bouchon de liège: mais peu à peu la matière s'est gonflée de manière qu'elle a entièrement rempli la cucurbite. J'ai été obligé de retirer le peu de feu qu'il y avoit dans le fourneau, sans quoi la matière auroit passé dans le récipient: il s'est élevé des vapeurs rouges qui ont rempli le chapiteau & le récipient, il a distillé une liqueur, les vapeurs rouges se sont presque dissipées, la matière s'est affaïlée dans la cucurbite. J'ai remis du feu dans le fourneau, je l'ai augmenté assez fort, les vapeurs rouges ont reparu, je l'ai continué jusqu'au soir; lorsque je me suis aperçu qu'il ne distilloit plus rien, j'ai cessé le feu, les vaisseaux sont devenus froids, les

va-

vapeurs rouges subsistoient dans la cucurbite, le chapiteau & le récipient, il y en avoit encore le lendemain matin; j'ai retiré le récipient, il contenoit 4 onc. 4 gros de liqueur qui, à toute épreuve, s'est trouvée de l'eau régale, elle dissolvoit une feuille d'or en un quart d'heure, elle réduisoit une feuille d'argent en un sédiment noirâtre.

J'ai déluté le chapiteau, j'ai trouvé encore des vapeurs rouges dans la cucurbite, qui pèse avec la matiere blanche qui est dedans, 7 onc. 2 gros; j'ai versé de l'eau sur cette matiere, elle s'est dissoute en une liqueur blanche comme du lait; je l'ai filtrée, la liqueur a passé claire & transparente, il est resté dans le filtre 3 onces 1 gros de terre blanche; j'ai fait évaporer la liqueur filtrée, je n'ai pu la dessécher, mais en la laissant refroidir, elle s'est réduite en une matiere gommeuse & dure, il y en avoit 33 gros, elle se liquéfioit à l'air & à la chaleur, de même que l'impregnation de plâtras évaporée; peut-être que si j'y eusse mis une plus grande quantité d'huile de vitriol, j'en aurois retiré davantage d'eau régale.

J'ai donc recommencé cette opération dans le même vaisseau, avec des circonstances un peu différentes: j'ai d'abord mis dans la cucurbite 5 onces d'impregnation de plâtras*, & 4 onc. d'huile de vitriol peu à peu & alternativement par le tube du chapiteau; la matiere a fermenté, il s'est élevé des vapeurs

rou-

* Elle pèse avec l'Aréometre 29 onc. 66 grains, elle est à l'eau comme 49 à 30, c'est à-peu-près comme 5 à 1.

rouges, mais qui n'ont point passé dans le récipient; je l'ai laissé ainsi jusqu'au lendemain, sans faire de feu, & je n'ai rien trouvé dans le récipient: j'y ai ajouté 5 onc. d'impregnation, & j'ai mis le feu au fourneau à 7^h du matin, je l'ai augmenté par degrés, j'ai encore mis 2 onc. d'huile de vitriol; les vapeurs se font d'abord élevées, & ont passé dans le récipient; la matiere ne s'est presque point raréfiée, comme il est arrivé à l'opération précédente. Enfin lorsque je voyois les vapeurs diminuer, j'y ajoutois de l'impregnation, de sorte que j'ai employé dans cette opération 14 onc. 5 gros d'impregnation, & 6 onces d'huile de vitriol; j'ai continué le grand feu jusqu'à 8^h du soir, parce que je voyois toujours des vapeurs rouges dans la cucurbite & dans son chapiteau; j'ai trouvé le lendemain 10 onc. 6 gros d'eau régale dans le récipient, elle dissolvoit une feuille d'or dans une demi-minute, elle étoit à l'eau comme 6 $\frac{1}{2}$ à 5, ou comme 13 à 10.

Il est resté 8 onces 3 gros de matiere blanche dans la cucurbite, il s'est donc perdu 12 gros de parties spiritueuses qui se sont dissipées; j'ai dissout cette matiere, je l'ai filtrée, il est resté dans le filtre de la terre blanche qui, étant bien séchée, pesoit 5 onc. 2 gros, il y avoit donc 3 onc. 1 gros de sel qui s'est dissout dans l'eau: cette dissolution est aigrette, elle est à l'eau comme 10 $\frac{1}{2}$ à 9 $\frac{1}{2}$, ou comme 21 à 19; elle rougit le papier bleu, elle n'a point fermenté, ni fait aucun changement avec l'huile de tartre par défaillance, elle n'a point dissout l'or; étant évaporée jusqu'à

qu'à pellicule, elle n'a point donné de cristaux bien formés, mais une matiere saline informe.

Voici de l'eau régale que j'ai retirée du sel de plâtras: j'ai pris 14 onces de forte dissolution de sel de plâtras, restée après la distillation d'imprégnation de plâtras, dont j'avois tiré de l'esprit de nitre, comme je l'ai dit ci-dessus; j'ai mis cette dissolution dans une cornue posée au bain de sable, & y ayant mis un récipient sans le luter, je l'ai fait distiller jusqu'à ce que j'aye apperçu la matiere en consistance de syrop épais & bien cuit; j'ai cessé le feu, il y avoit dans le récipient 4. onc. 2 gros de flegme limpide & sans couleur, il avoit l'odeur de bitume tirant sur celle d'eau-forte, & qui a bien rougi le papier bleu; elle n'a produit aucun mouvement de fermentation avec l'huile de tartre; sa pesanteur spécifique étoit à l'eau comme 217 à 216, elle n'avoit point de saveur *.

Lorsque la cornue a été refroidie, j'y ai versé 5 onces d'huile de vitriol qui, en la remuant, s'est coagulée avec le sel de plâtras, & a commencé à jetter des vapeurs rouges; je l'ai mis promptement dans le sable, j'y ai adapté un grand matras pour récipient, je l'ai luté tout d'abord, les vapeurs rouges ont rempli la cornue & le récipient; quoiqu'il n'y eût point de feu, la cornue s'est échauffée fort bien par le mélange; je l'ai laissée en cet état

* J'ai mis 1 grain d'eau régale que j'ai retiré dans 15 gros d'eau; ce mélange a rougi aussi vivement le papier bleu que le flegme dont je parle; je n'y ai apperçu aucune saveur.

tat pendant deux heures : comme j'ai vu qu'il ne se formoit aucune liqueur dans le récipient, j'ai mis le feu au fourneau, que j'ai augmenté peu à peu ; demi-heure après il s'est formé des gouttes qui ont distillé, ce qui a continué pendant trois heures & demie, après quoi les vaisseaux se sont éclaircis, principalement la cornue ; j'ai augmenté le feu, mais malgré cela, il n'a plus rien distillé ; le lendemain matin, j'ai retiré mes vaisseaux, il y avoit encore des vapeurs rouges, je n'ai trouvé que 5 onces de liqueur dans mon récipient ; elle a dissout l'or dans l'instant : cette eau régale est à l'eau comme 4 à 3, elle est couleur de gris-de-lin jaune ; toutes mes autres eaux régales sont verdâtres, tirant sur le jaune *.

Il est resté dans la cornue 9 onces 2 gros de matiere blanche & dure, sur laquelle j'ai jetté 6 ou 7 onces d'eau presque bouillante, pour faire dissoudre le sel, je l'ai filtrée ; & comme cette dissolution me paroissoit très pesante, car elle étoit à l'eau comme $4\frac{2}{3}$ à 3, je l'ai conservée à part ; j'ai continué de verser de l'eau presque bouillante sur le reste de la

* Lorsque l'on distille l'impregnation de plâtras avec l'huile de vitriol, l'inconvénient qu'il y a à craindre, est la grande raréfaction de la matiere, contre laquelle on doit être en garde, parce qu'elle passeroit dans le récipient. Nous y avons remédié dans la seconde distillation de cette impregnation ; nous n'avons point à craindre de gonflement ou raréfaction avec le sel de plâtras dans cette dernière opération, mais il faut prendre garde que la quantité des vapeurs qui ne se résolvent que difficilement en liqueur, ne cassent les vaisseaux, c'est pourquoi il faut bien ménager le feu.

la matiere, que j'ai eu de la peine à dissoudre, car il a fallu beaucoup d'eau, & la réchauffer bien des fois; je l'ai filtrée, il est resté une terre blanche que j'ai fait sécher sur le feu dans un creuset, il s'en est trouvé 5 onces, il y avoit 4 onces 2 gros de sel dissout dans l'eau, qui font 9 onces 2 gros, qui joint à 4 onces 2 gros de flegme, & 5 onces d'eau régale que j'ai retiré, font 18 onces 4 gros; il s'est donc perdu 4 gros de matiere volatile qui ne peut être que de l'eau régale, ou de l'esprit de vitriol.

Cette dissolution s'est échauffée avec l'huile de vitriol, mais rien de plus.

Elle n'a produit ni mouvement ni changement avec l'esprit de sel armoniac.

Elle a dissout une feuille d'or en 10 minutes.

Si l'on mêle cette liqueur avec la solution de sublimé, il n'arrive aucun changement; si l'on y ajoute l'huile de tartre, il se fait une fermentation vive, mais le mélange ne jaunit point, il se trouble en blanc.

Si l'on mêle l'huile de tartre par défaillance avec partie égale de dissolution de sublimé, l'on fait que le mélange devient couleur de safran; mais si on y ajoute peu à peu partie égale de notre dissolution, le précipité se dissout, le mélange devient clair & transparent pendant la fermentation, puis il se fait un précipité blanc.

J'ai fait évaporer la dissolution du sel, à laquelle il a fallu ajouter beaucoup d'eau pour la dissoudre, je l'ai filtrée, je l'ai fait évaporer jusqu'à pellicule, il s'est formé des cristaux

taux longs d'une ligne jusqu'à une ligne & demie, fins comme des cheveux; ils étoient les uns sur les autres, sans aucun ordre, très blancs, n'ayant presque pas de saveur; ce sel n'a ni fusé, ni petillé, ni bouilli sur les charbons ardens; j'ai fait dissoudre ce sel, la dissolution a rougi vivement le papier bleu. J'ai fait évaporer une seconde fois ce qui restoit de dissolution, elle a formé une espèce de gâteau de sel très blanc, sans aucune figure déterminée.

Voilà notre Analyse bien avancée, je puis même dire qu'elle est entièrement faite. Par la décomposition de toutes les parties des plâtras, j'en ai tiré du flegme, du bitume, de l'esprit de nitre, de l'eau régale, & de la terre plâtreuse.

Le bitume se découvre par son odeur, & par sa couleur jaune gris-de lin qu'il communique à toute la matière: il s'élève avec le flegme, par un petit feu, & avec les esprits acides, mais il faut pour ces derniers un feu plus violent. Il semble par-là qu'il y ait dans ce bitume une partie plus volatile que l'autre; mais à dire le vrai, ils sont tous deux très volatils, puisque si l'on expose le flegme & les esprits à l'air, le bitume s'échappe, il ne laisse pas même de se dissiper avec le tems dans des bouteilles bien bouchées.

J'ai tâché de le séparer par l'esprit de vin, en réduisant l'impregnation de plâtras en une consistance de beurre; mais il entraîne des sels avec lui, qui se dissolvent dans l'esprit de vin, en sorte que je n'ai pu le séparer seul.

Mém. 1734.

B 6

Nous

Nous avons fait voir par nos expériences, qu'il y a des sels volatils urineux unis avec l'esprit de sel & l'esprit de nitre, & qui se sont manifestés par leur odeur urineuse, & par la blancheur qu'ils ont produit dans le mélange de l'impregnation de plâtras, du sublimé corrosif, & de l'huile de tartre par défaillance: il est vrai que la blancheur ne paroît pas si promptement, & n'est pas si vive, que lorsqu'on se sert de dissolution de sel armoniac à la place de l'impregnation; mais il semble que cela n'arrive que parce que les sels volatils sont un peu embarrassés par le bitume, & ce qui le prouve bien, c'est que la dissolution du sel de plâtras, débarrassée de ce bitume (car il y en reste très peu) blanchit bien plus promptement que l'impregnation de plâtras avec la solution de sublimé, & l'huile de tartre.

J'ai tenté de retirer les sels volatils de cette impregnation de plâtras, j'en ai pour cela mis 19 onces dans une cucurbite de verre qui contenoit 2 pintes $\frac{1}{2}$ d'eau, je l'ai fait distiller au bain de sable, j'en ai tiré 9 onces de flegme couleur de tisanne, il n'avoit point d'odeur; lorsqu'on pousse la distillation un peu fort, le flegme qui distille prend une odeur d'empyreume. Il est donc resté 10 onc. d'impregnation qui, étant refroidie, étoit ferme: j'y ai ajouté 10 onc. de dissolution de sel fixe de tartre, j'ai remis ma cucurbite au bain de sable, & après avoir adapté un récipient, j'ai fait un fort petit feu; il n'a rien distillé pendant une heure, après cela la matiere s'est raréfiée, de maniere qu'il a fallu ôter entièrement

ment le feu ; elle s'est élevée jusqu'au dessus de la cucurbite, mais elle ne s'est point répandue dehors, à cause de sa viscosité ; la matiere a ensuite baissé peu à peu, & s'est tout-à-fait affaïssée ; j'ai remis du feu, elle s'est encore raréfiée, mais pas tant ; elle s'est encore affaïssée tout-à-fait, j'ai poussé le feu pendant 4 heures, après quoi j'ai cessé le feu, voyant qu'il ne distilloit plus rien. Le lendemain, j'ai trouvé dans le récipient 5 onc. 5 gros de liqueur limpide, couleur d'ambre, qui étoit à l'eau comme 181 à 180, elle sentoit fort l'empyreume, elle n'avoit aucun goût, & laissoit seulement une très légère acreté sur la langue.

Elle fait sur le papier bleu à-peu-près le même rouge blafard, tel que le fait la dissolution de sel armoniac.

Elle a blanchi le mélange d'huile de tartre & de sublimé corrosif, de la même maniere que le fait l'impregnation de plâtras.

La matiere qui est restée dans la cucurbite étoit blanche, compacte, dure & seche, qui étant lessivée & évaporée, a donné de beaux crystaux de nitre, & du sel commun, l'un & l'autre très blanc.

Je n'ai retiré aucun esprit volatil urineux, j'ai voulu voir si je pourrois en retirer avec la chaux.

J'ai mis une livre d'impregnation de plâtras dans une grande cucurbite, posée sur un bain de sable, j'y ai mis un chapiteau & un récipient, sans les luter, j'ai fait distiller cette matiere, j'en ai tiré 6 onces de liqueur ; cette liqueur n'avoit aucune saveur ; la dernière

once qui a distillé, a rougi le papier bleu, comme la dissolution de sel armoniac, ce que les autres n'ont pas fait: ce qui étoit dans la cucurbite avoit la consistance d'extract, j'y ai mêlé dans le même tems une livre de chaux en poudre, il ne s'est exhalé aucune odeur urineuse, quoique la matiere fût très chaude; j'y ai luté un chapiteau & un récipient, j'ai poussé le feu pendant 5 heures: la matiere a distillé fort lentement, je n'ai pu retirer que 2 onces de liqueur qui avoit une odeur d'empyreume, mêlée d'esprit volatil urinaireux.

Elle n'avoit aucun goût.

Elle n'a point fait de changement au papier bleu.

Elle n'a point fermenté avec l'esprit de nitre, mais elle a jetté des fumées épaisses qui sentoient l'esprit urineux, & ne s'est point échauffée.

Elle a fait de même avec l'huile de vitriol, mais elle s'est échauffée.

Elle a blanchi, comme de la crème, la solution de sublimé corrosif, & l'a rendue aussi épaisse: j'ai jetté sur ce mélange, de la dissolution de sel de tartre, qui étant bien mêlée, le tout est devenu blanc.

La matiere restée dans la cucurbite, étoit dure & très blanche, elle pesoit 23 onces; j'en ai retiré, par la lotion, 20 onces de terre très blanche; il est donc resté 3 onces de matiere saline dissoute dans l'eau. Cette liqueur évaporée jusqu'à pellicule, & mêlée séparément avec l'esprit de nitre, l'esprit de sel, l'huile de vitriol, l'huile de tartre par défaut, & la solution de sublimé corrosif,

a donné les mêmes changemens que la dissolution de fel de plâtras, mêlée avec les mêmes liqueurs, & dont j'ai parlé ci-dessus.

Tout ce que la chaux a produit dans cette distillation, c'est de donner une liqueur légèrement urineuse, & point d'esprit acide.

REMARQUE.

J'ai dit à la page 535, que je n'ai trouvé (dans les Plâtras) ni salpêtre, ni sel marin par aucun procédé, & qu'il n'est pas possible d'en retirer, à moins d'y ajouter un sel fixe; je n'ai pas prétendu qu'il n'y en avoit pas du tout, car il peut y en avoir. L'on connoit assez le salpêtre de houffage: j'en ai retiré moi-même de très vif, qui s'étoit formé sur des murailles & sur des pierres particulieres: c'est une chose que j'expliquerai dans le Mémoire que je donnerai, en parlant de la formation du salpêtre. L'on y verra la raison pourquoi l'on ne retire point de salpêtre des Plâtras, quoiqu'il puisse y en avoir; & pourquoi le salpêtre qui se forme sur certaines pierres, est beaucoup plus vif que tout autre salpêtre.

P R O B L E M E.

Quatre points ou quatre objets étant donnés sur un plan, placés comme on voudra, trouver un cinquième point, duquel ayant tiré des lignes aux quatre objets, les trois angles formés par ces quatres lignes soient égaux, ou dans tel rapport donné qu'on voudra.

Par M. P I T O T. *

JE n'entre point ici dans la question de savoir si les distances vues sous des angles égaux, paroissent ou sont jugées égales; il me paroît seulement que notre jugement là-dessus doit varier suivant qu'il y a entre notre œil & ces mêmes distances, plus ou moins d'objets interposés.

Pour résoudre ce Problème, il ne faut d'abord considérer que trois des objets, & chercher les points d'où l'on puisse voir ces trois objets sous deux angles égaux. Ce Problème est toujours indéterminé, mais le lieu en est différent, suivant les différentes situations respectives des objets entre eux; ce lieu peut être une ligne droite, une section conique, une courbe du second genre, & plus généralement, une courbe du troisième genre.

Lorsqu'il y a quatre objets, le Problème est.

est déterminé, mais sa solution dépend entièrement de celui de trois; car ayant trouvé la courbe qui satisfait à trois des objets quelconques, on en laissera un à volonté pour prendre le quatrième, & ayant trouvé, par la même méthode, la nouvelle courbe pour ces trois derniers, le point où ces deux courbes se couperont, résoudra le Problème.

Le cas le plus simple est lorsque les objets sont placés sur une ligne droite; ce cas me fut proposé par un de nos M^{rs}., je le résolus sans calcul, par une méthode très simple, bien différente, & moins composée que les solutions que M^{rs}. Guinée & Ozanam ont données de ce même cas.

Comme la solution générale que je donne ici, suppose ma méthode pour le cas simple dont je viens de parler, j'ai besoin de commencer par cette méthode.

Trois objets * A, B, C , étant donnés sur une ligne droite: pour trouver le point G , en sorte que les angles AGB, BGC soient égaux, on formera sur les intervalles AB & BC des triangles semblables & isosceles ADB, BEC , on tirera la ligne EDF , & du point F pour centre, & du rayon FB on décrira le cercle BGH , qui sera le lieu de tous les points G . Car du point E pour centre ayant décrit le cercle CBG , & du point D le cercle ABG , il est évident que les angles ADB, BEC , étant égaux, les angles à la circonférence AGB, BGC , sont aussi égaux. Or, en faisant differens triangles isosceles $ADB,$
 $BEC,$

* Fig. 1.

Bb 4

BEC , on aura differens points G , & la ligne BG sera toujours divisée en deux également & perpendiculairement par FDE . Donc cette même ligne BG sera toujours une corde du cercle BGH . Donc le cercle BGH est le lieu de tous les points G .

Si les angles AGB , BGC , sous lesquels on voudroit voir les trois objets A , B , C , étoient donnés, le Problème seroit déterminé, on feroit simplement les angles ADB , BEC , doubles des angles donnés AGB , BGC .

Si on vouloit que les angles AGB , BGC , au-lieu d'être égaux, fussent doubles ou triples l'un de l'autre, ou généralement dans tels rapports qu'on voudra, on feroit simplement les angles ADB , BEC dans ces mêmes rapports. Ainsi on résoudroit très aisément cette question: *Trouver le point d'où l'on peut voir trois objets sur une ligne droite sous deux angles donnés?*

Pour résoudre présentement le cas général, ou dont les trois objets sont placés indifféremment sur le plan, on joindra deux des objets quelconques par une ligne indéfinie, & on rapportera le troisieme objet sur cette ligne; ainsi ayant joint * A & C , par la ligne IAC , il est évident que si l'on tire du troisieme objet B , une ligne à volonté BEM , qui coupe AC en E , on pourra trouver sur cette ligne le point M , d'où ayant tiré MA , MC , elles feront avec MEB , les angles AMB , CMB égaux: Car il n'y a qu'à con-

siderer

* Fig. 2.

fidérer que les trois objets sont A, E, C , faire comme au premier cas, les triangles semblables & isosceles AGE, EFC , tirer FGH , & du point H pour centre, décrire le cercle EMI qui sera tel, que de tous les points de sa circonférence, on verra les trois points A, E , & C , sous deux angles égaux. Mais entre tous les points de cette circonférence, il n'y a évidemment que le point M , d'où l'on puisse voir les trois objets A, B, C , sous deux angles égaux. On peut cependant trouver une infinité de points M , en tirant différentes lignes BEM , & opérant comme ci-dessus; la suite de tous ces points M formera une ligne courbe. Voici la manière dont nous avons déterminé son Equation.

Par les points B & M , on tirera les perpendiculaires BD, MP ; soient nommées les données AD, a ; DC, b ; BD, c ; & les indéterminées DP, x ; PM, y ; ED, z ; AH, u . AP sera $a - x$; $AE, a - z$; $EC, b + z$; $HE, a + u - z$. Donc $IE = 2u + 2a - 2z$, & $IP = 2u + 2a - z - x$. Cela posé, les triangles semblables CFH, EGH , donneront $CE, EH :: FG, GH$, & les triangles semblables EFH, AGH donnent $EA, AH :: FG, GH$. Donc $CE, EH :: EA, AH$; ou, en termes analytiques, $b + z, a + u - z :: a - z, u$, ce qui donne une première Equation

$$bu + 2zu - au = aa - 2az + zz.$$

Les triangles semblables EDB, EPM donnent $ED, z, DB, c :: EP, x - z, PM, y$. D'où l'on tire une 2^{de} Equation $zy = cx - cz$. Enfin les triangles semblables EPM, MPI

$Bb\ 5.$ don-

donnent $EP, x-z. PM, y :: PM, y. PI 2u - 2a - z - x$, ce qui donne une 3^{me}. Equation $yy + xx - zz - 2ax + 2az = 2ux - 2zu$. Il faut présentement avec la 1^{re}. & la 3^{me}. Equation, faire évanouir l'indéterminée u , & substituer dans la nouvelle Equation, la valeur de z , tirée de la seconde; & l'on aura enfin, après les réductions, l'Equation de la courbe

$$\begin{aligned} ay^4 - 2cxy^3 - bccyy - 2bcxxy + 2accxx &= 0 \\ -by^4 + 2acy^3 + accyy + 2abxxy \\ - 2bcy^3 - 2ccxyy - 2acxxy \\ + axxyy - 2cx^3y \\ + 2abxxy \\ - bxxxy. \end{aligned}$$

Comme nous avons donné la méthode de trouver, par une opération très simple, tant de points M de la courbe qu'on voudra, il seroit très inutile de chercher à la décrire par le moyen de son Equation.

* Cette Equation renferme tous les cas possibles; car si, pour tomber dans le premier cas qui est, comme nous avons dit, le plus simple, on suppose $*BD$ nulle, alors les points B & E se confondront avec le point D , & effaçant dans l'Equation, les termes où BD, c , se trouve, elle se réduira à celle-ci


$$\text{le-ci } \frac{2abx}{b-a} - xx = yy, \text{ ou } \frac{2abx}{a-b} - xx = yy,$$


suivant que (a) est moindre, ou plus grand que (b) . Or il est très aisé de voir que cette Equation est celle du cercle BGH , ou du lieu de tous les points qui satisfont au premier

* Fig. 1.

Men

Fig.





mier cas; car ayant donné aux lignes du premier cas, les mêmes dénominations qu'à celles du second, on aura $AB=a$, $BC=b$, $AF=u$, $BP=x$, & $PM=y$.

Les triangles semblables CEF , BDP donnent $CE, BD :: CF, BF$. Mais $CE.BD :: CB.AB$. Donc $CF.BF :: CB.AB$; ce qui donne en termes analytiques $b + a + u$

. $a + u :: b . a$; d'où l'on tire $AF, u = \frac{a^2}{b-a}$, &

BF qui est le rayon du cercle $= \frac{ab}{b-a}$, & l'E-

quation du cercle fera $\frac{2abx}{b-a} - xx = yy$. Si

AB avoit été plus grand que BC , le point F seroit tombé de l'autre côté, & l'Equation

du cercle seroit $\frac{2abx}{a-b} - xx = yy$.

Si les trois objets forment un triangle isocèle & ABC , alors les trois grandeurs a , b & c , seront égales, & l'on aura, en mettant a pour b & c , cette Equation $y^2 + xxy - aax = 0$.
 $- aay$.

Nous pourrions faire plusieurs observations sur ce Problème, & en tirer beaucoup de Corollaires.



METHODE NOUVELLE

DE TROUVER.

LA HAUTEUR DU POLE.

Par M. GODIN.*

LA hauteur de l'Equateur, ou, ce qui revient au même, la hauteur du Pole sur l'horizon, lorsqu'on ne la veut connoître qu'à une minute près, n'est pas difficile à déterminer. Des Voyageurs qui ne sont que Voyageurs, avec des instrumens médiocres peuvent aller jusqu'à ce degré de précision; mais cela ne suffit pas aux Astronomes, & cet arc qui se rencontre à chaque pas dans les calculs astronomiques, auxquels il sert très souvent de base, s'il n'étoit connu qu'à une minute près, répandroit un faux général, & souvent des absurdités dans les Théories. Cependant on ignore encore si l'on peut s'assurer, ou plutôt si l'on connoit la hauteur du Pole d'un lieu à 20'' près, d'un lieu même dans lequel on a la commodité de faire une longue suite d'observations. M^{rs}. Cassini & Maraldi ont toujours retenu la hauteur du Pole à l'Observatoire Royal, de 48° 50' 10'', M. de la Hire l'a toujours prise de 10'' moindre.

Fixer

Fixer la hauteur du Pole par les hauteurs méridiennes du Soleil & des Etoiles fixes, ou par la plus grande & la plus petite hauteur d'une Etoile toujours apparente, c'est, dans le premier cas, supposer entre autres choses, la hauteur du Pole déjà bien connue, & dans les deux ensemble, une Table exacte des réfractions; sans compter des irrégularités dans quelques Etoiles fixes, & peut-être dans toutes, dont on s'est apperçu sans les avoir encore limitées. Si j'observe, par exemple, la Polaire dans ses deux médiations au-dessus & au-dessous du Pole (ce que l'on doit regarder comme une des meilleures manieres de trouver la hauteur du Pole) quelle Table de réfractions choisirai-je? elles diffèrent toutes entre elles. De plus, cette Etoile a des variations singulieres; car au lieu de s'approcher régulièrement du Pole, elle semble quelquefois s'en éloigner, en sorte qu'en divers tems, les observations donnent des hauteurs de Pole différentes, & cette difference va à plus d'une demi-minute. Que cela vienne du mouvement annuel de la Terre, ou simplement d'une nutation de son axe, ou de la variation des réfractions en différens tems, c'est ce qu'on ne sauroit encore décider; & les observations faites jusqu'à présent ne s'y accordent pas: ce qu'il y a de certain, c'est que vers l'Equinoxe du Printems, cette Etoile paroît plus basse qu'elle ne devoit; que vers l'Equinoxe d'Automne, elle paroît plus haute; & qu'en général en diverses années, ses hauteurs varient indépendamment de sa distance au Pole; comme

je le détaillerai dans un autre Mémoire.

Ces réflexions m'ont fait chercher une méthode de trouver la hauteur du Pole, qui fût exempte de ces incertitudes, & sur-tout qui ne supposât pas les réfractions. Je n'en ai pas trouvé de cette nature qui fût directe, mais celle que je vais donner en approche, & elle donnera la hauteur du Pole à 5" près, dans les mêmes circonstances que j'emploie. En voici une idée générale, en ne supposant point les réfractions.

Je choisis une des Etoiles circompolaires qui, dans sa plus grande hauteur méridienne, passe assez près du Zénith, & soit par-là exempte des réfractions: telle est à mon égard la Luifante du côté de Persée (*a*, *Bayeri*) qui vient à 7' environ du Zénith.

Ayant placé un Quart-de-cercle garni d'une Lunette en alhidade, dans le plan du cercle de 6 heures, le centre tourne vers le Pole: j'observe l'Etoile dans ses plus grandes digressions apparentes du Pole, c'est à dire, lorsqu'en parcourant son parallèle, elle vient à rencontrer le cercle de 6 heures; ce tems se connoit aisément, soit par l'heure à-peu-près, soit parce qu'elle paroît alors décrire le fil horizontal de la Lunette, devenu vertical par la situation de l'Instrument. Ces deux observations dans les deux digressions donnent sur le limbe du Quart-de-cercle, un arc égal au double de la distance de l'Etoile au Pole, dont la moitié étant ôtée de la plus grande hauteur méridienne de l'Etoile qui est hors des réfractions, puisqu'elle passe à 7' près du Zénith, donnera la hauteur du Pole,


le, sans avoir égard à l'effet des réfractions.

Dans un lieu dont la latitude seroit moindre que 45° , il faudroit un arc plus grand qu'un Quart-de-cercle, & il faut aussi que l'instrument dont on se servira, soit au moins du double de degrés que le complément de la déclinaison de l'Etoile dont on se sert: par exemple, on ne pourroit pas faire usage d'un Quart-de-cercle pour une Etoile qui n'auroit que 40 degrés de déclinaison, parce que sa distance au Pole étant de 50 degrés, sa double distance, ou l'arc compris entre ses deux digressions, qui est celui que l'on observe, sera de 100 degrés.

Mais parce que l'Etoile est sujette aux réfractions dans ses diverses hauteurs sur l'horizon, l'arc entre ses deux digressions apparentes & mesuré sur l'instrument, n'est pas le véritable. Dans ces deux situations, l'Etoile souffre de part & d'autre deux réfractions égales qui élevant suivant un vertical, diminuent l'arc total entre les deux digressions véritables, & par conséquent la distance de l'Etoile au Pole, en sorte que par cette méthode, la hauteur du Pole viendra plus grande qu'elle ne doit être.

Si Z^* est le Zénith, P le Pole, AEC le parallèle de l'Etoile, EP qui est une portion du cercle de 6 heures, sera la véritable distance de l'Etoile au Pole; mais l'Etoile étant en E , par exemple, dans sa plus grande digression, elle sera vue à cause de la réfraction en un point S du vertical ESZ , & de même dans l'autre digression, & la moitié de l'arc observé sera SO , différent de EP . Voici
de

* Voy. la Fig. suivante.



de quelle maniere j'employe cet arc observé SO à trouver l'arc EP , & par conséquent la hauteur du Pole.

SO est une portion de grand cercle, puisqu'il est formé par le plan prolongé du Quart-de-cercle dont on se sert dans l'observation: de plus, il est perpendiculaire à ZP , parce que ses poles sont nécessairement sur le cercle ZP , c'est pourquoi le triangle ZSO est rectangle en O . Si, dans l'instant que l'Etoile est observée en S dans sa plus grande digression apparente, on prend sa hauteur aussi apparente sur l'horizon, le complément de cette hauteur fera ZS . On connoît donc dans ce triangle les deux côtés ZS , OS , outre l'angle droit, c'est pourquoi l'on trouvera l'angle SZO .

Sup.

Supposant maintenant la réfraction ES d'une certaine quantité, on aura ZE , & dans le triangle ZEP , rectangle en P , connoissant deux angles & un côté, on trouvera EP , distance véritable de l'Etoile au Pole, qui, étant ajoutée à ZA , complément de la hauteur méridienne de l'Etoile, donnera ZP , complément de la hauteur du Pole.

La solution exacte de ce Problème ne dépend donc que de la valeur ES de la réfraction, c'est en la supposant de différente grandeur que l'on parviendra à une solution fort approchée; car si, donnant à ES différentes valeurs, assez différentes entre elles, & beaucoup plus qu'elles ne doivent l'être, par tout ce que nous connoissons des réfractions, la hauteur du Pole vient à très peu près la même, la solution du Problème sera aussi bonne que si elle étoit directe. En voici un exemple appliqué à des observations.

Les 13, 15, 18 & 19 Novembre 1733, qui est un tems propre pour l'observation de la Luifante du côté de Persée dans les circonstances que j'ai dites, j'observai cette Etoile dans ses plus grandes digressions apparentes du Pole, auxquelles elle arrive vers les 6 heures du soir & du matin. L'arc total entre ses deux digressions, fut trouvé de $82^{\circ} 3' 19''$, sa hauteur apparente sur l'horizon alors étoit de $34^{\circ} 37' 28''$, & sa hauteur méridienne de $89^{\circ} 53' 0''$.

Dans le triangle rectangle ZSO , on connoit SO de $41^{\circ} 1' 39''\frac{1}{2}$, & le côté ZS , complément de la hauteur observée est aussi con-

con-

570 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE

connu de $55^{\circ} 22' 32''$, c'est pourquoi on trouvera l'angle OZS de $52^{\circ} 54' 39'' \frac{1}{2}$.

$S. Z S. 55^{\circ} 22' 32''$

$S. S O. 41 \quad 1 \quad 39 \frac{1}{2} \quad 198171831131$

$ST. \quad 90 \quad 0 \quad 0 \quad 99153439119$

$S. OZS. 52 \quad 54 \quad 39 \frac{1}{2} \quad 99018392012$

241589

150423

143262 $\left(9 \frac{1}{2} \right)$

7161

Supposons maintenant qu'à la hauteur de $34^{\circ} 37' 28''$, où étoit l'Etoile dans le tems de la plus grande digression, la réfraction l'ait élevée de $1' 25''$, qui est celle que donne la Table de M. Cassini, on aura ZE de $55^{\circ} 23' 57''$. Cela posé, dans le triangle rectangle ZEP , on connoit EZ , & l'angle EZP que l'on vient de trouver, c'est pourquoi on trouvera EP par l'analogie suivante de $41^{\circ} 2' 30'' \frac{1}{2}$.

$ST. \quad 90^{\circ} \quad 0' \quad 0''$

$S. EZP. 52 \quad 54 \quad 39 \frac{1}{2} \quad 99018392012$

101682

$S. ZE. 55 \quad 23 \quad 57 \quad 99154572648$

$S. EP. 41 \quad 2 \quad 30 \frac{1}{2} \quad 998173066342$

59685

6657

$\left(\frac{1}{4} \right)$
24184

Or EP est égal à PA , c'est pourquoi si de la hauteur méridienne de l'Etoile $89^{\circ} 53' 0''$ on ôte PA $41 \quad 2 \quad 30 \frac{1}{2}$
Il restera pour la hauteur du Pole $48 \quad 50 \quad 30$.
Voilà le Problème résolu, en supposant la réfraction de $1' 25''$, à la hauteur de $34^{\circ} 37' 28''$;

mais

mais si la réfraction étoit moindre ou plus grande, qu'elle fût, par exemple, de $1' 38''$, telle que M. de la Hire la donne à cette hauteur, voyons quelle différence il viendrait dans la hauteur du Pole; ou plutôt prenons deux réfractions, telles que $1' 5''$ & $1' 45''$, l'une plus petite, & l'autre plus grande que celle que j'ai prise de $20''$.

En prenant la plus petite, on aura cette nouvelle analogie où EP vient de $41^{\circ} 2' 18'' \frac{1}{4}$.

$ST.$ $90^{\circ} 0' 0''$

$S. EZP.$ $52 \ 54 \ 39 \ \frac{1}{2}$ 99018392012

101703

$S. ZE.$ $55 \ 23 \ 37$ 99154282087

$S. EP.$ $41 \ 2 \ 18 \ \frac{1}{4}$ 98172775802

575224

199878

193512

$\left(\frac{8 \frac{1}{4}}{24189} \right)$

6366

En prenant la plus grande réfraction, on aura celle-ci où EP vient de $41^{\circ} 2' 42'' \frac{1}{4}$.

$ST.$ $90^{\circ} 0' 0''$

$S. EZP.$ $52 \ 54 \ 39 \ \frac{1}{2}$ 99018392012

101661

$S. ZP.$ $55 \ 24 \ 17$ 99154863147

$S. EP.$ $41 \ 2 \ 42 \ \frac{1}{4}$ 98173356820

01530

55290

48364

$\left(\frac{2 \frac{1}{4}}{24182} \right)$

6926

Ce qui donne $24''$ de différence dans la hauteur du Pole pour $40''$ de différence dans la

la réfraction, c'est-à-dire, 6" pour 10" de réfraction, qui est toute la différence qu'il peut y avoir dans les Tables de Réfractions, construites par differens Astronomes pour le même lieu, à des hauteurs d'environ 40°. Cette incertitude sera moindre encore à des hauteurs plus grandes, & j'ai amené le Problème à un point, si je ne me trompe, assez important, qui est de trouver la hauteur du Pole par le moyen d'une Etoile fixe, sans connoître sa déclinaison, & en telle sorte que l'erreur qui viendra des réfractions mal connues, soit diminuée de sa moitié.

Pour juger de ce que l'on gagne à éviter de supposer la déclinaison de l'Etoile, il n'y a qu'à remarquer que celle de l'Etoile α de Persée que j'ai choisie, & qui est une belle Etoile de la seconde grandeur, est très différente dans nos meilleurs Catalogues. M. Maraldi donne cette déclinaison pour le commencement de l'année 1734, de $49^{\circ} 1' 40''$, & M. Flamsteed pour le même tems, de $48^{\circ} 53' 18''$; la différence entre eux, est de $8' 22''$.

Il ne me reste qu'une remarque à faire, qui est que la hauteur de l'Etoile, lorsqu'elle est dans ses plus grandes digressions, n'est pas sujette à erreur, comme on le pourroit croire d'abord, à cause que dans cette situation sa hauteur change très promptement, au-lieu que son élévation reste longtems la même, de sorte qu'il paroîtroit fort aisé de bien déterminer l'angle de son élévation, mais fort difficile au contraire de saisir sa hauteur dans le véritable instant qu'elle est
dans

dans le cercle de 6 heures ; cependant , il est fort facile d'y parvenir : il n'y a qu'à faire attention que de part & d'autre du Pole , cette hauteur doit être la même , & que les deux soient prises dans des tems justement éloignés de 12 heures. Ainsi , lorsque l'Etoile , par exemple , est dans la digression orientale , il faut prendre ses hauteurs , au moins de minute en minute , & marquer l'heure , & faire la même chose lorsqu'elle se trouve à sa digression occidentale. On verra ensuite quelles sont les hauteurs égales qui sont éloignées l'une de l'autre de 12 heures , & ces hauteurs seront les véritables qu'il faudra employer. Si , de toutes celles qu'on a prises , il ne s'en trouvoit aucunes qui fussent dans ce cas , on les y fera venir par le rapport des changemens de hauteurs aux intervalles des tems , & cela ne peut produire aucune erreur sensible.



M E M O I R E

S U R

L'EMETICITÉ DE L'ANTIMOINE,

SUR LE TARTRE EMETIQUE,

ET SUR LE KERMES MINERAL.

Par M. GEOFFROY. *

L'USAGE du Tartre émétique , introduit avec succès dans la Médecine , lorsqu'il est

est nécessaire de faire vomir les malades: celui du Kermès minéral, employé sagement par les grands Praticiens, pour cuire les humeurs, & les disposer à une évacuation salutaire, feroient l'un & l'autre hors de tout soupçon (quand ils sont ordonnés à propos) si ces deux remèdes étoient préparés avec toutes les précautions nécessaires, & si l'on suivoit par-tout le meilleur & le même procédé; mais il arrive souvent qu'un Tartre émétique donné à 3 grains, fait de grands effets, pendant qu'un autre émétique, préparé différemment, ne fera rien à 6 ou 7 grains; & cela dans des dispositions à-peu-près semblables de la part des malades.

Il en est de même du Kermès minéral, l'un n'excite que très peu de nausées à la dose de 3 & 4 grains, l'autre fait vomir à un grain ou un grain & demi, sans qu'on puisse attribuer cette différence d'effet au plus ou moins d'acide séjournant ou introduit dans l'estomac.

Une telle variété méritoit qu'on en examinât la cause, puisque le Public y est intéressé.

J'ai rassemblé de plusieurs endroits douze Tartres émétiques, & un pareil nombre de préparations de Kermès minéral. La manière dont je les ai analysés, la différence de leurs produits, font en partie le sujet de ce Mémoire, & cette différence donnera une indication certaine, ou un moyen de connoître l'effet qu'on doit attendre de tel ou tel Emétique, de tel ou tel Kermès, en supposant dans les malades des dispositions à-peu-

peu-près égales. Je proposerai à la fin du Mémoire, un autre remède bien simple, qui peut être substitué au Kermès dans plusieurs cas, & souvent avec un succès moins douteux.

L'Antimoine, dont on fait que le Tartre émétique & le Kermès sont deux préparations, est un minéral composé d'un peu de terre métallique facile à vitrifier, d'une portion assez considérable d'acide vitriolique, & du bitume ou huile de la terre.

Cet acide, joint au bitume, forme le soufre brulant; soufre qui est quelquefois si abondant dans l'Antimoine minéral, que souvent il s'en trouve qui s'enflamme comme le soufre commun. C'est ce soufre uni à la terre métallique de l'Antimoine, qui fait voir dans ce minéral (lorsqu'il n'a subi que les premières fontes servant à le purifier) cette multiplicité d'aiguilles dont il est composé; mais c'est à l'acide vitriolique, uni au bitume, & formant le soufre commun, que ces aiguilles sont dûes, & non à la matière huileuse seule. Car si l'on fond du verre d'Antimoine avec un simple phlogistique qui n'ait point cet acide, comme le charbon de bois pulvérisé, on ressuscite ce verre en régule, qui n'est pas aiguillé comme l'Antimoine, mais rempli de facettes ou de lames brillantes. Si, au contraire, on emploie le soufre commun pour ressusciter de semblable verre d'Antimoine, on trouve dans le creuset un Antimoine aiguillé, comme l'Antimoine ordinaire, parce qu'on a rendu à ce minéral vitrifié tout ce qu'il avoit perdu pendant la calcina-

cination, c'est-à-dire, son acide vitriolique, & cette graisse de la terre, formant ensemble le souphre commun qui lui est essentiel pour être Antimoine.

La preuve de l'existence d'une terre vitrifiable dans l'Antimoine, est sa facilité à se vitrifier, lorsque par la calcination on en a fait évaporer l'excédent de l'acide vitriolique & du phlogistique qui interrompoient la continuité ou l'attouchement des particules intégrantes de cette terre métallique.

Ainsi il résulte de ce que je viens de dire, que cette terre desunie ou divisée par beaucoup de souphre brulant, fait de l'Antimoine.

Que la matiere inflammable étant enlevée en partie, en sorte qu'il n'en reste que ce qu'il en faut pour conserver à l'Antimoine une forme métallique, on a du régule.

Que si on enleve presque totalement cette matiere inflammable par une calcination modérée, la terre métallique de l'Antimoine prend la forme du verre, lorsqu'on la met à un feu de fusion.

Qu'enfin, si l'on pousse cette calcination par degrés à un feu extrême, on a une chaux desanimée; ou une terre qui, quant à l'éméticité, n'a plus les propriétés ni les vertus de l'Antimoine, de son régule, ou de son verre.

Il y a quelques Auteurs, du nombre desquels est Kunckel, qui supposent dans l'Antimoine un principe mercuriel concourant avec le souphre & la terre vitrifiable pour la formation de ce minéral. L'Auteur que je cite,

cite, indique même énigmatiquement, plusieurs voyes pour découvrir ce mercure : mais je n'ose admettre ce principe mercuriel, jusqu'à ce que par quelque procédé hors de tout soupçon, je puisse me convaincre de l'existence d'un mercure coulant dans l'Antimoine. J'ai déjà commencé, sur la foi de Kunckel qui étoit un excellent Artiste, quelques-unes des opérations par lesquelles on prétend l'obtenir, & mes expériences, si elles réussissent, me fourniront de quoi donner un autre Mémoire à la Compagnie.

Quant à présent, je ne reconnois que trois principes secondaires qui soient sensibles dans l'Antimoine ; un acide vitriolique, semblable à l'esprit de souphre ; une matiere sulphureuse, bitumineuse, huileuse, (il n'importe, pourvu qu'avec l'acide vitriolique elle puisse former un souphre commun ;) enfin une terre métallique vitrifiable.

Le souphre commun n'est point émétique ; l'acide vitriolique, la plupart des liqueurs huileuses avec lesquelles il pourroit produire du souphre, ne le sont pas non plus ; la chaux desanimée de l'Antimoine n'excite aucune nausée. Cependant de toutes ces matieres combinées il se forme un minéral ; & de ce minéral, l'art extrait un régule, un verre, & d'autres préparations qui sont violemment émétiques.

Si l'on fait digerer du verre d'Antimoine pulvérisé dans du vinaigre blanc, jusqu'à ce que le vinaigre n'en tire plus de teinture ; si l'on refond la poudre jusqu'à la vitrifier, qu'on la pulvérisé de nouveau, qu'on la fasse digé-

rer dans de nouveau vinaigre blanc, & qu'on répète cela plusieurs fois; enfin à la quatrième ou cinquième vitrification, le verre se trouvera noir, n'aura presque plus de transparence, & ne sera plus du tout émétique, quoique les deux ou trois premiers le fussent considérablement.

Tous les vinaigres précédens sont émétiques à differens degrés: les premiers sont un peu plus salés que les derniers, qui semblent avoir un goût astringent. Ils ont pris tous une teinture rouge en digérant sur ces verres pulvérisés; (mais sur toute matière purement sulphureuse ils prendroient une semblable teinture, & ne seroient pas pour cela émétiques;) il faut donc que l'huileux du vinaigre ait extrait la teinture d'un reste de matière sulphureuse ou du phlogistique concentrée dans le verre d'Antimoine, & que l'acide du même vinaigre ait corrodé ou dissout une portion de la partie réguline du verre, ou si l'on veut, de cette partie aisée à réguler. Or on sait déjà, & je vais faire voir que c'est la partie réguline de l'Antimoine qui constitue son éméticité; c'est-à-dire, que cette éméticité est résidente dans un combiné quelconque de soufre composé de très peu d'acide vitriolique & d'une portion de matière inflammable, unis à une terre vitrifiable. Si cette terre a peu d'interstices remplis par le soufre, elle sera très émétique: tel est le verre d'Antimoine, qui est une des plus émétiques de toutes les préparations de ce minéral. Si ces interstices sont plus grands ou plus multipliés, comme ils le sont dans le

ré-

régule qui contient plus de souphre que le verre, elle fera un peu moins émétique. Enfin si ces interstices sont si larges qu'il y ait plus de souphre grossier que de cette terre vitrifiable, il n'y aura plus d'éméticité que par accident; comme dans l'Antimoine, qui ne fait vomir qu'à l'aide de quelque acide.

La principale raison pourquoi l'Antimoine brut n'est pas émétique, c'est que l'acide vitriolique y est uni à un phlogistique onctueux avec lequel il forme un souphre grossier & bitumineux, qui lie si bien les particules de la terre métallique, qu'elles ne peuvent agir dans l'estomac sans un secours étranger. Mais quand la plus grande partie de cet acide & de ce phlogistique bitumineux est enlevée par le feu ou par tout autre moyen, alors il ne reste dans le régule qu'un souphre capable d'expansion, & par conséquent en état d'enlever avec lui des particules de la terre métallique vitrifiable, qui par leur roideur peuvent irriter le genre nerveux, & exciter des contractions violentes; car je suppose que cette irritation est la première cause du vomissement.

On m'objectera peut-être, que tout ce que je viens de dire sur l'éméticité de l'Antimoine, étoit en partie connu; cela peut être: mais je ne pouvois me dispenser, par rapport à la suite de ce Mémoire, de faire voir que le phlogistique ou principe inflammable de l'Antimoine, n'est émétique qu'autant qu'après avoir été dégagé de son acide vitriolique, il est uni à la terre vitrifiable; c'est-à-dire, autant qu'il approche de la forme du

verre, ou au moins de celle du régule: qu'ainfi, plus le Tartre émétique & le Kermès contiendront de régule aisé à ressusciter, plus ils seront émétiques. Je vais passer à des expériences qui le prouveront.

J'ai employé une once de chacun des Tartres émétiques que j'ai rassemblés: je les ai broyés séparément avec pareil poids ou un peu plus de flux noir, composé de deux parties de Tartre rouge, & d'une partie de nître calcinés ensemble: j'ai mis ces mélanges dans differens creusets faits en cone renversé; je les ai tenus au feu de fonte, jusqu'à ce que les sels fondus se fussent affaïssés & parussent comme une huile tranquille au fond du creuset. J'ai laissé éteindre le feu & refroidir les creusets; je les ai cassés, & j'ai trouvé le régule ressuscité, rassemblé au fond du creuset.

Des plus foibles Tartres émétiques, j'ai eu par once depuis 30 grains jusqu'à un gros 18 grains de régule.

De ceux d'une éméticité moyenne, un gros & demi: & des plus violens dans leurs effets, jusqu'à 2 gros 10 grains.

Les scories de ces essais qui étoient jaunes d'abord, sont devenues vertes ensuite, puis elles ont noirci, & enfin elles se sont mises en deliquium.

L'action des plus forts Tartres émétiques dépend donc de la quantité du régule d'Antimoine que la crème de Tartre a dissoute; & plus les préparations antinoniales sur lesquelles on fait bouillir la solution de la crème de Tartre, approchent de la forme de
ré-

régule ou de verre, plus le Tartre émétique est violent, parce qu'alors l'acide végétal du Tartre agit plus immédiatement & dissout davantage de la partie émétique de l'Antimoine.

Si au contraire on met cette solution de Tartre bouillir avec l'Antimoine crud dont les parties régulines sont enveloppées & défendues par le souphre grossier, à peine cet acide agira-t-il dessus.

J'ai fait broyer deux onces de crème de Tartre avec une once d'Antimoine qui avoit été déjà porphyrisé : j'ai fait bouillir ce mélange dans une grande quantité d'eau pendant 18 heures : la liqueur ayant pris une couleur jaunâtre & un goût stiptique approchant du vitriolique, je l'ai filtrée chaude par un double papier. La masse restée au fond du matras répandoit une odeur sulphureuse. Cette impregnation étant évaporée, j'ai eu un crystal de Tartre qui à 2 grains n'a donné que quelques foibles nausées.

J'ai pris une once de ce crystal de Tartre légèrement empreint de l'éméticité de l'Antimoine, & je l'ai fondu comme les autres Tartres émétiques avec le flux noir : j'ai trouvé dans le creuset refroidi & cassé beaucoup de scories jaunes avec quelques petits grains épars de régule, mais si menus & en si petite quantité, qu'ils n'avoient pu par leur poids se rassembler au fond du creuset.

Quoiqu'il soit évident par cette expérience que l'acide du Tartre agit sur l'Antimoine, & qu'il corrode un peu de sa partie réguline, cependant cette corrosion est si foible,

ble, qu'il n'est pas possible de rassembler par la réduction les particules du régule enlevé par cet acide végétal : aussi est-il certain que, quelque fine que soit la poudre de l'Antimoine, chacune de ces petites parties reste toujours enveloppée de son soufre grossier, & ce soufre la défend & oppose un enduit à l'action de l'acide du Tartre.

Il est donc prouvé que pour qu'un acide végétal devienne suffisamment émétique par son séjour sur l'Antimoine, il faut que ce minéral soit délivré, le plus qu'il est possible, de son soufre grossier ; qu'il soit réduit en un régule très pur ; & que plus il approchera de la forme du verre, sans addition d'aucune matière étrangère qui en facilite la vitrification, plus l'acide du Tartre enlèvera, avec le soufre, de ces parties roides de la terre métallique que j'ai dit ci-devant être la cause du vomissement. Ainsi tout Tartre émétique qui aura été préparé avec le verre d'Antimoine & le foyé d'Antimoine lavé, qui est une espèce de vitrification, sera beaucoup plus émétique qu'aucun autre.

J'ai fait voir ci-devant par la quantité de régule contenu dans les différens émétiques dont j'ai fait la réduction, qu'il n'est pas indifférent de savoir à quel degré ce remède est émétique, & qu'il peut arriver dans les campagnes de grands accidens de ces ordonnances de routine qui prescrivent 4, 5 & 6 grains d'émétique pour faire vomir un malade. Si donc on jugeoit à propos de suivre ma méthode pour connoître à quelle quantité un émétique quelconque doit faire vomir,

sans.

sans que le vomissement soit suivi d'accidens; voici une Table tirée du produit de mes réductions. J'ai choisi les deux extrêmes, c'est-à-dire, le plus foible & le plus fort émétique, & j'y ai ajouté celui qui m'a toujours paru contenir la proportion la plus convenable de régule.

Un Tartre émétique dont on réduit 32 grains de régule par once, en contient 4 grains par gros, & un dix-huitieme de grain par grain; par conséquent il peut être regardé comme trop foible.

Celui qui fournit deux gros de régule par once, en contient 18 grains par gros: c'est un quart de grain par grain. Il est violent, à moins qu'on ne le donne en très petite dose.

Enfin, celui qui rend un gros & demi de régule par once, en contient 13 grains & demi par gros; c'est trois seiziemes de grain par grain. Cette proportion est bonne, & je sai que ce dernier fait vomir suffisamment à la dose de deux grains ou deux grains & demi; c'est-à-dire, en introduisant six ou sept seiziemes de grain de régule dans l'estomac.

Quoique je fixe ici la quantité de régule contenue dans chaque grain d'émétique, relativement au produit total d'une simple réduction par le flux noir, je n'en prétends pas conclurre que chaque grain de Tartre émétique non réduit, ne contienne précisément que la dose de régule ci-devant marquée: je sai qu'il en contient un peu davantage. Mais ce surplus étant dans les scories de la réduction,

tion, il faudroit les diffoudre dans de l'eau, & en précipiter la poudre communément nommée *souphre de l'Antimoine*, puis réduire cette poudre par le flux noir, on en retire-roit encore un peu de régule. J'abandonne cette réduction, pour rendre mon opération servant d'épreuve, plus aisée & moins lon-gue.

Examen du Kermès minéral.

Cette préparation, publiée par ordre du Roi en 1720, se fait par une ébullition de l'Antimoine dans de l'eau de pluie animée par la liqueur du nitre fixé par les charbons: c'est l'Alkaest de Glauber: il se précipite, a-près la filtration de la liqueur encore chaude, une poudre qui bien édulcorée est le remède en question.

Le Kermès a été regardé pendant un tems comme un souphre de l'Antimoine. Suivant cette idée, je l'ai examiné d'abord par la dé-flagration, afin de savoir s'il ne bruloit pas différemment de l'Antimoine en poudre & du souphre doré d'Antimoine.

J'ai fait rougir trois morceaux de porcelai-ne épaisse à un même feu; j'ai fait tomber sur l'un 10 grains d'Antimoine porphyrisé; sur l'autre 10 grains de souphre doré d'Antimoi-ne de la quatrième précipitation, parce que c'est le plus fin; & sur le troisième autant de Kermès bien choisi & haut en couleur. Le Kermès donne une flamme plus bleuâtre que les deux autres, il se consume plus vite que le souphre doré de l'Antimoine, qui bouillon-ne en brulant comme l'Antimoine même; ces deux

deux derniers donnant des vapeurs ou une fumée beaucoup plus grossière. L'odeur du Kermès dans cette expérience étoit moins sulphureuse & moins piquante que celle des deux autres. En continuant le feu, ces trois matieres se sont évaporées, & ayant cessé de fumer, l'Antimoine a laissé sur sa porcelaine une tache d'un brun rouge, ou couleur de café.

Le souphre doré a laissé une matiere rougeâtre, parsemée de quelques points blancs.

Quant au Kermès, il n'a laissé qu'une terre blanche, rare, spongieuse, avec quelques petits points jaunes.

J'ai dit que j'avois choisi un Kermès haut en couleur, parce qu'il faut faire remarquer que si cette poudre rouge n'a pas été suffisamment édulcorée par de fréquentes lotions d'eau, & que s'il y reste trop de sel alkali, elle perd sa couleur à l'air, & se couvre d'une fleur ou couche blanche. J'ai même une masse de Kermès de cette espece qui est devenu tout blanc, & qui en blanchissant a perdu presque toute son odeur sulphureuse, ce qui suppose beaucoup de volatilité dans la partie sulphureuse de cette poudre; car le souphre de cette préparation n'est plus de la nature du souphre grossier de l'Antimoine, parce que l'acide vitriolique en a été dénaturé par l'alkali du nitre fixé. Pour le démontrer, j'ai pris du Kermès très édulcoré, une partie; avec cette poudre j'ai étient dans un mortier de verre deux parties de mercure très pur, que j'avois ressuscité sans distillation du sublimé corrosif par la limaille de fer. Il s'est formé de ce mélange une poudre noire ou æthiops, comme quand

on éteint le mercure avec le souphre commun : cependant voici la difference. L'æthiops fait par le souphre commun est une préparation qui donne toujours le cinabre artificiel par la sublimation. Si le Kermès eût été un souphre de même nature, c'est-à-dire, s'il avoit eu un acide vitriolique libre d'agir, j'aurois eu de mon æthiops de Kermès un cinabre d'Antimoine. Cependant après l'avoir poussé au feu dans une cornue presque jusqu'à la fondre, le mercure a passé sans diminution de poids dans le récipient : il y a eu seulement à la partie du col de la cornue sortant immédiatement du fourneau, un petit cercle rouge, mais qui n'étoit qu'une teinte presque sans consistance. J'ai trouvé au fond de la cornue le Kermès fondu en plusieurs petites masses détachées les unes des autres, d'une couleur plus obscure que le foye d'Antimoine ; quelques-unes étoient pleines de bulles d'air, & toutes étoient cassantes. Aucune de ces masses n'avoit ni les aiguilles de l'Antimoine, ni les facettes du régule. Je crois que ce qui a facilité cette fonte du Kermès, quoiqu'imparfaite, ou qu'on ne peut regarder comme une réduction, c'est la portion de sel alkali nécessairement existante dans cette poudre, mais qui n'est pas suffisante pour faire la revivification complète du régule. Toutes les masses dont je viens de parler, étoient hérissées de petites aiguilles transparentes, roides & cassantes ; la voûte de la cornue étoit enduite d'une poussière blanche très fine, parsemée en quelques endroits de petits tas de semblables aiguilles,

pres-

presque toutes rangées en étoile à plusieurs rayes ; elles étoient plus apparentes près du col de la cornue, où elles s'étoient arrêtées sur un enduit de poussière jaunâtre. Les différences de couleur de cette poussière, & ces tas d'aiguilles sublimées n'ont été aisées à observer que lorsque j'ai fait cette opération avec peu de matière ; car, quand j'en ai employé une plus grande quantité, le feu, en fondant le Kermès, a fait élever une matière beaucoup plus confuse & plus brune à la voûte de la cornue.

Si donc on veut avoir du cinabre par le Kermès & le mercure, il faut ou y ajouter un acide vitriolique, ou dégager celui qui a été saisi par l'alkali du nitre fixé, afin qu'avec la partie inflammable du Kermès, il puisse agir comme un soufre commun reproduit.

Premier exemple. J'ai pris une once de Kermès, j'ai versé dessus, en triturant, jusqu'à 16 gouttes d'huile de vitriol blanche & non sulphureuse ; après une heure de trituration, la poudre ne m'a point paru acide ; ensuite j'y ai éteint petit à petit 4 gros de mercure purifié ; j'ai fait triturer pendant 15 à 16 heures, car le mélange a été très longtemps à prendre la couleur noire de l'æthiops ; enfin j'ai mis cet æthiops dans une cornue, il a monté dans le col, du soufre jaune en petite quantité, ensuite une matière fort noire & bitumineuse, le mercure a passé coulant dans le récipient ; voyant qu'il ne montoit plus rien, j'ai augmenté le feu & fondu le fond de la cornue, & le lendemain j'ai trouvé à la voûte & sur la surface de la masse

restée dans le fond, assez considérablement d'un fort beau cinabre d'Antimoine, mais il a fallu un feu de fonte pour le sublimer.

Second exemple. Pour dégager l'acide vitriolique du Kermès embarrassé dans le sel alkali du nitre fixé, j'ai pris 3 parties ou 9 gros de Kermès, & 4 parties ou 12 gros de sublimé corrosif (ce sont les proportions de feu M. Lémery qui a si bien analysé l'Antimoine), j'ai mis ce mélange dans une cornue, & je l'ai poussé au feu de réverbère; la distillation m'a fourni du beurre d'Antimoine en liqueur, première preuve de l'existence d'un régule dans le Kermès, puis du mercure ressuscité, & enfin du cinabre véritable d'Antimoine; j'ai trouvé aussi au fond de la cornue une matière semblable à de l'Antimoine fondu qui auroit un peu de scories, la voûte de la cornue étoit tapissée d'une farine ou fleurs blanches d'Antimoine.

Il paroît par cette expérience que l'acide du sel marin qui étoit dans le sublimé corrosif, a abandonné son mercure pour attaquer la partie réguline du Kermès, la dissoudre, & en faire du beurre d'Antimoine: il paroît aussi que ce régule réduit en beurre, a laissé libre la portion d'acide vitriolique qui étoit uni avant l'opération avec l'alkali du nitre fixé, avec la partie sulphureuse & avec la terre métallique de l'Antimoine, dans le Kermès (car ce sont-là les quatre matières qui entrent dans le composé de cette poudre); & qu'alors cette portion d'acide vitriolique dégagée en partie de ces liens, a repris la proportion de phlogistique qui lui convenoit pour se ré-
gé-

général en souphre commun, & s'élever en cinabre, en s'unissant au mercure. J'ai pris la masse du fond de la cornue, & l'ayant réduite par le flux noir, j'ai eu 12 grains de régule de mes 9 gros de Kermès employés dans cette expérience; c'est-à-dire, un grain un tiers par gros de Kermès. Comme j'ai répété douze fois la précédente opération toute entière sur douze Kermès differens, les produits de la réduction ont varié; car j'ai trouvé deux Kermès qui m'ont rendu par le flux réductif jusqu'à deux grains un huitième de régule par gros de poudre mise à l'épreuve. Aussi ce Kermès dont le régule est si aisé à ressusciter, est-il le plus émétique de tous. A ces produits de régule ressuscité, il faut ajouter la portion de régule qui a passé dans le beurre d'Antimoine, & celle qui est restée dans les scories de la réduction.

Pour prouver encore qu'il n'y a point de souphre commun dans le Kermès, ou du moins que s'il en reste encore sous la forme de souphre commun, il est en trop petite quantité pour s'élever en cinabre avec le mercure; j'ai mis dans une cornue une demi-once de Kermès bien lavé sans aucune addition, j'ai conduit le feu par degrés, & à une chaleur assez douce, il s'est formé au col de la cornue un cercle jaune, c'étoit un véritable souphre; mais il étoit en aussi petite quantité que le cercle rouge sans consistance de ma première expérience du Kermès trituré avec le mercure.

J'ai donc fait voir que le Kermès & le mercure joints ensemble ne peuvent donner du

cinabre qu'à l'aide d'un acide vitriolique, ou par le secours du sublimé corrosif. Voyons ce qu'il produira avec l'acide vitriolique concentré dans le mercure.

J'ai mis dans une cornue un gros de turbit minéral broyé avec autant de Kermès : la cornue ayant été placée au feu de reverbere, il est sorti d'abord un peu de flegme insipide, ensuite il s'est déposé ou attaché au col de la cornue une vapeur d'abord blanche, puis jaune, ensuite rouge-pâle, & enfin rouge-foncé, comme du cinabre. Ce rouge a bruni dans la partie du col la plus exposée au feu. Les parois intérieures de la cornue se sont enduites d'une couche jaune & rouge, & sur cette couche se sont sublimées des houppes ou flocons d'aiguilles pareilles à celles dont j'ai déjà parlé. En ôtant le récipient, il est sorti une odeur sulphureuse très pénétrante. J'ai retiré du récipient 52 grains de mercure ressuscité, & la cornue ayant été coupée, j'ai trouvé au fond une masse divisée en plusieurs parties, toutes paroissant métalliques, quant à la couleur, mais spongieuses & hérissées de petites aiguilles blanches & brillantes.

Ainsi dans cette expérience l'acide vitriolique du turbit a abandonné son mercure, pour se saisir ou attaquer le phlogistique, l'alkali & la partie métallique du Kermès; une partie de cet acide s'étant unie au phlogistique, s'est régénérée en soufre brulant, ce sont les cercles jaunes du col & de la voûte de la cornue, car en ayant un peu détaché, je l'ai vu bruler comme du soufre. De ce soufre-régénéré, une partie s'est jointe à quelque
por.

portion de mercure, & s'est sublimée en cinabre, du moins le cercle rouge m'a paru en être de véritable; enfin le reste de cet acide s'est concentré avec la partie réguline, & c'est lui qui a fait végéter toutes ces aiguilles dont les masses du fond de la cornue paroissent hérissées.

Le même acide vitriolique du turbit trouve dans le mercure précipité rouge de quoi sublimer une autre matière qui n'est ni un cinabre, ni un sublimé corrosif. Quoique l'expérience que je vais lire semble ne pas appartenir à ce Mémoire, non plus que celle qui la suivra, j'ai cru cependant qu'elles méritoient d'y avoir place.

J'ai mis dans une cornue un mélange d'un gros de turbit minéral & d'un gros de précipité rouge: ces deux matières ont donné d'abord un acide qui étoit nitreux à l'odeur & au goût, ensuite il est venu une odeur sulfureuse très forte, qui ne peut avoir sa source que dans le phlogistique du mercure, ou dans celui de l'esprit de nitre, il n'importe.

Il a passé dans le récipient un gros & 24 grains de mercure, le reste s'est sublimé au col de la cornue en un sel mercuriel blanc, qui n'est pas un sublimé corrosif, mais un turbit sublimé, puisqu'il ne se dissout pas dans l'eau, & qu'il y jaunit comme le turbit minéral.

Le turbit minéral mis seul dans une cornue, ne m'a rendu par gros que 31 grains de mercure coulant, encore a-t-il fallu pousser le feu jusqu'à fondre la cornue, au fond de laquelle

quelle il est resté une tache blanche qui avoit pénétré la substance du verre ; & dans le col j'ai trouvé sublimé un peu de souphre jaune régénéré apparemment avec le phlogistique du mercure & une matiere blanche compacte que l'eau ne dissout ni ne change point de couleur, non plus que la tache du fond de la cornue. Ce sublimé blanc indissoluble est, selon Kunckel, le sel qui étoit dans l'huile de vitriol, & que le mercure a eu la force d'élever ; ne seroit-ce pas aussi ce qu'il appelle en plusieurs endroits le *sel des métaux* ? car, selon le même Auteur, ce sel est dans l'huile de vitriol.

Le précipité rouge poussé à grand feu, se ressuscite de lui-même sans addition, cela est connu : il rend par gros depuis 65 jusqu'à 66 grains de mercure : il reste dans le fond de la cornue une terre grise rougeâtre, & il paroît dans le col trois cercles, rouge, jaune & blanc.

Le même précipité étant distillé à un gros avec poids égal de Kermès bien lavé, il en sort une liqueur acide sulphureuse ; il paroît à la voûte & au col de la cornue une très petite teinte rouge, & il se ressuscite 65 grains de mercure.

Le même précipité rouge ayant été distillé avec l'Antimoine crud prophyrisé au poids d'un gros de chacun, le mercure s'est ressuscité moins vite que dans les deux expériences précédentes, parce que les fleurs qui s'élevoient de l'Antimoine étant très abondantes, les parois intérieures de la cornue en devenoient moins lisses, & par conséquent les vapeurs

vapeurs mercurielles glissent dessus plus difficilement. Cependant ayant rassemblé tout le mercure, j'en ai eu 66 grains bon poids. Ainsi il est évident par ces trois expériences, que dans un gros de précipité rouge il n'y a que 6 à 7 grains d'acide du nitre.

Revenons au Kermès. J'ai fait voir que cette poudre qu'on a pu regarder comme un soufre, est la partie métallique même de l'Antimoine, puisqu'on en peut retirer un beurre d'Antimoine & un régule; mais le soufre brulant de l'Antimoine a changé de nature. L'alkali du nitre fixé a formé avec lui un hépar sulphuris qui se trouve divisé & suspendu dans la liqueur, pendant l'ébullition qui doit extraire le Kermès. On fait que l'hépar sulphuris a la vertu de dissoudre tous les métaux, même l'or, lorsqu'on les fond avec lui. Il est vrai que dans la préparation du Kermès par ébullition, ce n'est pas un hépar sulphuris en fusion; cependant rien n'empêche que simplement dissout dans l'eau, il ne puisse attaquer la partie métallique de l'Antimoine, & cela est si vrai que si l'on charge l'eau de pluie de trop de sel alkali, il s'en précipite un Kermès dont on réduit par le flux noir beaucoup plus de régule que lorsqu'il a été préparé par une liqueur moins âcre. Donc le Kermès n'est autre chose qu'un hépar sulphuris chargé de la partie métallique de l'Antimoine, mais cette partie métallique y est divisée en particules extrêmement déliées; plus ces particules seront fines, moins le Kermès sera émétique. Ainsi après qu'on l'a préparé, en suivant le procédé publié par ordre du Roi, qui

qui est le meilleur de tous, si on veut avoir un Kermès qui n'agisse que comme fondant, sans exciter de nausées, il faut en prendre un gros, le mettre dans un matras assez grand, verser dessus 4 livres $\frac{1}{2}$ d'eau, & y dissoudre 2 gros $\frac{1}{2}$ de nitre fixé qui ait été auparavant dissout, filtré, évaporé, & réduit en forme sèche, pour le dépurer d'un sédiment assez considérable qu'il laisse sur le filtre; enfin le faire bouillir: il se précipitera une terre grise avec la portion du régule la plus grossière; & en survoidant la liqueur, & la laissant refroidir, on aura un Kermès très fin, très rouge, beaucoup plus sûr que celui de la première préparation, quand on ne veut pas qu'il fasse vomir, car ce Kermès corrigé ou rectifié ne peut jamais devenir émétique que par accident. Il est vrai que par cette rectification on en perd près de la moitié.

Quant au Kermès non-rectifié, comme il arrive souvent qu'on en trouve qui n'est pas préparé avec toutes les précautions nécessaires pour que la partie réguline y soit suffisamment divisée & atténuée, je crois qu'on peut, en toute sûreté, lui substituer l'Antimoine lui-même, préparé comme je vais le dire.

Il faut prendre de l'Antimoine de Hongrie en petits pains, le choisir en belles aiguilles brillantes, le pulvériser & le tamiser, puis le faire broyer avec de l'eau sur un porphyre, jusqu'à ce qu'il ne craquette plus sous la dent; ensuite on le met dans une jatte pleine d'eau, on brouille l'eau avec une spatule de bois, & après avoir laissé déposer la poudre la plus grossière

grossiere pendant 12 ou 15 secondes, on sur-
vuide l'eau par inclination, en la versant sur
un ou plusieurs filtres; on prend la poudre
subtile qui est restée sur ces filtres, & on la
fait secher dans une étuve; quand elle est
bien seche, on la broye de nouveau sur le
porphyre, en ajoutant un gros de sucre candi
en poudre bien seche, sur une once de pou-
dre d'Antimoine, & l'on continue de broyer
jusqu'à ce qu'en applatissant un peu de la pou-
dre avec un couteau, on n'y apperçoive au
grand jour aucun brillant: alors elle est pré-
parée pour l'usage.

Il y a déjà longtems qu'on a vanté l'Anti-
moine en poudre comme un excellent reme-
de contre les maladies du poumon, & com-
me un bon fondant dans l'asthme, & dans
plusieurs autres maladies.

En 1674, Kunckel ressentant des douleurs
très aiguës dans le bras droit, consulta Sen-
nert Médecin de Wirtemberg, fils du fameux
Sennert, qui lui conseilla l'usage de l'Anti-
moine: il en prit pendant un mois, & fut
guéri.

En 1679, le même Kunckel eut encore
récours à l'Antimoine porphyrisé, pour de
vives douleurs de goutte dans les mains &
dans les pieds. Il en fit faire des tablettes
avec le sucre rosat, & fut guéri. Ces tablet-
tes antimoniales sont encore connues dans
quelques villes d'Allemagne, sous le nom de
Tablettes de Kunckel.

Si mon témoignage peut être ici de quel-
que poids, j'ose assurer que l'usage de ce mi-
néral en poudre subtile, est un remede sou-
verain.

verain pour les enfans rachitiques ou noués, & pour tous ceux qui ont des glandes obstruées. Il réussit assez bien dans les enfans tourmentés par les vers; & j'ai vu des femmes ayant des fleurs blanches, qui, après les remèdes généraux, ont été bien guéries par l'usage de cette poudre: mais on ne doit la donner dans le commencement qu'en fort petite dose, comme d'un grain, & quoique l'Antimoine ne soit point émétique par lui-même, il est bon cependant de joindre à sa poudre 3. ou 4 parties de quelque alkali, comme des yeux d'Ecrevisse ou autre. On augmente les doses par degrés, & l'on peut aller ainsi jusqu'à 8 ou 10 grains par jour. Si l'on augmentoit les doses de ce minéral avec trop de précipitation, il exciteroit des mouvemens dans les entrailles, purgeroit ou donneroit des nausées. Il faut avoir aussi la précaution de défendre aux malades l'usage du vin, à moins qu'il ne soit très mur, du vinaigre, & de tout autre acide, même des potages où l'on auroit mis des herbes acides, comme l'oseille, &c.

Il résulte de tout ce que j'ai lu dans ce Mémoire,

1°. Que l'éméticité de l'Antimoine est dans sa terre métallique vitrifiable (ce que les Chimistes savient déjà). Que le Tartre émétique ne fait vomir que parce qu'il est chargé de beaucoup de particules grossières de cette terre: Qu'en le réduisant par le flux noir, on peut savoir à quel degré il est émétique.

2°. Que le Kermès est un hépar sulphuris qui.

qui a dissout, mais plus subtilement que ne fait l'acide du Tartre, une portion de cette terre métallique: Qu'on peut rectifier le Kermès pour le rendre simplement fondant & diaphorétique: Enfin qu'on peut substituer au Kermès, une poudre subtile de l'Antimoine.



DE LA PERPENDICULAIRE
A LA MERIDIENNE DE PARIS,

Prolongée vers l'Orient.

Par M. CASSINI.

Nous avons rendu compte à l'Assemblée publique d'après la Saint Martin de l'année dernière, des opérations que nous avons faites pour prolonger la Perpendiculaire à la Méridienne de Paris du côté de l'Occident, & des avantages qui en doivent résulter, non-seulement pour la perfection de la Carte de la France, mais aussi pour la Navigation en général, où il est absolument nécessaire de connoître le rapport des degrés de longitude à ceux de latitude.

Il s'agissoit ensuite de prolonger cette même Perpendiculaire du côté de l'Orient jusqu'aux bords du Rhin, pour avoir à l'égard de Paris, toute l'étendue de la France de l'Orient vers l'Occident, de la même manière que l'on avoit déjà déterminé par la Méridienne

dienn

dienne sa longueur du Nord vers le Midi, depuis Dunkerque jusqu'aux Pyrenées.

Cet ouvrage dont M. le Contrôleur-général avoit formé le projet l'année dernière, conformément aux Mémoires qui m'avoient été communiqués par M. Malet de l'Académie Française, & dont l'exécution, suivant ce qui avoit été pratiqué jusqu'alors, sembloit être réservée pour les tems de paix, n'a pu être retardé par les guerres qui sont survenues depuis qu'on l'avoit commencé; parce qu'il suffit qu'une entreprise soit agréable au Roi & utile à l'Etat, pour que le Ministère concoure unanimement à la faire exécuter, sans que d'autres affaires qui paroissent plus pressantes puissent empêcher d'y donner toute l'attention qu'elle mérite.

Ainsi je reçus ordre du Roi de me disposer à ce voyage pour le Printems de cette année, avec M^{rs}. Maraldi, l'Abbé de la Grive, Chevalier, Le Roi, & deux de mes fils.

Nous partîmes de Paris le dernier du mois de Mai de cette année. Comme M. Picard avoit, dans sa mesure de la Terre, déterminé du côté de l'Orient deux bases, l'une de Brié-Comte-Robert à la Tour de Montjay, & l'autre de cette Tour à Dammartin; nous jugeâmes devoir les employer toutes les deux pour former nos triangles, afin que si les objets nous manquoient d'un côté, nous pussions continuer de l'autre sans aucune interruption, & sans être obligés de revenir sur nos pas, comme il nous étoit arrivé l'année dernière aux environs de Verneuil. Il devoit encore en résulter deux avantages considérables; le
pre-

premier, de comprendre par ce moyen & déterminer une plus grande étendue de pays; le second, de vérifier les mesures observées sur une base, par celles qui auroient été déterminées sur l'autre, lorsqu'on viendrait à se réunir.

Nos premières observations furent à Brie-Comte-Robert, qui est le terme le plus méridional des deux bases que nous voulions employer: nous allâmes de là à la Tour de Montjay, qui est environnée par des ruines d'anciens bâtimens qui empêchent d'observer au rez-de-chaussée. Il étoit donc à souhaiter de pouvoir monter sur cette Tour, non-seulement pour y déterminer le troisième angle de plusieurs triangles qui devoient s'y réunir, mais aussi parce que M. Picard n'avoit pas marqué l'endroit où il y avoit fait élever un signal en forme d'une pièce de bois grossie de paille, pour s'y diriger; ce qui laissoit quelque incertitude sur sa distance précise au Clocher de Brie-Comte-Robert. Il ne reste plus présentement qu'environ la moitié de cette Tour en forme de croissant, & elle étoit, dès l'année 1669, en si mauvais état, que M. Picard ne jugea pas à propos que l'on s'exposât une seconde fois au danger qu'il y avoit d'y monter.

Ces difficultés n'empêcherent pas plusieurs de nos M^{rs}. d'y faire leurs observations sur son sommet, & même à deux reprises différentes, pour déterminer la position de divers objets que l'on n'avoit pas apperçus la première fois. Nous continuâmes ensuite nos observations jusqu'à Meaux où nous commençâmes

çames à nous partager pour former des triangles, les uns vers le Midi, à l'égard de la Perpendiculaire, & les autres vers le Nord.

On alla pour cet effet à Dammartin, dont il étoit nécessaire de connoître la distance exacte à la Tour de Montjay, qui étoit la seconde base que nous devions employer. M. Picard y avoit fait ses observations dans le pavillon ovale du Château de cette ville. Mais il avoit reconnu par la suite que le milieu de ce pavillon étoit difficile à distinguer, lorsqu'on le regardoit de certains endroits, ce qui lui fit avouer qu'il avoit eu raison de tenir pour suspects les triangles qui y aboutissent.

Pour éviter de pareils inconvéniens, nous primes le parti de faire nos observations dans le Clocher de la Collégiale de Dammartin, qui domine sur le Château, & se voit de tous les environs à une grande distance, sans qu'on puisse s'y méprendre.

C'est sur cette nouvelle base du centre de la Tour de Montjay au Clocher de Dammartin, que nous commençames à former nos triangles du côté du Nord.

Le pays paroissoit plus découvert que du côté du Midi où se trouvoit la forêt de Cressy qui couvroit une grande partie de l'horizon; cependant après y avoir formé quelques triangles, ne s'étant plus trouvé d'objets remarquables vers le Nord, nous fumes obligés de nous réunir à ceux que l'on avoit prolongés du côté du Midi jusqu'au Clocher de Doue à la distance de Paris de 31315 toises.

Le premier triangle que l'on forma ensuite, nous

nous donna deux bases sur lesquelles nous continuâmes nos opérations, de la même manière que nous les avions commencées, les unes du côté du Midi; & les autres vers le Nord jusqu'aux confins de la Brie avec la Champagne, où nous nous réunîmes encore une seconde fois.

Ce fut là où nous commençâmes à rencontrer des Bois qui s'étendoient du Midi vers le Nord, & nous couvroient divers objets remarquables aux environs de la Perpendiculaire, tels que la Tour du Mont-Aimé qui se voit de divers endroits de la Champagne à une très grande distance.

Après avoir donc fait diverses tentatives inutiles sur les clochers des environs qui paroissent les plus éminens, nous prîmes le parti d'aller dans ces Bois chercher quelques arbres du sommet desquels on pût découvrir le Clocher de Champaubert qui paroissoit le mieux disposé, & la Tour du Mont-Aimé; & ayant choisi celui qui se trouvoit le plus près de la direction de ces deux objets, on fit placer un signal en forme de drapeau blanc qui fut observé en même tems de Champaubert, Mont-Aimé & du Clocher d'Allemant, & qui nous donna la distance entre ces objets avec à-peu-près la même précision que si l'on avoit pu les observer immédiatement les uns des autres.

Nous étions alors à la distance de Paris d'environ 60 mille toises, & comme le pays y étoit découvert, nous y plaçâmes un poteau sur la Perpendiculaire par la méthode qui avoit déjà été pratiquée en pareille occasion,

Mém. 1734.

D d

en

en mettant un signal dans la direction commune de l'endroit où l'on avoit calculé qu'il devoit se trouver sur cette Perpendiculaire. Ce lieu s'est rencontré un peu au-delà du village d'Onifeux, à la distance de 3334 toises de la Tour du Mont-Aimé.

Nous formames ensuite dans les plaines de Champagne divers triangles d'une assez grande étendue, qui se vérifioient l'un l'autre, & nous trouvames encore le moyen de placer une pyramide sur la Perpendiculaire à la distance de 80 mille toises, par une méthode un peu différente de la première; car comme les objets que l'on découvroit des environs, tels que Châlons, Notre-Dame de l'Epine & l'arbre du Mont de la Fourche, étoient à une trop grande distance, pour qu'on pût appercevoir du lieu où devoit être la pyramide, les differens signaux que l'on auroit dû faire de ces divers endroits pour se mettre dans la direction requise, on eut recours à la méthode de déterminer la situation d'un lieu inconnu, en observant de ce lieu les angles de position entre trois objets dont la distance entre eux est connue. Ayant ainsi établi la position de deux lieux près la Perpendiculaire, il fut ensuite fort aisé de déterminer le point qui étoit à la distance cherchée de 80 mille toises, qui se trouva à l'Occident de la riviere de Marne entre Châlons & Vitry-le-François; près du chemin qui conduit de Cheppe à Vesigneux.

Nous continuames ensuite nos opérations jusqu'aux frontieres de la Lorraine, qui se trouvent un peu en-deçà de 100 mille toises

mesurées sur la Perpendiculaire, & nous arrivâmes à Bar-le-Duc, d'où ayant informé Madame la Duchesse Régente du sujet de notre commission, Son Altesse Royale donna ordre à ses Officiers de nous y laisser vaquer librement dans ses Etats, ce qu'elle renouvela ensuite par des ordres plus précis, lorsqu'elle eut reçu des Lettres que M. le Garde des Sceaux lui en écrivit de la part du Roi.

Ce fut vers ces endroits que le pays commença à être presque entièrement dépourvu d'objets, ce qui nous obligea de placer divers signaux dans les lieux les plus éminens, pour continuer nos triangles.

Nous parvinmes ainsi jusqu'à la Meuse, au bord de laquelle il y a plusieurs chaines de montagnes couvertes de Bois dans une étendue de 7 à 8 lieues du Nord au Sud, sur 2 à 3 de largeur. Nous fumes donc obligés de parcourir ces Bois en divers sens, faisant monter sur les arbres les plus élevés pour découvrir si l'on pouvoit appercevoir les objets à l'entour. Enfin, après plusieurs jours de recherche, nous en trouvâmes un placé sur une petite butte, du sommet duquel un de nos Messieurs découvrit avec une Lunette du côté de l'Occident, la butte d'Isencourt qui étoit un de nos points déjà déterminés, & du côté de l'Orient divers objets propres à continuer nos triangles. Mais il lui fut impossible d'appercevoir un signal que l'on avoit élevé sur la butte de Sorbé vers l'extrémité méridionale de ces Bois, ce qui paroissoit nécessaire pour lier nos triangles.

Il y avoit à la distance d'environ 500 toises

de cet arbre, une ancienne Chapelle du Château de Trognon que l'on avoit vue du signal de Sorbé, & d'où l'on appercevoit du côté de l'Orient les mêmes objets que du sommet de l'arbre; mais on ne pouvoit point découvrir de là la butte d'Isoncourt, ce qui formoit la même difficulté pour la continuation des triangles, qui demandent que d'un objet en avant, on en puisse reconnoître deux dont la position est déjà déterminée.

Dans ces circonstances, nous examinâmes la situation du terrain, & nous reconnûmes qu'entre notre arbre qui étoit presque à l'extrémité occidentale des Bois, & la Chapelle, il y avoit un terrain uni sur lequel on pourroit mesurer une base d'une longueur suffisante pour déterminer exactement la distance de l'arbre à la Chapelle. Nous fîmes donc élever deux signaux, l'un sur le sommet de l'arbre, & l'autre sur les ruïnes de la Chapelle, afin d'avoir des points précis auxquels on pût se diriger; & ayant mesuré par deux fois une base de 118 toises, & mis des piquets à ses extrémités, nous observâmes de là avec un Quart-de-cercle les angles entre ces signaux, par le moyen desquels on calcula leur distance précise; ce qui joint à la direction du signal de l'arbre à l'égard de celui de Sorbé observé de la Chapelle, nous donna la distance de cette Chapelle au signal de Sorbé, avec une précision à peu près de même que si l'on avoit vu de là la butte d'Isoncourt, ou du sommet de l'arbre le signal de Sorbé, puisqu'il est aisé de faire voir qu'il ne peut pas y avoir eu sur cette distance qui est de 15036 toises,

toises, une erreur de plus d'un pied, qui doit par conséquent être négligée.

Cette détermination étoit même préférable à celle que l'on auroit eue, si l'on avoit vu du sommet de l'arbre le signal de Sorbé, parce que n'étant pas possible d'y observer, on n'auroit pu déterminer que deux angles de chacun des trois triangles qui y aboutissent; au-lieu que par la méthode que nous avons pratiquée, il n'y a eu à la Chapelle de Trognon qu'un seul angle de conclu, & tous les autres ont été observés, de même que ceux de tous les triangles que l'on avoit formés jusqu'alors, ce qui en rend la mesure beaucoup plus précise.

Nous allâmes du Château de Trognon au moulin du village de Brulé près de Toul, qui est dans une belle exposition. On voyoit de là les montagnes des Vosges qui séparent la Lorraine d'avec l'Alsace, entre lesquelles les plus apparentes sont celles de Thaun qui se reconnoissent avec évidence, à cause qu'auprès de la plus élevée nommée *le grand Thaun* ou *Donon*, il y en a une autre plus basse qui se termine en pointe.

Nous commençâmes dès-lors à déterminer leur position à l'égard des objets aux environs; & comme nous prévîmes que ces montagnes pourroient bien changer de figure, & former différens aspects, suivant les différens endroits d'où on les observeroit, nous envoyâmes poser un signal sur le lieu le plus éminent, afin d'avoir un point fixe auquel on pût toujours se diriger sans craindre de s'y méprendre.

Nous continuâmes ensuite nos opérations par le moyen de divers signaux, jusqu'à Vic qui est une ville de la dépendance du Roi, enclavée dans la Lorraine. Nous étions alors à la distance de près de 160 mille toises de Paris, & ayant reconnu que le terrain où devoit se rencontrer la Perpendiculaire à cette distance, étoit dans la demi-lieue qui a été cédée au Roi de part & d'autre du grand chemin de Metz à Strasbourg, nous profitâmes de cette situation pour y élever une pyramide de pierre de taille surmontée d'une fleur de lis, & laisser au milieu des Etats de la Lorraine un monument durable de l'ouvrage que nous y avions exécuté par ordre du Roi. Nous employâmes pour cet effet une méthode encore un peu différente de la première, en mesurant sur le terrain une base de 186 toises pour suppléer au défaut d'un objet dont il auroit été nécessaire de connoître la situation, pour déterminer de là la direction du lieu où devoit être cette pyramide.

Nous allâmes de Vic à Morhange, où nous trouvâmes l'horizon couvert de Bois du côté où il auroit été nécessaire de découvrir quelques objets pour continuer nos triangles. On auroit pu pratiquer une méthode semblable à celle qui avoit réussi en pareilles occasions, qui étoit de poser des signaux sur les arbres les plus élevés de ces Bois. Mais sur ce que les habitans nous assurèrent que plus nous avancerions, plus nous trouverions de Bois à traverser, nous primes le parti d'aller faire nos observations sur la montagne de Thaun, après

après avoir été reconnoître une Tour que l'on avoit apperçue des signaux de Delme & de Vic, & que nous jugeames être près de Phalsbourg. Cette Tour se trouva être la plus éminente des trois que l'on appelle *du Haut-Bar*, près de Saverne, & d'où l'on découvre Strasbourg & divers objets, tant de l'Alsace, que de la Lorraine.

Avant que d'y faire nos observations, nous jugeames à propos d'aller sur la montagne de Thaun, & nous partimes de Phalsbourg pour nous y rendre. Quoique cette montagne n'en fût éloignée que de 15 à 16 mille toises, nous employames un jour & demi à y arriver par des chemins ou plutôt des sentiers au travers des Bois presque impraticables, & connus seulement par des Chasseurs qui en sont les seuls guides.

Nous parvinmes cependant, quoiqu'avec beaucoup de peine, à y faire transporter notre plus grand Quart-de-cercle, parce qu'il étoit d'une grande importance d'apporter toute la précision possible dans les observations que nous projections d'y faire. Nous ne pûmes d'abord reconnoître du sommet de cette montagne, aucun des objets d'où nous l'avions apperçue; ce qui nous fit prendre le parti d'y observer le Soleil à son passage par le Méridien, pour déterminer le point du Midi sur l'horizon, & nous diriger par ce moyen aux objets dont la position étoit connue par rapport au Méridien: mais il nous fut impossible ce jour-là d'en appercevoir aucun.

Nous primes sur cela la résolution d'envoyer faire des feux aux objets qu'il étoit nécessai-

re de distinguer, de même qu'on l'avoit pratiqué autrefois dans la mesure de la Terre, quoiqu'à des distances beaucoup moins grandes; & pour en retarder le moins qu'il fût possible l'exécution, nous fîmes partir dès le lendemain matin deux personnes en poste, l'un pour le moulin de Brulé, & l'autre pour le signal de Delme, avec ordre d'y faire des feux, dans le premier de ces endroits pendant trois jours consécutifs, & dans le second quatre jours, afin de pouvoir les appercevoir des lieux où nous jugions devoir faire nos observations.

Nous retournâmes le lendemain sur la montagne par un tems beaucoup plus serein que le jour précédent, & nous eûmes la satisfaction d'y voir assez distinctement le moulin de Brulé & le signal de Delme. Le premier de ces objets étoit à la distance de 51300 toises qui excède le quart de celle de Strasbourg à Paris, & il parut un peu avant le coucher du Soleil comme un fil très délié.

Il occupoit à peine 5 secondes dans la Lunette, quoique son diamètre extérieur qui avoit été mesuré de 20 pieds, eût dû paroître à cette distance au moins de 13 secondes; mais tel est l'effet des objets qui ne sont point éclairés, lesquels vus de loin, paroissent plus petits qu'ils ne le devroient être, tout au contraire des objets lumineux dont le diamètre apparent paroît plus grand, comme on le verra dans la suite.

Le second objet qui étoit formé par deux arbres qui se touchoient & avoient chacun 7 à 8 pieds de diamètre, n'étoit qu'à la distance

ce

ce de 37500 toises, & on avoit plus de peine à le distinguer. A l'égard des autres objets d'où l'on avoit apperçu cette montagne, comme ils étoient moins élevés que les précédens, il fut impossible de les reconnoître, quoiqu'ils en fussent plus proches, parce qu'ils étoient confondus avec le terrain.

Nous observâmes ce jour-là le Soleil à son coucher lorsqu'il touchoit l'horizon, & ayant déterminé en cet endroit l'abaissement de l'horizon qui étoit de 44' 40", nous calculâmes son amplitude occidentale & l'angle que le point de l'Ouest devoit faire avec le moulin de Brulé, que nous trouvâmes à peu près de même que par la suite des triangles; ce qui étoit une preuve que la Perpendiculaire à la Méridienne que nous avions prolongée jusque-là, ne s'étoit pas écartée sensiblement de la direction qu'elle devoit avoir.

Nous retournâmes encore sur la même montagne le troisieme jour, qui étoit celui où les feux devoient commencer, dans le dessein d'y passer la nuit pour les observer; car il étoit très essentiel pour la précision de nos opérations, de reconnoître avec une entière évidence si c'étoient les mêmes objets que ceux que nous avions apperçus le jour précédent. Nous déterminâmes en attendant, les angles de position entre un grand nombre d'objets, d'un côté dans la Lorraine, & de l'autre dans l'Alsace, où l'on voyoit Strasbourg & plusieurs villes ou villages jusqu'aux montagnes Noires qui sont au-delà du Rhin; & pour n'avoir rien qui nous cachât l'horizon,

nous fîmes abattre tous les arbres qui nous en empêchoient la découverte.

On observa par ce moyen la position d'un signal en forme de drapeau blanc, que quelques-uns de nos Messieurs étoient allé faire placer sur la montagne de Nole, que l'on nous dit être à quatre lieues de là, & de laquelle on nous assura que l'on voyoit une partie de la Lorraine & de l'Alsace; car comme il nous fut impossible de découvrir du lieu où nous étions, la Tour du Haut-Bar qui étoit cachée par plusieurs chaines de montagnes, il nous paroissoit nécessaire de déterminer la situation de quelque autre objet pour continuer nos triangles, au cas qu'on ne pût pas trouver quelque expédient pour nous lier avec cette Tour.

Nous ne laissâmes pas de remarquer dans la direction où elle devoit se trouver, un autre Château fort éloigné qui dominoit au-dessus des montagnes qui nous la cachoient; que nous jugeâmes pouvoir servir à notre dessein, & dont nous déterminâmes pour cet effet l'angle de position à l'égard de Strâsbourg. Nous apperçûmes encore ce jour-là vers le coucher du Soleil assez distinctement, le moulin de Brulé de même que le signal de Delme, & y ayant dirigé les Lunettes de deux de nos Quarts-de-cercle, nous attendîmes la nuit pour observer les feux que l'on y devoit faire.

En effet, une heure après le coucher du Soleil, nous commençâmes à appercevoir celui de Delme, & quelques minutes après celui de Brulé, que nous eûmes la satisfaction de

de trouver assez exactement au centre de la Lunette, faisant avec celui de Delme le même angle que nous avons déterminé pendant le jour.

Ils paroissoient à la vue simple à-peu-près de la grandeur de Mars, lorsque cette Planete est en opposition avec le Soleil, où son diametre apparent est d'environ 40 secondes; mais dans la Lunette, ils occupoient à peine, à ce que nous pumes en juger, celle de 12 à 15 secondes, faisant en cela l'effet des Etoiles fixes qui ont leur lumiere en elles-mêmes, sans l'emprunter d'aucun Astre, & dont les Lunettes n'augmentent pas la grandeur apparente dans la même proportion que celle des Planetes.

La largeur du feu que l'on avoit fait au moulin de Brulé, étoit d'environ 10 pieds, d'où il résulte qu'il n'auroit dû paroître à cette distance que sous un angle de 6 à 7 secondes, au-lieu qu'on l'avoit vu de 12 à 15 secondes par la Lunette, qui augmentoit par conséquent deux fois sa grandeur.

Il fit cette nuit, qui étoit entre le 30 & le 31 Août, un très grand froid par un vent de Nord, & nous observâmes le matin le point de l'horizon où le Soleil se leva dans les montagnes Noires, de même que nous l'avions fait la veille à son coucher aux environs de Toul.

La montagne de Thaun qui, comme nous l'avons dit ci-dessus, se distingue des autres du côté de la Lorraine, est encore remarquable par des monumens anciens & bas-reliefs qu'on y trouve en assez grande quantité; ce

qui a donné lieu à la tradition populaire & fabuleuse du pays, que c'est là où Pharamond a été enterré.

Il étoit d'ailleurs important d'en connoître la situation exacte, parce qu'elle se trouve aux confins de trois Etats; qui sont l'Alsace, la Lorraine, & la Principauté de Salms, dont on nous assura qu'on avoit marqué les limites par le moyen d'une borne triangulaire qui a été placée au milieu des Bois.

Comme cette montagne est une des plus élevées des Vosges, nous y observâmes le 28 Août, sur les 2 heures après midi, la hauteur du mercure dans le Barometre, que nous trouvâmes par deux fois de 24 pouces 6 lignes, moins grande de 3 pouces $\frac{1}{2}$ que sa hauteur moyenne au niveau de la Mer; d'où il résulte, suivant les règles que l'on a données dans les Mémoires de l'Académie de 1703 & 1705, que sa hauteur est de 570 toises au-dessus du niveau de la Mer. Nous fîmes aussi le même jour au soir, au village de Ravon-sur-plaine, qui est au pied de cette montagne, à la distance d'environ une lieue de son sommet, l'observation du Barometre, dont nous trouvâmes la hauteur de 25 pouc. 11 lig. ce qui donna l'élévation de ce village sur le niveau de la Mer de 304 toises, moindre de 266 toises que sur le haut de la montagne.

Après avoir terminé nos observations sur la montagne de Thau, quelques-uns de nos Messieurs retournerent à Nole, pour y faire élever un signal que l'on pût appercevoir de loin, & y observer pendant le jour & la nuit, les mêmes objets qu'on avoit apperçus sur le

le Thaun; & nous primes le chemin de Saverne, où nous n'arrivâmes que le sur-lendemain, ayant employé près de deux jours entiers à faire cette traverse qui n'est que de 14 à 15 mille toises en droite ligne.

Nous allâmes le lendemain sur la Tour du Haut-Bar, qui n'en est éloignée que de trois quarts de lieue, dans le dessein d'y observer les signaux de Delme & de Vic, d'où nous l'avions apperçue; mais nous ne pûmes reconnoître que très foiblement celui de Delme, auquel nous dirigeâmes le soir la Lunette de notre Quart-de-cercle, pour y voir le feu que l'on y devoit faire exprès le quatrième jour. Nous observâmes, en attendant, la position de diverses villes ou villages, tant dans la Lorraine, que dans l'Alsace, & nous reconnûmes le même objet que l'on avoit apperçu de Thaun, à peu près dans la direction de notre Tour, & que nous apprîmes être le Château de Lichtemberg, qui en est éloigné d'environ 6 lieues. La nuit étant survenue, nous eûmes encore la satisfaction d'appercevoir le feu qu'on avoit fait au signal de Delme, qui faisoit le fil vertical de la Lunette un peu à gauche en apparence, ce qui pouvoit faire une différence d'environ 5 à 6 secondes dans l'angle que l'on avoit observé pendant le jour, ce que nous crûmes devoir négliger.

On avoit cependant observé du signal de la montagne de Nole, la position de Strasbourg; mais la distance de cette montagne à celle de Thaun que l'on avoit employée pour base, & que les gens du pays jugeoient être

de 4 lieues, à cause de la longueur des circuits qu'il falloit faire pour y arriver, ne s'étoit trouvée que de 3423 toises, & par conséquent trop petite pour déterminer avec précision la situation de Strasbourg.

Il étoit donc à souhaiter de trouver quelque expédient pour pouvoir lier la Tour du Haut-Bar avec le signal de Thaun, avec la même précision que si ces objets avoient pu s'appercevoir l'un de l'autre. Voici celui que l'on employa, & qui eut tout le succès qu'on en pouvoit attendre.

Comme on avoit vu du signal de Thaun, & de la Tour du Haut-Bar, le Château de Lichtenberg, on alla à ce Château pour y observer ces deux objets qui étoient, de même qu'on les avoit jugé, à-peu-près dans la même direction, dont on ne les trouva éloignés que d'un angle de 54 minutes. On auroit pu, par le moyen de la distance de ce Château à la Tour du Haut-Bar, trouver l'angle que l'on auroit dû observer du signal de Thaun entre Strasbourg & cette Tour, si elle avoit été visible de ce signal. Mais pour une plus grande précision, on alla se placer dans l'endroit où le signal de Thaun & la Tour du Haut-Bar paroissent dans la Lunette sous un même vertical; & comme ce lieu étoit dans un fond, où on auroit eu de la peine à appercevoir le signal qu'on y auroit fait, parce qu'il se feroit confondu avec le terrain, comme on l'avoit expérimenté en pareilles occasions, on donna ordre d'y faire un feu qu'on alla observer la nuit suivante, de la Tour du Haut Bar. On eut, par ce moyn, l'angle entre ce feu & la
Tour

Tour de Strasbourg, dont le supplément à deux droits devoit être précisément égal à celui que le signal de Thaun auroit dû faire à l'égard de cette Tour, s'il avoit été visible.

Ainsi par le moyen de divers feux pendant la nuit, nous sommes parvenus à déterminer la situation des objets les plus importans de nos mesures, puisque les trois triangles où on les a employés, comprennent eux seuls plus du tiers de la distance de Strasbourg à Paris.

Après avoir achevé nos observations à Lichtemberg & à Haut-Bar, nous allâmes à Strasbourg où nous observâmes sur la Tour de la Cathédrale, d'où la vue s'étend de côté & d'autre le long du Rhin à une grande distance, & n'est bornée du côté de la France que par les montagnes des Vosges, & du côté de l'Allemagne que par les montagnes Noires.

Cette Tour est fameuse par sa belle structure, & sur-tout par sa hauteur, qui surpasse toutes celles qui ont été construites en Europe, & nous en mesurâmes géométriquement la hauteur qui fut trouvée de 440 pieds au-dessus du pavé de l'Eglise, à-peu-près de même que feu M. Einsenschmid l'avoit autrefois déterminée; ce qui, pour en donner une idée assez juste, surpasse deux fois la hauteur des Tours de Notre-Dame de Paris.

On observa de la platte forme qui est élevée sur le rez-de-chaussée d'environ 30 toises, la hauteur apparente du sommet de la montagne de Thaun de 48' au dessus de l'horizon, ce qui, au moyen de sa distance connue de 22563 toises, donne la hauteur véritable de
cette

cette montagne au-dessus du rez-de-chaussée de l'Eglise, de 438 toises. Ainsi supposant qu'elle fût élevée au dessus du niveau de la Mer de 570 toises, comme on l'a trouvé par l'observation du Barometre, il suit que la pente des eaux du Rhin dont le niveau n'est que de quelques toises plus bas que le rez-de-chaussée de l'Eglise, doit être de près de 130 toises, ce qui est à raison d'une toise par lieue, eu égard aux divers contours que les eaux de cette riviere sont obligées de faire avant que d'arriver à la Mer.

Les triangles principaux que nous avons employés pour prolonger jusqu'à Strasbourg la Perpendiculaire à la Méridienne de Paris, ne sont qu'au nombre de 29, ce qui vient de la grande étendue de la plupart de ces triangles, dont il n'y en a pas un seul où les angles soient fort aigus & moindres de 20 degrés, ce qui contribue beaucoup à leur précision.

Ayant calculé par la suite de nos triangles la distance de Paris à Strasbourg, nous trouvons qu'elle est de 205120 toises en ligne droite, & de 204992 toises mesurées sur la Perpendiculaire à la Méridienne de Paris, dont Strasbourg est éloigné de 7326 toises vers le Midi.

Cette Perpendiculaire traverse le Rhin entre Strasbourg & le Fort-Louis, dont l'on jugea à propos de déterminer la situation que l'on a trouvée à la distance de 215600 toises, mesurée sur la Perpendiculaire à la Méridienne, dont le Fort-Louis est éloigné de 6000 toises vers le Nord.

On déterminâ enfin de cette dernière ville, de même que de la Tour de Strasbourg, un grand nombre d'objets remarquables, tant en deçà qu'au-delà du Rhin, tels que Offembourg où étoit alors campée notre Armée, la Tour de Bihel, &c. Cette Tour qui est sur une montagne dans une belle exposition, s'est trouvée 2442 toises au Nord de la Perpendiculaire, à la distance de Paris de 221312 toises, & c'est le terme le plus oriental de nos mesures.

Nous les avons terminées l'année dernière du côté de l'Occident à la Tour de Frehel sur les côtes de Bretagne, qui étoit éloignée de Paris de 175850 toises. Ainsi la Perpendiculaire à la Méridienne de Paris occupe de l'Orient vers l'Occident près de 400 mille toises, que nous avons mesurées dans l'espace de deux Campagnes.

Il ne restoit plus pour l'entière perfection de nos opérations, que de trouver un terrain uni où l'on pût mesurer une base, & comparer son étendue avec celle qui résultoit de la suite de nos triangles.

Nous allâmes pour cet effet avec M. Herstein, célèbre Mathématicien dans l'Université de Strasbourg & Professeur Royal de l'Ecole d'Artillerie, dans une plaine qu'il nous avoit indiquée, où après l'avoir parcourue en divers sens, nous jugeâmes qu'on pouvoit mesurer une base depuis le Clocher de la Wantznaw jusqu'à la jonction de deux grands chemins qui vont de Strasbourg l'un à Haguenau, & l'autre au Fort-Louis. Ayant donc fait dresser un signal dans ce dernier terme,

pour

pour pouvoir le reconnoître du Clocher, nous plaçames divers piquets dans la direction commune de ces deux objets, & nous mesurames de la maniere qui a été pratiquée en pareille occasion, la distance entre les deux termes de la base, ayant fait la réduction nécessaire à cause d'une maison qui empêchoit de mesurer directement la distance du Clocher de la Wantznaw au piquet qui en étoit le plus proche.

Cette base s'est trouvée de 3341 toises 3 pieds, & ayant observé à ses extrémités divers objets compris dans nos triangles, tels que le Clocher de Strasbourg, la Tour du Haut-Bar & le signal de Thaun, elle fut déterminée de 3342 toises 2 pieds, avec une différence seulement de 5 pieds de la mesure actuelle.

Comme cette base peut être très utile pour lever la Carte de l'Alsace avec précision, nous y fîmes placer un poteau de bois de chêne de 9 pieds de hauteur, avec les Armes du Roi & une inscription au-dessous, où est marquée sa distance au centre du Clocher de la Wantznaw. Pour en conserver la mémoire, M. le Maréchal du Bourg a bien voulu faire poser une borne de pierre de 5 à 6 pieds auprès de ce poteau, & donner les ordres nécessaires pour que les Communautés des environs aient soin de l'entretenir dans l'état où nous l'avons placé.

Pendant que nous étions occupés aux opérations géométriques, nous ne perdions point de vue les observations astronomiques qu'il étoit à souhaiter de pouvoir faire vers les extré-

trémities orientales de la France, pour les comparer aux géométriques, & connoître le rapport des degrés de longitude à ceux de latitude.

Ce fut dans ce dessein que lorsque nous fumes à Saverne, je pris les devans pour aller à Strasbourg y observer quelques Eclipses des Satellites de Jupiter qui devoient encore arriver avant la conjonction de cette Planete avec le Soliel, dont elle approchoit. Mais le tems qui depuis notre départ avoit été le plus souvent couvert & pluvieux, comme on n'a eu que trop d'occasions de le remarquer par l'intérêt que l'on prenoit aux affaires publiques *, ne nous permit pas de faire ces observations, du moins avec l'exactitude requise.

Au défaut de ces observations, nous avons celles que feu M. Einsenschmid célèbre Mathématicien de Strasbourg y a faites, & que M. Herteinstein son digne successeur nous a communiquées, telles qu'il les avoit déjà envoyées à M. de Mairan pendant notre voyage, pour en faire part à l'Académie.

Ces observations ont même l'avantage sur celles que nous aurions pu faire, que l'on ne peut pas les soupçonner d'avoir été accommodées à aucune hypothese.

Entre ces observations, il y en a plusieurs d'Eclipses du Soleil, de la Lune & des Satellites de Jupiter. Nous nous arrêterons à ces dernières, parce qu'on les juge plus propres pour déterminer avec exactitude la différen-

ce

* Le Siege de Philisbourg.

ce des méridiens des lieux où elles ont été faites.

La premiere est une émerſion du premier Satellite de Jupiter du 28 Août 1699, qui comparée à celle qui avoit été faite par M. de la Hire & mon pere, donne ſuivant celle-ci, la difference des méridiens entre Strasbourg & Paris de 22' 18" d'heure, & ſuivant l'autre de 21' 56".

La ſeconde eſt auſſi une émerſion du premier Satellite de Jupiter du 25 Septembre de l'année 1700, qui étant comparée à celle qui avoit été faite à Paris par M. de la Hire, donne cette difference de 22' 8".

Quoique M. Einſenſchmid paroiffe préférer la difference des méridiens qui réſulte de l'observation de mon pere & la détermine de 22' 20", ainſi qu'il s'en explique dans ces termes: *Cum differentia meridianorum inter Parisios & Argentoratum mihi fere pro certo explorata ſit 22' 20"*; cependant pour ne pas donner la préférence aux observations qui ſemblent favoriſer le ſentiment que j'ai ſuivi juſqu'à préſent ſur la figure de la Terre, j'ai cru devoir prendre un milieu entre ces différentes déterminations, & établir cette difference de 22' 11" d'heure ou 5 degrés 32' 45", ce qui s'accorde mieux à ce qui réſulte d'une autre observation de l'émerſion du premier Satellite de Jupiter obſervée à Srasbourg & à Nuremberg le 17 Août de l'année 1700, de laquelle M. Einſenſchmid ſe ſert pour conclurre la difference des méridiens entre Paris & Strasbourg de 22' 10" d'heure, ou de 5^d 32' 30".

Calculant la longueur du parallele de Strasbourg comprise entre cette ville & la Méridienne de Paris, on la trouve de 205100 toises, ayant égard à la réduction qu'il convient de faire à cause des montagnes sur lesquelles on a fait les observations. Divisant cette distance par $5^{\text{d}} 32' 45''$, on aura la longueur de chaque degré sur le parallele de Strasbourg de 37066 toises. Calculant dans l'hypothese de la Terre sphérique, le degré de longitude pour la latitude de $48^{\text{d}} 35'$ qui est à peu près celle de Strasbourg, on le trouve de 37745 toises, plus grand de 680 toises qu'on ne l'a déterminé par les opérations géométriques comparées aux astronomiques. Ainsi suivant ces observations, la grandeur du degré de longitude est plus petite que si l'on suppose la Terre sphérique.

On auroit trouvé la grandeur du degré encore plus petite de 300 toises que par la comparaison précédente, si l'on avoit supposé la difference des méridiens entre Strasbourg & Paris, telle que l'a établie M. Einsenschmid, ce qui s'accorde avec assez de précision à celle que l'on a trouvée du côté de l'Occident par les observations faites à Paris & à Saint-Malo; mais nous nous arrêtons à la détermination précédente, parce que dans les observations qui paroissent avoir été faites avec une égale précision, il est toujours plus sûr de prendre une moyenne entre elles, que de donner la préférence à celles qui s'accordent mieux à nos hypotheses.

Nous avons remarqué dans le Mémoire précédent, que supposant la Terre de figure
el-

elliptique, dont le plus grand axe passe par les Poles, telle qu'elle résulteroit des observations de la Méridienne, les degrés de longitude doivent être plus petits que dans l'hypothèse sphérique. Ainsi toutes ces observations faites, tant du Midi vers le Nord, que de l'Orient vers l'Occident de Paris, s'accordent à donner à la Terre la figure d'une ellipse allongée vers les Poles; ce qui, si on ne le regarde pas comme une preuve complète, doit du moins être un grand préjugé en faveur de cette opinion. Car quand même on voudroit choisir entre les observations que j'ai rapportées, celle qui paroît lui être le moins favorable, & suivant laquelle la différence des méridiens n'est que de $21' 56''$, ou $5^d 29'$, on aura toujours la grandeur du degré de longitude sur le parallèle de Strasbourg, plus petite de 340 toises que dans l'hypothèse sphérique, ce qui doit être très sensible sur toute la circonférence de ce parallèle.

Nous avons aussi fait à Strasbourg un assez grand nombre d'observations de hauteurs méridiennes, du Soleil & d'Etoiles fixes, qui toutes, à la réserve d'une seule, concourent à donner la distance entre le parallèle de Paris & la Perpendiculaire à la Méridienne, plus grande qu'elle ne le devroit être suivant l'hypothèse sphérique, & semblent favoriser le sentiment de la Terre allongée vers les Poles. Mais comme ces observations ne s'accordent pas à la hauteur du Pole de Strasbourg, déterminée par M. Einsenschmid, nous n'avons pas cru devoir asseoir aucun

jugé-

jugement sur nos propres observations, jusqu'à ce que cette hauteur ait été déterminée plus exactement dans l'Observatoire que les Magistrats de Strasbourg font construire présentement sur une Tour de la ville qui y avoit été déjà destinée.

Après avoir achevé nos observations à Strasbourg & aux environs, nous avons pris la route de Metz, pour établir la position de cette ville & de diverses autres qui étoient au Nord de la Perpendiculaire, & dont nous avons observé quelque direction, en formant nos triangles; & nous avons terminé nos opérations à Reims, après avoir déterminé la position de cette ville & de la plus grande partie de celles qui sont de côté & d'autre de la Perpendiculaire, même à une assez grande distance, de même que des bourgs, villages & autres objets qui peuvent servir à lever avec précision les Cartes particulières des Provinces de Brie, Champagne, Lorraine & Alsace, que nous avons traversées dans le cours de notre voyage.

~~~~~

*R E M A R Q U E S*  
*S U R L E S M O N S T R E S.*  
*S E C O N D E P A R T I E.*

Par M. W I N S L O W.

**D**ANS la première Partie de ces Remarques je m'étois borné aux Monstres simples, c'est-à-dire, à ceux qui le sont simplement

ment par conformation extraordinaire, ou par défaut. Je vais considérer dans la seconde Partie les Monstres composés, c'est à-dire, ceux qui sont doubles, triples, &c. soit en total, soit par portions, comme par quelque organe considérable, viscere, &c. Je commencerai par les deux exemples qui ont donné occasion à ces Remarques, & dont je n'ai pas achevé l'examen dans la premiere Partie, pour des raisons y alléguées; savoir, l'exemple du Faon à deux têtes, & celui de la Fille à deux ventres & quatre extrémités inférieures. Immédiatement après ces deux exemples, je produirai les deux, qui, dans les Mémoires de l'Académie, ont été spécialement employés pour soutenir les deux differens systêmes; savoir celui de M. Duverney de 1706, & celui de M. Lémery de 1724. Après quoi je rapporterai en abrégé, suivant l'ordre de la premiere Partie, les autres exemples qui se trouvent dans l'Histoire & les Mémoires de l'Académie, &c.

## I.

*Examen anatomique du Faon à deux têtes, envoyé par ordre du Roi, dont l'extérieur a été décrit dans la premiere Partie de mes Remarques sur les Monstres.*

Il suffit ici de rapporter succinctement de la premiere Partie de ces Remarques, que les deux têtes étoient posées sur un seul col; que l'une des têtes étoit située presque dans l'attitude ordinaire en haut; que l'autre étoit placée

placée latéralement, étant jointe par la partie latérale inférieure du côté droit de son occiput à la partie latérale inférieure du côté gauche de l'occiput de la tête supérieure; que le col étoit plus court qu'à l'ordinaire & un peu incliné à droite; que les deux têtes étoient jointes par dehors, jusques vers le milieu des joues voisines; que les mâchoires inférieures des deux têtes étoient également mobiles, & formoient avec les mâchoires supérieures deux bouches, dont chacune avoit une langue à l'ordinaire.

J'ai averti dans la premiere Partie, à la fin de la description de l'extérieur de cet animal, que je m'étois contenté d'en examiner les têtes en particulier par l'Anatomie, & de m'attacher principalement dans cet examen à ce que les parties communes aux deux têtes présentoiént de plus singulier. Je remis alors pour la seconde Partie de ces Remarques le détail de la dissection, parce que j'en avois destiné la premiere uniquement pour les Monstres simples, & la seconde pour les Monstres composés.

Avant la dissection je fis d'abord dessiner le Faon entier, & ensuite ses deux têtes à part dans des attitudes différentes, comme on les voit dans les trois premieres Figures.

### FIGURE I.

Le Faon entier avec ses deux Têtes, vu du côté gauche de l'animal.

*a*, la Tête supérieure, ou droite.

*b*, la Tête latérale, ou gauche.

*c*, l'Oreille droite de la Tête supérieure.

*Mém.* 1734.

*E c*

*d*, l'O.

*d*, l'Oreille gauche de la Tête latérale.  
*e*, l'Oreille commune aux deux Têtes.  
*f, f, f*, la livrée du Faon.

## FIGURE II.

Le Col avec les deux Têtes, vu du côté droit.

*a, b, c, d, e*, comme dans la Fig. I.

## FIGURE III.

Les deux Têtes vues en plein, pour montrer le fond double de l'Oreille commune.

*a, b, c, d, e*, comme dans la Fig. I.

*f*, la ligne faillante qui partage le creux de cette Oreille en deux fonds.

*g, g*, la direction de chaque fond d'Oreilles vers les Têtes.

• Après avoir fait dessiner l'extérieur du Faon, j'en ouvris le bas-ventre où je ne trouvai rien de singulier. Les estomacs que ces animaux ont de commun avec les ruminans étoient vuides, de même que les intestins grêles; les gros intestins étoient très remplis; le foye, la rate, les reins, la vessie, & l'uterus (car c'étoit une femelle) n'avoient rien d'extraordinaire.

La poitrine & les parties y renfermées étoient aussi dans l'état naturel d'un seul animal, même celles qui répondoient aux deux têtes; savoir, la trachée-artère & l'œsophage. Ces deux tuyaux gardoient leur structure ordinaire tout le long du col. Il n'y avoit qu'un larynx & un pharynx, placés l'un devant l'autre,



tre, comme on les trouve communément dans un seul animal.

Le col étoit composé de plusieurs vertèbres, toutes simples, même la première, quoiqu'elle fût articulée avec les deux têtes. J'avois fait observer dans la première Partie de ces Remarques, que le col étoit court, plus courbé qu'à l'ordinaire, & un peu incliné; c'étoit à l'extérieur qu'il paroissoit ainsi: mais l'ayant disséqué, je trouvai que la disposition des vertèbres en étoit la cause, étant arrangées un peu en S romain, par deux courbures en contre-sens, dont l'une dépendoit en particulier de la quatrième vertèbre, qui étoit comme écrasée entre la troisième & la cinquième, de sorte que les vertèbres représentoient en cet endroit plutôt un pli ou angle, qu'une courbure en arc.

La moëlle renfermée dans le canal de ces vertèbres depuis la première inclusivement jusqu'à la dernière, n'étoit que simple comme à l'ordinaire, & sans aucune marque de composition extraordinaire.

## FIGURE IV.

Voulant profiter du tems ordonné pour la dissection, je ne fis pas grande attention aux muscles que les deux têtes avoient communs avec le col unique; & ayant trouvé à-peu-près dans l'état ordinaire les muscles propres de ce col, de même que les muscles sterno-thyroïdiens & sterno-hyoïdiens, comme aussi les petits muscles propres du larynx, & les différentes portions charnues du pharynx; je

détachai de ces deux têtes les mâchoires inférieures avec les deux langues, le larynx, & le pharynx, conjointement ensemble.\*

Je plaçai ensuite ces parties de manière que les mentons (*a, b,*) avec les langues (*c, d,*) étoient en-haut, & que les grosses branches des mâchoires inférieures (*e, f, g, h,*) de même que la trachée-artère, avec l'œsophage, étoient en-bas. J'examinai en cette attitude l'un & l'autre côté des deux mâchoires, & l'un & l'autre côté des parties qui y répondoient, en commençant par le côté qui regardoit le devant du col, & qui est représenté dans cette Figure IV, dont (*a, b,*) marquent le menton & la langue de la tête droite, (*b, d,*) le menton avec la langue de la tête gauche, (*8,*) la trachée-artère, & (*9,*) l'œsophage.

J'y découvris d'abord la base d'un seul os hyoïde (*i, j,*), ses deux cornes (*k, k,*); les deux grandes appendices qui se trouvent ordinairement dans ces sortes d'animaux, comme dans le Mouton, &c. Je découvris le devant d'un seul pharynx (*1, 2, 3, 4,*); le devant d'un seul larynx (*5, 5,*), dont je ne marque ici que les muscles crico-thyroïdiens (*6, 6,*), & les muscles thyro-hyoïdiens (*7, 7,*).

\* Cette base de l'os hyoïde, dont la forme & la situation devant le larynx étoient comme à l'ordinaire, portoit deux muscles basioglosses (*p, q,*), l'un (*p*) pour le côté gauche de la langue supérieure ou droite, & l'autre (*q*) pour la langue latérale ou gauche. Je n'ai pas trouvé les deux autres muscles basioglosses à l'opposite de ceux-ci; mais j'y trouvai en.



entre les deux langues près de leurs bases ou racines un plan de fibres charnues transversalement courbes, & sans aucune apparence d'attache à d'autres parties. Ce plan musculaire, exprimé dans la Fig. IV. par ( $\alpha$ ) & dans la Fig. VI. par ( $k$ ), m'a paru tenir lieu des basioglosses que je n'avois pas trouvés, & qui devoient répondre aux basioglosses ( $p$ ,  $q$ ,) de la Fig. IV.

Attenant le milieu de la partie antérieure de la même base de l'os hyoïde ( $i, i$ ,) étoit posée verticalement une petite cloison cartilagineuse ( $w$ ) qui donnoit attache à quatre muscles genio-hyoïdiens ( $r, r, s, s$ ,), deux pour chaque tête, & me parut par conséquent tenir lieu d'un autre os hyoïde. Le plan charnu ou musculaire ( $\alpha$ ), dont je viens de parler, y étoit comme collé, mais sans apparence de vraie attache.

On voit dans la Figure, au côté de cette cloison cartilagineuse, un petit vaisseau tronqué ( $\Delta$ ) passer par le dessus de la base de l'os hyoïde en se recourbant. C'est l'extrémité supérieure d'une artère carotide extraordinaire, dont il sera parlé ci-après, & dont la continuation est interrompue dans la Figure, pour ne pas dérober à la vue ce qu'elle auroit caché par son trajet.

Des deux grandes appendices hyoïdiennes ( $l, m$ ) chacune portoit une espèce de muscle kerato-glosse. L'appendice du côté droit ( $l$ ) portoit le muscle kerato-glosse droit ( $n$ ) de la tête supérieure, & l'appendice du côté gauche portoit le muscle kerato-glosse ( $o$ ) de la tête latérale.

(z, z,) marquent une petite portion antérieure d'un muscle mylo-hyoïdien fort singulier, dont la plus grande portion a été emportée, pour ne pas cacher au Dessinateur les parties qui en auroient été couvertes. Ce muscle mylo-hyoïdien appartenoit au grand os hyoïde (i, i, k, k,) & les attaches latérales, au-lieu d'être aux portions latérales ou branches de la mâchoire inférieure d'une seule tête, étoient d'un côté à la branche droite de la mâchoire de la tête supérieure, & de l'autre côté à la branche gauche de la mâchoire inférieure de la tête latérale. Je n'ai pas trouvé le mylo-hyoïdien des côtés opposés; mais au lieu de cela je trouvais un plan large & mince de fibres charnues qui alloient d'une mâchoire à l'autre, comme on verra ci-après dans la Figure VI.

Les deux corps olivaires (x, y,) qui paroissent immédiatement au-dessous de la portion du muscle mylo-hyoïdien (z, z,) sont les glandes sublinguales de l'une & de l'autre langue. Elles se touchoient immédiatement par la moitié postérieure de leur volume, & même y paroissoient en partie confondues ensemble. Elles m'ont paru chacune tenir lieu de deux pour chaque langue, n'en ayant pas trouvé d'autres; & c'est peut-être de cela que dépendoit la grosseur extraordinaire de ces deux-ci.

Il y avoit quatre glandes maxillaires (t, t, u, u,) deux pour chaque tête, comme à l'ordinaire. Deux de ces glandes, savoir (t, t,) sont ici représentées hors de situation, & les deux autres (u, u,) dans leur situation naturelle.

FIGURE

## FIGURE V.

Il n'y avoit que trois artères carotides pour les deux têtes, dont deux étoient latérales, & une étoit mitoyenne & antérieure. Les deux latérales (11, 12,) étoient placées à-peu-près à l'ordinaire le long de chaque côté du col. La carotide du côté droit alloit au côté droit de la tête supérieure, & la carotide du côté gauche alloit au côté gauche de la tête latérale. La carotide mitoyenne ou antérieure (13) montoit par une route extraordinaire directement devant la trachée-artère & le larynx, & se glissoit ensuite entre les bases ou racines des deux langues à côté de la petite cloison cartilagineuse (*w*) de la Figure IV. jusques sous la rencontre ou union des deux têtes, où son extrémité ( $\Delta$ ) se divisoit pour le côté gauche de la tête supérieure, & pour le côté droit de la tête latérale. Ces trois carotides partoient d'un tronc commun fort court (10).

## FIGURE VI.

Cette Figure marque les parties du côté opposé au côté représenté dans la Figure IV, c'est à dire, du côté de la proximité des deux mâchoires inférieures. Les mentons (*a, b,*) avec les langues (*c, d,*) sont ici tournés en haut, comme dans la Fig. IV, & les branches (*e, f, g, h,*) des deux mâchoires inférieures sont tournées en bas, mais à contre-sens de la Figure IV, par rapport à leurs

E c 4.

par-

parties latérales. La branche (*f*) est du côté gauche de la tête supérieure ou droite. La branche (*h*) est du côté droit de la tête latérale ou gauche. Ces deux branches (*f, h,*) étoient bien près l'une de l'autre, principalement en arrière. La branche (*e*) est du côté droit de la tête supérieure ou droite, & la branche (*g*) est du côté gauche de la tête latérale ou gauche. J'avois coupé & emporté la grosse portion ou moitié postérieure des branches (*f, h,*) pour mettre à découvert les parties que je vais décrire.

Les fibres transversales, & en partie un peu courbes (*i*), qu'on voit ici entre les portions des branches coupées (*f, h,*) & qui sont attachées par leurs extrémités à l'une & à l'autre de ces branches, sont celles que j'ai dit dans l'explication de la Figure IV, avoir trouvées au lieu d'un muscle mylo-hyoïdien, qui devoit répondre au mylo-hyoïdien (*z, z,*) de cette Figure IV.

Ces fibres (*i*) avoient cela de particulier, qu'elles paroïssent être uniquement attachées aux mâchoires, & d'être réciproquement d'une continuité entière, sans la moindre apparence de tendon mitoyen; elles étoient plus courtes que celles du mylo-hyoïdien (*z, z,*) de la Fig. IV, & cela à cause de la proximité des deux mâchoires en cet endroit; ce plan charnu n'étant attaché qu'aux seules mâchoires, ne pourroit pas être nommé *mylo-hyoïdien*, mais simplement *myloïdien*.

Les fibres courbées en contre-sens (*k*) que l'on voit immédiatement au-dessous de celles-là, sont les mêmes qui sont exprimées dans la

la Figure IV. par ( $a$ ), & dont j'ai dit dans l'explication de cette Figure IV. qu'elles ne paroissent pas attachées à la petite cloison cartilagineuse ( $w$ ) qui paroist tenir lieu d'os-hyoïde.

Sous la coupe des branches maxillaires coupées ( $b, f,$ ) entre les racines ou bases des deux langues, on voit descendre deux muscles ( $l, m,$ ) l'un du côté gauche de la tête supérieure, & l'autre du côté droit de la tête latérale, & s'unir comme en pointe à l'extrémité d'un os fort délié ( $n, o,$ ).

Cet os délié ( $n, o,$ ) m'a paru être une es-  
pece d'appendice hyoïdienne, & tenir lieu  
des deux grandes appendices qui devoient être  
pareilles à celles de l'autre côté ( $p, p,$ ). Les  
deux muscles ( $l, m,$ ) sont pareils aux deux  
muscles keratoglosses de ces grandes appen-  
dices, excepté qu'ils sont joints ensemble à  
une seule appendice.

Il faut observer que cet os délié qu'on peut  
ici appeller *l'appendice hyoïdienne commune*,  
n'étoit pas collé ou attaché immédiatement  
au pharynx, comme la représentation optique  
de la Figure le pourroit faire penser. Il en  
étoit écarté à-peu-près de la même façon que  
les appendices ( $p, q,$ ), ou appendices  
hyoïdiennes ordinaires; & par sa situation sym-  
étrique il répondoit à l'endroit de l'union  
des deux têtes.

A la racine ou base de chaque langue, on  
voit une fossette ( $r, r,$ ) qui est le conduit  
de chaque bouche à un seul pharynx com-  
mun. Les deux grands trous ( $s, s,$ ) sont  
des ouvertures, par lesquelles ce pharynx

commun communique avec le fond des narines de chaque tête. Le reste (*q, q, q, q,*) qui est après ces ouvertures, est le corps du pharynx vu par derrière. L'œsophage (*t*) & la trachée (*u*) sont aussi représentés ici par leurs faces postérieures. Le tendon miroyen des fibres charnues du pharynx est, pour la plus grande partie, caché dans cette Figure par l'appendice hyoïdienne commune (*u, o,*) Le dedans de la cavité de ce pharynx étoit tout simple, & l'épiglotte, la glotte, &c. y étoient aussi dans la conformation ordinaire d'un seul animal.

## FIGURE V-II.

Les deux crânes unis ensemble, vus de front en plein, dans la même attitude que j'ai donnée aux deux têtes entières dans la Figure III.

Ces crânes étoient unis ensemble de manière que le trou auditif externe du côté gauche de la tête supérieure touchoit de près le trou auditif externe du côté droit de la tête latérale; les apophyses pierreuses de ces côtés se touchoient aussi l'une l'autre tout au long. Les parties latérales de ces mêmes côtés des deux os occipitaux y manquoient.

*a*, le Crâne supérieur.

*b*, le Crâne latéral.

*c*, l'Os occipital supérieur.

*d*, l'Os occipital latéral.

*e, f*, l'union des deux Occiputs.

*g, g*, l'union des deux Os temporaux, & l'adossement ou la proximité des deux.



deux conduits auditifs externes, auxquels répondoient les deux fonds de l'oreille commune, représentés dans la Fig. III.

*h*, l'Orbite gauche du Crâne supérieur.  
*i*, l'Orbite droite du Crâne latéral.

### FIGURE VIII.

Les mêmes deux crânes vus par leurs bases, mais dans une attitude opposée à celle de la Fig. VII.

Les parties latérales de ces côtés des os occipitaux, c'est-à-dire, la partie latérale droite de l'os occipital de la tête supérieure, & la partie latérale gauche de l'os occipital de la tête latérale, formoient ensemble un seul grand trou occipital, comme à l'ordinaire; de sorte qu'au bord de ce grand trou, il n'y avoit que deux apophyses condyloïdes, comme dans un sujet simple. L'apophyse condyloïde droite appartenoit à l'occiput de la tête supérieure, & l'apophyse condyloïde gauche appartenoit à l'occiput de la tête latérale. Ces deux apophyses condyloïdes étoient articulées avec la première vertèbre du col, de la même manière & avec la même simplicité que les apophyses condyloïdes d'un seul os occipital ordinaire sont articulées avec la seule première vertèbre d'un simple sujet.

Les deux os occipitaux n'avoient qu'une seule base, qui se terminoit en deux allongemens basilaires, dont l'un répondoit à l'os sphénoïde d'une tête, & l'autre à l'os sphénoïde de l'autre tête.

*Explication de la FIGURE IX.*

- a*, le Crâne supérieur.  
*b*, le Crâne latéral.  
*c*, l'Os occipital du Crâne supérieur.  
*d*, l'Os occipital du Crâne inférieur.  
*e, f*, l'union des deux Occiputs.  
*g, g*, l'union des deux Os des Temples,  
 & l'adossement des deux Os pé-  
 treux, dont l'un est le gauche du  
 Crâne supérieur, & l'autre est  
 le droit du Crâne latéral.  
*h*, l'Orbite gauche du Crâne supérieur.  
*i*, l'Orbite droite du Crâne latéral.  
*k*, l'Orbite droite du Crâne supérieur.  
*l*, l'Orbite gauche du Crâne latéral.  
*m*, l'Apophyse pierreuse droite du  
 Crâne supérieur.  
*n*, l'Apophyse pierreuse gauche du  
 Crâne latéral.  
*o*, le grand trou occipital commun  
 des deux Crânes.  
*p*, l'Apophyse condyloïde droite de  
 l'Occiput supérieur.  
*q*, l'Apophyse condyloïde gauche de  
 l'Occiput latéral.  
*r, r*, la Base commune des deux Occi-  
 puts.  
*s*, l'allongement occipital ou basilaire  
 du Crâne supérieur.  
*t*, l'allongement occipital ou basilaire  
 du Crâne latéral.  
*u*, l'os sphénoïde du Crâne supérieur.  
*x*, l'Os sphénoïde du Crâne latéral.

Rc.



## REFLEXIONS.

Pour juger que la formation de ce Faon à deux têtes puisse être rapportée au système des Monstres par accident ou confusion, il faudroit s'imaginer, ou que deux germes entiers se fussent trouvés directement l'un à côté de l'autre; & réciproquement eussent été comprimés de manière, qu'à l'exception des têtes, les deux moitiés voisines du reste de leurs corps eussent été tout-à-fait détruites; qu'à leur place les deux moitiés opposites se fussent unies pour composer ensemble de nouveau un seul tronc ou corps entier avec les extrémités à l'ordinaire; & que les deux têtes qui seroient restées presque entières, se fussent accommodées sur un seul col: ou il faudroit s'imaginer que par une telle rencontre & par une telle compression, tout le corps de l'un, excepté la tête, eût été détruit, & que cette tête échappée eût été unie à la tête du corps entier.

Ni l'une ni l'autre de ces deux idées me paroissent s'accorder avec les observations que je viens de rapporter sur la dissection de cet animal. La première idée, savoir celle de la confusion des moitiés opposées par la destruction des moitiés voisines, pourroit avoir quelque vraisemblance quant à l'extérieur du corps, eu égard au rapport réciproque & symétrique des deux côtés opposés. Mais pour peu qu'on en considère bien, & avec une exacte connoissance anatomique, les parties internes, sur-tout celles qui sont solitai-

res & sans symmétrie ; celles qui sont creues & remplies de fluide , & encore plus celles qui sont mobiles & plus ou moins flottantes , comme l'œsophage , le cœur , les intestins ; cette idée paroîtra , par les raisons détaillées dans la premiere Partie de mes Remarques , non seulement insoutenable , mais elle paroîtra outre cela capable d'induire à l'erreur , en ce qu'elle pourroit donner lieu de s'imaginer qu'un tel ou tel corps entier , soit d'homme , soit d'autre animal , quoiqu'un corps simple en apparence , a été originairement composé de deux ; car ce qu'on s'imagineroit être arrivé à la plus grande partie de deux corps , comme dans ce Faon , pourroit de même arriver à deux corps en total , puisqu'on trouve aussi des Monstres avec une seule tête sur deux troncs bien conformés séparément l'un de l'autre , comme on en trouve avec deux têtes sur un tronc. La seconde idée , selon laquelle , par la rencontre & par la compression réciproque de deux germes , l'un en seroit resté tout-à-fait entier , pendant que l'autre seroit détruit jusqu'à la seule tête qui seroit unie à la tête du corps entier ; cette idée , dis-je , est aussi insoutenable que la précédente : car , par exemple , dans le cas présent , elle ne s'accorde nullement avec la disposition & la distribution particuliere des trois arteres carotides de ce Faon. Le col étoit simple dans sa structure , comme l'est ordinairement celui d'un seul animal ; les vertebres , la moëlle épiniere , la trachée , l'œsophage , la plus grande portion du larynx & du pharynx , toutes ces parties y étoient dans leur

leur simple conformation ordinaire. Cependant les deux carotides latérales qui montoient sur les côtés d'un seul col comme à l'ordinaire, ne vont pas comme à l'ordinaire toutes deux à une seule tête, mais au lieu de cela, pendant que l'une passe sur le côté d'une tête qu'on supposeroit appartenir originairement au corps entier, l'autre passe sur le côté opposé de la tête qu'on supposeroit être le reste d'un autre corps détruit; & au lieu que la tête accessoire auroit quelques ramifications de la carotide voisine de la tête du corps entier, il se trouve ici une carotide mitoyenne, qui après un passage extraordinaire pardevant la trachée & le larynx, se partage pour les deux têtes, comme si cette carotide mitoyenne & extraordinaire avoit été formée par l'union ou confusion de la carotide droite d'un col, & de la carotide gauche d'un autre col, ce que dans le col de notre Faon la simple structure des autres parties de ce même col exposées ci-dessus, paroît démentir, sur-tout celle des vertèbres, celle de la trachée, celle de l'œsophage, & celle de leurs dépendances.

Ces deux idées ne s'accordent pas non plus dans le cas présent avec la structure de la base commune des deux os occipitaux, ni avec la formation du grand trou occipital & des apophyses condyloïdes voisines, ni avec l'articulation de ce double occiput sur une seule vertèbre simple. Le système général de confusion porteroit d'abord ceux qui ne sont pas assez au fait de la structure, à penser & à dire que les os occipitaux  
des

des deux crânes s'étant rencontrés obliquement l'un à côté de l'autre, les portions voisines de ces deux os ont été détruites de manière que la moitié du grand trou occipital d'un crâne avec l'apophyse condyloïde de la même moitié, & la moitié réciproque du grand trou occipital de l'autre crâne avec son apophyse condyloïde, ont formé ensemble par leur union accidentelle un seul grand trou occipital avec deux apophyses condyloïdes, comme à l'ordinaire d'un seul os occipital & d'un crâne simple.

Mais le détour extraordinaire qu'auroient fait, selon cette idée, les portions latérales de l'un & de l'autre crâne, pour former un seul grand trou occipital semblable à celui d'un seul crâne ordinaire, restera toujours extrêmement difficile à expliquer selon le système des accidens, sur-tout la correspondance exacte du grand trou occipital de ces deux têtes avec le grand trou d'une simple vertebre, & d'expliquer la connexion articulaire des condyles opposés de deux differens os occipitaux avec les cavités de cette seule vertebre.

Car il faudroit pour cela; ou s'imaginer que toute la longueur du corps de ce Faon eût été formée par les moitiés latérales de deux corps, ce qui paroît tout-à-fait impossible pour les raisons exposées ci-devant; ou il faudroit s'imaginer que, par exemple, le condyle droit de la tête supérieure de ce Faon eût resté comme à l'ordinaire articulé avec la cavité articulaire droite de la seule premiere vertebre, & que la cavité articulaire gauche de

de cette même vertebre eût resté vuide, sans être endommagée par la destruction du condyle gauche de la même tête supérieure, sans l'être par celle du condyle droit de la tête latérale, & par celle de leurs ligamens, &c. & que le condyle gauche de la tête latérale ayant quitté sa connexion avec la vertebre détruite du corps perdu, eût été articulé de nouveau avec la cavité gauche de la même première vertebre du corps restant. Mais je répète encore ici, que pour peu qu'on soit au fait de la vraie structure de ces parties, & qu'on se donne la peine de bien comparer en détail l'extraordinaire avec l'ordinaire, on sentira une extrême difficulté d'expliquer par le système des accidens la connexion & l'articulation des deux têtes de ce Faon avec la première vertebre de son col.

M. de Reaumur a conservé dans son Cabinet depuis plusieurs années une double tête de Veau, dont il a vu lui-même tout le corps en vie. Elle est pour la plus grande partie semblable à la tête double du Faon du Roi, principalement par rapport à l'occiput commun, au grand trou, aux condyles, à la base commune de l'occiput, & à la bifurcation de cette base en deux allongemens pour les os sphénoïdes des deux têtes, comme on le peut voir Fig. X. & XI.

*Explication de la FIGURE X. qui représente  
les Crânes de la double Tête de Veau,  
vue de front.*

*a, a,* l'union des deux Crânes.

*b, b,* les Orbites voisines.

*c, c,* le

*c, c,* le bord des Orbites de l'autre côté.  
*d, d,* l'endroit de l'union, où la partie latérale des Os occipitaux, une grande partie des Os temporaux voisins, avec leurs apophyses pierreuses, &c. manquoient tout-à-fait.

*e, e,* les Zygoma.

*Explication de la FIGURE XI. qui représente la même double Tête renversée. & vue par ses bases.*

*a,* le grand Trou occipital commun aux deux Crânes.

*b, b,* l'union des deux Os occipitaux.

*c, c,* les Apophyses condyloïdes, dont l'une est la droite d'une Tête, & l'autre la gauche de l'autre Tête.

*d, d,* les Apophyses pierreuses, l'une d'un côté, & l'autre de l'autre côté de chaque Tête.

*e,* la base commune des deux Os occipitaux.

*f,* l'allongement occipital commun de ces Crânes.

*g, g,* les Orbites, &c.

*h, h, h, h,* les fosses nasales.

*i,* l'union de deux Zygoma tronqués.

Je reviens aux autres parties des deux têtes du Faon. La structure, l'arrangement & l'usage des deux os hyoïdes, de même que les attaches de leurs muscles, ne me paroissent pas non plus s'accorder avec le système des accidens. L'os hyoïde (*i, i, k, k,*) qui par

par sa structure & son arrangement, ressemble à un os hyoïde ordinaire d'un seul animal, sert ici à deux têtes, ayant deux differens muscles basioglosses ( $p, q,$ ), un pour la langue de chaque tête. La petite cloison cartilagineuse ( $w,$ ) que j'ai regardée comme un hyoïde imparfait, soutenoit d'un côté les genio-hyoïdiens ( $r, r,$ ) de l'une des têtes, & soutenoit aussi de l'autre côté les genio-hyoïdiens ( $s, s,$ ) de l'autre tête.

On pourroit, selon le système des accidens, s'imaginer que l'os hyoïde ( $i, i, k, k,$ ) a été formé par les moitiés de deux differens os hyoïdes, & que la petite cloison ( $w$ ) a été formée irrégulièrement & imparfaitement par les autres moitiés de ces mêmes os hyoïdes; mais outre que je ne vois nullement comment pour cet effet ces quatre muscles genioglosses se feroient rencontrés, la seule attache des quatre muscles génio-hyoïdiens me paroît tout-à-fait contraire au système des accidens, selon lequel cette cloison ou ce faux hyoïde ne devoit servir d'attache qu'à deux genio-hyoïdiens, & les deux autres genio-hyoïdiens devoient être attachés à la base du grand os hyoïde ( $i, i,$ ) attenant l'attache des basioglosses ( $p, q,$ ).

La connexion symétrique d'un seul larynx & d'un seul pharynx avec ces autres parties si extraordinairement doubles & si extraordinairement transposées, fait encore plus paroître la difficulté de ce système dans le cas présent. Car la difficulté me paroît ici plus grande que dans la connexion d'une seule vertebre avec les moitiés de deux os occipitaux.

Mais

Mais il faut être entièrement au fait de la structure & de la disposition de toutes ces parties, & avec cela se donner la patience de comparer en détail l'extraordinaire avec l'ordinaire.

A l'égard de l'os grêle ( $\pi$ ,) Fig. VI. qui porte les deux muscles ( $m$ ,  $l$ ,), on pourroit avec quelque vraisemblance, expliquer son origine par la confusion de deux grandes appendices hyoïdiennes, qui, sans une telle confusion accidentelle, auroient été pareilles à celles de la Fig. IV. ( $l$ ,  $m$ ,). Le confrontement des muscles de cet os grêle ( $i$ ,) Fig. VI. avec ceux des grandes appendices ( $l$ ,  $m$ ,) Fig. IV. pourroit encore favoriser le système, quoique la distribution de ces quatre muscles, bien examinée, pourroit en rendre l'application difficile:

Le mylo-hyoïdien commun ( $z$ ,  $z$ ,) de la Fig. IV. le faux mylo-hyoïdien ( $i$ ) de la Fig. VI. le basioglosse unique & imparfait ( $\alpha$ ) de la Fig. IV. & ( $k$ ) de la Fig. VI. ces trois plans musculaires bien examinés par rapport à leur structure & à leur connexion extraordinaires confrontées selon toute l'exactitude anatomique avec la structure & la connexion ordinaires des muscles mylo-hyoïdiens & des muscles basioglosses, me paroissent presque aussi incompatibles avec le système des Monstres par accident, que la situation renversée des viscères du Soldat des Invalides, dont j'ai rapporté l'histoire dans la première Partie de ces Remarques.



## II.

*Réflexions sur l'histoire anatomique de la Fille à deux ventres & quatre extrémités inférieures, rapportée dans la première Partie de ces Remarques.*

Voici une récapitulation très courte des particularités de cette histoire. Le bas du dos du demi-corps étoit au bas du sternum de la grande Fille; de sorte que le devant du ventre & des extrémités du demi-corps regardoit directement le devant du ventre & des extrémités de la grande Fille. L'estomac, le duodenum, le jejunum & une partie de l'ileum de la grande Fille étoient simples & d'une conformation naturelle. L'autre partie de l'ileum étoit bifurquée ou divisée en deux branches, dont l'une continuoit sa route ordinaire dans la grande Fille, l'autre alloit au ventre du demi-corps. Le lobe gauche du foye de la grande Fille n'étoit pas mince comme à l'ordinaire, mais gros comme une espece de lobe droit, & il y avoit à la face inférieure ou concave de ce lobe gauche une vésicule du fiel, outre la vésicule ordinaire du lobe droit. Ces deux vésicules étoient à peu près pareilles en conformation & en situation; & alloient toutes deux au duodenum à peu de distance l'une de l'autre. Il n'y avoit dans le ventre du demi-corps, outre les vaisseaux & les nerfs, que la branche de l'ileum bifurqué de la grande Fille, avec le reste des intestins, les reins, les ureteres & la vessie.

Le

Le rectum s'ouvroit dans la vessie, & la vessie se terminoit par une espece d'anus en maniere de fente, par où sortoient la matiere fécale & l'urine mêlées ensemble. Il n'y avoit aucune marque de sexe, ni en-dedans, ni en-dehors. Les hanches, les fesses & les jambes de ce demi-corps étoient bien conformées & d'un embonpoint ordinaire par la seule graisse, sans la moindre trace de muscles ou de fibres charnues. Les os étoient dans leur état naturel, entre lesquels & la peau il y avoit tout au long dans le corps grasseux une distribution de vaisseaux sanguins & de nerfs. Il est encore à propos de faire souvenir que la grande Fille sentoît les impressions faites extérieurement sur la peau du demi-corps.

Selon le système des Monstres par confusion, on diroit pour expliquer tout ceci, que de deux sujets qui se seroient rencontrés de front dans leur premiere conformation, l'un auroit, par quelque contrainte, compression, ou autre accident, été détruit jusqu'à la moitié inférieure du bas-ventre, de sorte qu'il n'y en auroit resté que la moitié inférieure de ce bas ventre avec une portion de l'intestin ileum, &c. & les extrémités inférieures, après la destruction totale de la tête, des extrémités supérieures, de toute la poitrine, du diaphragme, du petit lobe ou lobe gauche du foye, de l'estomac, du duodenum, du jejunum, de la premiere portion de l'ileum, & de la moitié supérieure du bas ventre; pendant que l'autre sujet seroit demeuré dans son entier, excepté le petit lobe ou lobe gauche du foye, & la petite portion de l'épigastre, où

où étoit l'union du demi-corps avec le corps entier.

Ceux qui ne sont pas entièrement au fait de la structure & de la connexion des parties, ou qui ne se donnent pas la peine de tout examiner, pourroient trouver cette explication très satisfaisante & très naturelle; mais ceux qui sont en état d'examiner à fond les difficultés suivantes, ne la trouveront peut-être pas de même.

*I. Difficulté.* Il faudroit, selon le système de la confusion, s'imaginer que le lobe gauche du foye du grand sujet ait été originairement le lobe droit du petit sujet; & que par la destruction du lobe gauche de l'un & de l'autre, leurs lobes droits avec leurs vésicules bilaires auroient été confondus, & auroient formé ensemble un seul corps de foye avec deux vésicules.

Là-dessus on pourroit d'abord demander, comment cette portion du foye du petit sujet auroit échappé la violence de l'accident que l'on suppose avoir détruit non-seulement toutes les parties qui étoient immédiatement au-dessus d'elle, mais aussi plusieurs autres considérables qui étoient immédiatement au-dessous. Mais voici ce qui me paroît inexplicable par le système. Les deux corps s'étant rencontrés de front, les petits lobes des deux foyes se seroient par cette rencontre mutuellement détruits, & les gros lobes de ces mêmes deux foyes se seroient réunis latéralement ensemble & auroient formé dans le grand sujet comme un seul foye, dont le dessus & le dessous, de même que le droit & la gauche, n'au-

n'auroient pas d'abord paru beaucoup différens d'un foye ordinaire, & dont l'extraordinaire auroit été d'avoir le lobe gauche plus gros qu'à l'ordinaire, & d'avoir deux vésicules. Mais sans parler d'autres circonstances, la situation & l'attitude de la vésicule de ce lobe gauche étoient à l'égard du grand sujet, pareilles à la situation & à l'attitude de la vésicule du lobe droit; c'est-à-dire, le fond de la vésicule gauche ou extraordinaire étoit en devant, & le col de cette vésicule étoit en arrière, comme l'étoient le fond & le col de la vésicule ordinaire du côté droit.

Pour expliquer ceci selon le système des accidens par rencontre & par confusion de deux sujets originairement séparés & entiers, il faudra s'imaginer, ou que la seule vésicule extraordinaire ait été déplacée en contre-sens, en même tems que le lobe eût resté comme il étoit avec le bord antérieur placé vers le dos du grand sujet, & le bord postérieur vers le devant; ou il faudra s'imaginer que tout ce lobe, avec la vésicule, ait été dans cette rencontre de front, tourné en sens conforme au grand sujet, & à contre-sens à l'égard du petit. Cette difficulté me paroît un vrai nœud gordien, dans le système des Monstres par confusion.

*II. Difficulté.* L'insertion du canal cholodoque gauche ou extraordinaire dans le duodenum du grand sujet, à peu de distance du canal cholodoque ordinaire, comment seroit-elle arrivée selon le système des accidens? & supposé que ce canal ait quitté le duodenum anéanti du petit sujet, comment l'extrémité de

de cet intestin auroit-elle passé jusqu'au duodenum du grand sujet par le grand intervalle que la rencontre de front avoit laissé entre le canal cholidoque du petit sujet, & le duodenum du grand ?

Pour répondre quelque chose à cette difficulté, il faudra revenir ou à la tournure de la vésicule, ou à celle de toute la masse du lobe avec la vésicule, c'est à dire, à la première difficulté, à laquelle je ne vois pas ce qu'on pourra répondre avec solidité.

*III. Difficulté.* La bifurcation de l'intestin ileum ne paroît gueres moins difficile à expliquer selon le système des accidens. Auroit-elle été formée par la confusion des moitiés longitudinales de deux intestins pareils, qui dans la suite auroient été débarrassés de leur union ou confusion, & auroient formé séparément deux intestins ou deux branches d'intestins pareils ? On pourroit même tenter d'étendre cette idée jusqu'aux deux jejunums, & aux deux duodenums, & de trouver par-là un moyen d'expliquer comment s'est formée l'insertion de deux cholidoques dans un seul duodenum. Mais pour peu qu'on réfléchisse sur les circonvolutions en contre-sens, sur les croisemens vagues, & sur les différens intervalles changeans des intestins de deux sujets qui se rencontreroient directement de front, on verra qu'elle ne peut pas avoir lieu.

Il paroîtroit peut-être plus simple, selon le système des accidens, d'expliquer la bifurcation de l'intestin ileum, par l'application de l'embouchure du pareil intestin tronqué du

Mém. 1734.

Ff

petit

petit sujet à une ouverture latérale arrivée à l'intestin entier du grand sujet. Mais alors il faudroit aussi expliquer comment cette ouverture latérale seroit arrivée à l'intestin entier, & par quelle mécanique proportionnée à leur structure, deux ouvertures flaches de deux canaux, pareillement flaches & flottans, auroient resté tendues & sans se plisser, pendant qu'elles s'unissoient par leurs circonférences.

*IV. Difficulté.* Ces deux sujets étant unis de front, & vis-à-vis l'un de l'autre, les vaisseaux & les nerfs du côté droit de l'un communiquoient immédiatement avec les vaisseaux & les nerfs du côté gauche de l'autre, quoique les troncs de ces vaisseaux & de ces nerfs de l'un fussent aussi éloignés de ceux de l'autre, que les vertebres de l'un étoient éloignées des vertebres de l'autre. On aura de la peine à expliquer par le système des accidens, ces communications en contre-sens, sur-tout celles des grosses branches, d'autant plus que dans le petit sujet, la moëlle épiniere, l'aorte, & la veine-cave ont été, pour la plus grande partie, détruites & perdues.

*V. Difficulté.* Tous les organes internes du sexe manquoient dans le petit sujet, nonobstant que l'endroit où ils devoient se trouver, savoir le bassin, ne paroissoit pas avoir essuyé la moindre compression, & avoit son étendue naturelle. De plus, il n'y avoit pas la moindre apparence de muscles ou de fibres charnues dans toute l'étendue des extrémités inférieures du même sujet, quoique la conformation externe en fût très naturelle, & tout-

tout-à-fait pareille à celle d'un sujet bien charnu & bien nourri. Cette belle conformation externe dépendoit uniquement d'une graisse qui, par la seule différence d'épaisseur, soulevait différemment la peau, & faisoit paroître les fesses, le pli des fesses, le gros des cuisses, & le gras des jambes dans la forme ordinaire de l'embonpoint de ces parties, & par conséquent il n'y avoit aucune marque de destruction par compression. Ces deux défauts bien examinés & confrontés avec les circonstances qui les accompagnoient, me paroissent encore très difficiles à expliquer par le système des accidens, conformément à la vraie structure & à la connexion ordinaire des parties.

Je ne parlerai pas ici de l'insertion extraordinaire du rectum dans la vessie, ni de l'ouverture extraordinaire de cette vessie par un anus informe, n'y trouvant pas tout-à-fait les mêmes difficultés de les expliquer par le système des accidens.

### III.

*Remarques sur le Mémoire de M. Duverney, donné à l'Académie en 1706, au sujet de deux Enfans joints ensemble.*

1. C'étoient deux mâles. Ils étoient joints ou unis par la partie inférieure de leurs troncs, de manière qu'étant couchés tout au long sur leur dos, les têtes terminoient la longueur du total, & les cuisses de l'un croisoient avec les cuisses de l'autre. L'union de ces deux

corps étoit en devant marquée sur la peau par une espece de raphé ou couture, qui alloit transversalement depuis un côté jusqu'à l'autre, & dans ce trajet, où sont pour l'ordinaire les os pubis, on ne sentoit aucune partie osseuse ni cartilagineuse. Leur union en arriere se trouvoit à la rencontre des quatre fesses par un pli transversal, qui distinguoit les deux fesses de l'un d'avec les deux fesses de l'autre. Il y avoit au milieu de la couture un nombril commun à tous deux, & au milieu du pli entre les quatre fesses, à la place de l'anus qui y manquoit, étoient les parties naturelles de l'un & de l'autre. Les deux cuisses de chaque côté étoient plus reculées en arriere que de coutume dans leur articulation avec les os des hanches.

*Réflexion.* Eu seulement égard à cette conformation externe, il n'y auroit pas grande difficulté d'admettre ici le système des accidens, & de s'imaginer que ces enfans avoient été joints ensemble par une confusion accidentelle, & que les os pubis, qu'on ne sentoit pas dans leur place ordinaire, avoient été détruits par leur rencontre dans cette confusion. Cependant par la dissection tous les quatre os pubis, c'est-à-dire, les deux os pubis de chaque enfant, ont été trouvés dans leur entier, & unis à l'ordinaire avec les autres os de chaque bassin; mais les os pubis de chaque enfant, au lieu de tenir fermement ensemble sur le devant par une connexion cartilagineuse, étoient extrêmement écartés de côté & d'autre, d'une maniere qui me paroît inexplicable par le système des accidens.



2. Ces deux enfans avoient été renfermés sous les mêmes membranes, & n'avoient qu'un seul cordon ombilical & un seul placenta. Les membranes de leur envelope commune étoient plus fortes & plus épaisses qu'à l'ordinaire, le placenta étoit plus grand & plus épais, & le cordon ombilical plus gros. Ce cordon étoit composé d'un ouraque, de deux veines & de trois arteres, l'un des enfans en ayant deux, & l'autre n'en ayant qu'une.

*Réflexion.* On conviendra sans peine que deux enfans avoient besoin d'un placenta plus grand & plus épais qu'à l'ordinaire; mais de penser que ce placenta a été formé par la confusion de deux placentas originairement séparés; la moindre attention sur la structure d'un seul cordon qui en dépend, pour ne pas parler de celle des membranes, m'en empêche. Car il faudroit pour cela s'imaginer que ce cordon unique a été formé par l'union de deux cordons flottans, dont chacun, comme on fait, doit pareillement être composé tout au long de trois ou quatre vaisseaux contournés en maniere de rampe, & pleins de sang. Il faudroit encore s'imaginer que dans les deux placentas originaires, le cordon de chaque n'a pas été dans le milieu; car ce seroit par cette inégalité qu'on expliqueroit la largeur extraordinaire du placenta, sans néanmoins pouvoir aussi en expliquer l'épaisseur par cette inégalité. En un mot, la formation d'un tel cordon flottant par la rencontre & l'union de deux pareils cordons flottans, me présente à peu près la même difficulté

*Ff* 3

que

que j'ai exposée ci-devant sur la formation d'un intestin par la confusion de deux intestins.

3. Les os pubis de chaque enfant étant extrêmement écartés & éloignés de leur situation naturelle, comme j'ai dit ci-dessus, ceux de l'un étoient attachés à ceux de l'autre par des ligamens extraordinaires, très courts & très forts, qui permettoient aux deux bassins un mouvement en maniere de charniere, de sorte que par ce moyen on pouvoit alternativement écarter & un peu rapprocher ces deux enfans l'un de l'autre.

*Réflexion.* Je ne comprends pas comment on peut expliquer par le système des Monstres accidentels, le grand écartement des os pubis; pourquoi par la rencontre des deux germes ces os n'ont pas plutôt été détruits, ou courbés en dedans, que renversés en dehors si extraordinairement; comment ces mêmes parties étant par ce détour presque posées de champ, se sont si heureusement rencontrées par leurs bords naturellement très minces, comme s'explique M. Duverney; & enfin d'où sont provenus ces nouveaux ligamens.

4. La couture transversale qui marquoit sur la peau l'endroit de la jonction des deux enfans, étoit au dedans garnie tout au long depuis une extrémité jusqu'à l'autre, de plusieurs fibres tendineuses extraordinaires; & le pli qui distinguoit les fesses de l'un d'avec les fesses de l'autre, étoit au dedans attaché à une bande ligamenteuse extraordinaire, très forte & épaisse, qui par ses extrémités étoit attachée aux deux ligamens courts, par lesquels

quels les os pubis de l'un étoient attachés aux os pubis de l'autre.

*Réflexion.* Le système de la confusion ne me paroît pas pouvoir expliquer la fabrique de ces deux bandes particulieres, sur-tout en ce qu'elles sont à contre-sens de toute matiere fibreuse qui se trouve pour l'ordinaire à ces endroits & aux environs.

5. Les muscles droits du bas-ventre de l'un & de l'autre enfant, au-lieu de s'accompagner bien près, depuis la pointe du sternum jusqu'au pubis, se séparoient en leur trajet par un détour vers les os pubis écartés, où ils étoient attachés; de sorte que l'écartement de ces quatre muscles formoit une espece de lozange, dont l'intervalle étoit rempli par une expansion particuliere de l'aponevrose des autres muscles du bas-ventre. Par ce dérangement les muscles obliques étoient devenus droits, ce que M. Duverney avoit oublié dans sa description; mais la figure l'exprime assez.

*Réflexion.* Il n'y auroit pas grande difficulté d'adopter ici le système des accidens, si on ne faisoit pas une attention particuliere à la structure naturelle des gaines de ces muscles droits; & à la composition de la ligne blanche.

6. Les intestins grêles de l'un & de l'autre enfant se joignoient par leurs extrémités, & aboutissoient dans un intestin commun, qui par le dehors étoit comme une espece de colon, & avoit à un de ses côtés un petit cœcum avec un petit appendice vermiforme, mais étoit au-dedans garni de valvules con-

ventes, comme un intestin grêle. Cet intestin commun, après avoir fait deux courbures en contre-sens, s'ouvroit dans un autre intestin plus long, qui avoit deux cœcums & deux appendices, & qui après quelque trajet sous les intestins grêles, s'ouvroit d'une manière fort bizarre dans une double vessie très charnue, qui servoit de cloaque commun aux matieres fécales & aux urines de l'un & l'autre enfant, dont les urethres étoient extraordinairement larges. Il y avoit à l'endroit de l'union de la double vessie avec les deux urethres de côté & d'autre, deux paires de muscles extraordinaires, lesquels par un double croisement oblique de leurs fibres, représentoient deux X romains mis à côté l'un de l'autre, & unis ensemble par leurs extrémités voisines, de sorte qu'il en résultoit une espèce de lozange, qui renfermoit dans son intervalle le col commun de la double vessie, & paroissoit pouvoir faire la fonction d'un sphincter très extraordinaire.

*Réflexion.* Je répète ici la difficulté que j'ai marquée ci-dessus à l'Article II. de cette seconde Partie de mes Remarques, à l'occasion des intestins de la fille à deux bas-ventres. Mais je demande de plus ici, comment on pourroit expliquer par le système des accidens, la formation d'un troisieme cœcum & d'un troisieme appendice, & la formation de ces deux paires de muscles nouveaux si extraordinairement situés.

7. Les veines mésentériques des deux intestins commus, dont je viens de parler, se déchargeoient immédiatement dans la veine-cave.

cave inférieure. On fait que dans l'état ordinaire les veines mésentériques composent un tronc commun sous le nom de *veine-porte*, & que ce tronc, après une dilatation particulière, se ramifie de nouveau, & aboutit par ses dernières ramifications à de pareilles ramifications dont les troncs, appelés *veines hépatiques*, se déchargent enfin dans la veine-cave.

*Réflexion.* Une transplantation, pour ainsi dire, si étrange, si éloignée, & même si contraire à l'état ordinaire de l'économie animale, une telle transplantation de tronc en tronc, tous deux remplis de sang, je ne vois aucun moyen d'en suivre les traces par le système des accidens, pour peu qu'on soit au fait de la structure naturelle, & qu'on veuille se donner la peine de la confronter ici avec la structure extraordinaire.

8. Je laisse les autres particularités de l'histoire de ces deux Enfans, auxquelles j'applique les mêmes difficultés. Car enfin parmi toutes sortes de dérangement, de transposition, de complication de parties, soit par accident, soit par artifice, qu'on rencontre dans l'homme, dans les animaux, dans les arbres, les plantes, &c. où il est évident que ces parties ont été dans un état ordinaire avant l'accident & avant l'artifice; on y trouve toujours quelques traces de leur formation, comme je le ferai voir dans un autre lieu par des exemples très bizarres, tirés de la Chirurgie & du Jardinage. Je remets pour le résultat général la conclusion du Mémoire de M. Duverney, qui n'est pas entré dans le détail de toutes ces difficultés que je viens d'exposer.

## I V.

*Remarques sur le Mémoire de M. Lémery, donné à l'Académie en 1724, au sujet d'un Enfant à deux têtes.*

I. C'étoit un Enfant né à sept mois & demi de grossesse. Il avoit deux têtes bien conformées en tout, placées l'une à côté de l'autre, & posées chacune sur un col propre. Ces deux cols particuliers paroissoient à l'extérieur se joindre en descendant, & ne former qu'un seul col unique & commun. Le reste de tout le corps ne paroissoit à l'extérieur que très simple & d'une conformation ordinaire, excepté la poitrine qui étoit fort large, & les parties naturelles de deux sexes situées non à côté l'une de l'autre, comme les têtes, mais dans un même plan vertical.

● Par la dissection on y découvrit plusieurs choses extraordinaires, comme on verra dans les Articles suivans.

*Réflexion.* La conformation externe de cet Enfant à deux têtes porteroit très naturellement ceux qui ne connoissent pas à fond la structure, la situation & la connexion des parties internes dans leur état ordinaire, à juger qu'il a été formé par deux germes originellement séparés, qui, par quelque compression accidentelle à leur rencontre latérale, auroient perdu chacun depuis la partie inférieure du col, la moitié collatérale de tout le reste du corps, & auroient été réunis en un seul corps par les moitiés opposites. Cette  
idée.

idée me paroît devoir, même indépendamment de l'examen anatomique d'un tel sujet, faire peine à ceux qui considèrent le dérangement inexplicable que les parties devroient subir par une telle confusion. Je vais suivre pas à pas l'exposition anatomique de la structure interne de ce fœtus, & je marquerai sur chaque Article mes Réflexions.

2. Il y avoit deux épines ou colonnes vertébrales entieres depuis la base des crânes jusqu'à l'extrémité des coccyx; situées à côté l'une de l'autre; & bien près l'une de l'autre. Les douze vertebres dorsales de chaque épine ou colonne portoient sur les côtés opposés douze côtes entieres qui par le devant se joignoient à un sternum commun, & ces mêmes vertebres portoient sur les côtés les plus voisins douze fragmens ou petites portions de côtes, qui, par la rencontre & l'assemblage de leurs extrémités, formoient une espece de fausse épine entre les deux vraies épines. Il y avoit en-haut, comme à l'ordinaire, deux omoplates, deux clavicules, deux bras avec les restes des deux extrémités supérieures. Il y avoit en-bas un seul bassin commun, avec toute la suite ordinaire des deux extrémités inférieures. Au lieu des os sacrum & des coccyx, on ne voit dans la Figure qu'une suite uniforme de vertebres toutes pareilles à celles des lombes, avec cette seule difference, qu'elles diminuent en volume, à mesure qu'elles deviennent inférieures.

*Réflexion.* La jonction artificielle de deux squelettes ordinaires, qu'on auroit placés l'un à côté de l'autre, après en avoir emporté la

*Pl. 6*

plus

plus grande portion des côtes des côtés voisins avec les omoplates, les os des hanches, & tout le reste des extrémités supérieures & inférieures de ces mêmes côtés; cette jonction, dis-je, que M. Lémery a très ingénieusement exposée, paroît d'abord le moyen le plus simple & le plus naturel d'expliquer la formation de la charpente osseuse de ce fœtus, par la confusion de deux charpentes osseuses. originairement toutes entières, & appartenantes chacune à un corps tout entier.

Ce moyen pourroit sans grande difficulté favoriser le système des accidens par rapport à cet article, si par la même voye les autres choses extraordinaires qui se rencontrent dans la conformation de ce fœtus, pouvoient être expliquées avec autant de facilité & avec autant de vraisemblance, que les deux épines, &c. comme M. Lémery paroît le prétendre, en disant, que *l'examen des parties internes ne démentoit point les idées que les parties externes lui avoient fait naître.*

3. Il y avoit dans la poitrine de ce fœtus deux poumons entiers, c'est à-dire, quatre grands lobes, avec quatre troncs de bronches & deux trachées, qui répondoient à l'ordinaire aux deux cols, &c. ou pour mieux dire, il y avoit dans chaque côté de la poitrine un poumon entier avec ses deux grands lobes, deux troncs de bronches & une trachée.

*Réflexion.* Cet article paroît encore pouvoir favoriser à-peu-près aux mêmes conditions que celui des deux épines, le système des accidens, ou des monstres par confusion. Mais les difficultés qui y sont contraires, me pa-



paroissent encore plus considérables ici par rapport à la conformation bizarre du cœur monstrueux & unique, mais principalement par rapport à la route extraordinaire des grosses artères & veines entre ce cœur & les poumons, & par rapport à la distribution des aortes & des veines caves, comme je vais faire voir dans les articles suivans.

4. Ce cœur étoit unique, placé au milieu de la poitrine, & semblable à une gibeciere. Il ne formoit qu'un seul ventricule, qui avoit deux embouchures, une à droite, & l'autre à gauche, de chacune desquelles partoient deux troncs d'arteres, qui se portoient un peu sur les côtés, & dont l'un étoit supérieur à l'autre. Le tronc supérieur étoit un tronc d'aorte, & l'inférieur étoit un tronc d'artere pulmonaire; de sorte que de ce ventricule unique sortoient quatre troncs d'arteres, savoir deux aortes & deux arteres pulmonaires; une aorte & une artere pulmonaire du côté droit; l'autre aorte & l'autre artere pulmonaire du côté gauche.

Il n'y avoit pour toute oreillette qu'une poche membraneuse, située à la partie postérieure du ventricule & qui se continuant sur la base du cœur, formoit une espece de cul-de-sac entre les quatre artères. Elle ne faisoit avec le ventricule qu'une même cavité, & recevoit par sa partie supérieure, du côté droit, la veine-cave supérieure, qui se glissoit entre les deux troncs d'arteres du côté droit. Elle recevoit aussi par sa partie inférieure la veine-cave inférieure, & par ses deux côtés deux troncs de veines pulmonai-

res. Il y avoit au bas de la veine-cave supérieure, non seulement des valvules triglochiniques, mais il y avoit encore sur les côtés de cette veine deux petites cloisons qui la séparoient des deux arteres du côté droit, & qui paroissoient pouvoir faire l'office de valvules, quand le sang étoit poussé de bas en haut.

Voilà le précis de l'exposé de M. Lémery. Il en conclut, que ce cœur unique & monstreux étoit un composé de deux cœurs confondus ensemble par une pression accidentelle, &c. que chaque moitié de ce composé étoit originairement le cœur de celui des deux fœtus, qui étoit du même côté de cette moitié; & que le cœur unique ainsi composé, faisoit ici l'office de deux cœurs.

M. Lémery prend pour preuve convaincante de l'union de deux cœurs, les deux troncs d'arteres qui partoient de chaque côté de ce cœur unique, en prétendant que la distribution de deux troncs à droite, & de deux à gauche, désignoit dans ce composé la moitié qui en appartenoit à chaque fœtus.

Il finit ainsi son Mémoire: „ Comment  
 „ deux cœurs originairement séparés au-  
 „ roient-ils pu n'en faire plus qu'un seul, si  
 „ les cloisons qui les séparoient ne se fussent  
 „ ouvertes, & n'eussent permis à ces deux  
 „ cœurs de s'appliquer immédiatement l'un  
 „ contre l'autre, & de s'unir intimement?

*Réflexion.* M. de Fontenelle, dans son Histoire au sujet de l'union de deux squelettes, selon l'idée de M. Lémery, dit que des yeux anatomistes y trouvoient sûrement les traces

de

de ce qui étoit passé. Mais j'avoue que jusqu'à présent les miens ne les ont pas pu trouver par rapport à ce cœur & à ses dépendances, ni même par rapport aux viscères du bas-ventre. Voici deux difficultés qui entre autres m'en empêchent.

*Première Difficulté.* Il faudroit, selon l'idée de M. Lémery, s'imaginer que deux fœtus originairement entiers, se seroient trouvés à côté l'un de l'autre, & qu'ayant été mutuellement comprimés par accident, les parties latérales voisines de l'un & de l'autre auroient d'abord été détruites jusqu'à la rencontre des deux cœurs. Mais je ne vois pas comment les deux moitiés, ou grands lobes du poulmon, qui dans la rencontre d'une telle attitude latérale se seroient trouvés entre les deux cœurs, auroient plus résisté à leur destruction par leur compression mutuelle, que les autres parties naturellement plus fermes qu'eux, comme les os, les muscles, &c.

La difficulté me paroît d'autant plus grande, que, selon l'expression du Mémoire de M. Lémery, les deux côtés de la poitrine étoient occupés par deux poulmons entiers, ce qui marque que les deux grands lobes voisins étoient aussi entiers que les deux lobes éloignés. Je ne m'arrête pas ici à la figure qui accompagne ce Mémoire, & dans laquelle les deux grands lobes voisins sont pour la plus grande partie cachés par les deux autres grands lobes; ce qui a été apparemment fait exprès, pour mieux faire voir la distribution des gros vaisseaux du cœur.

*Seconde Difficulté.* On fait que dans l'état naturel ou ordinaire, le cœur humain est à-peu-près d'une figure conique, aplatie par un côté, arrondie par la base & par la pointe. On fait qu'il est couché à plat dans le péricarde sur le diaphragme, que sa pointe est beaucoup plus tournée à gauche qu'en devant, & sa base beaucoup plus à droite qu'en arrière; en un mot, que sa situation est presque transversale. On fait la disposition de la cloison des ventricules, celle des deux ouvertures de chaque ventricule, celle des oreillettes, & enfin celle des gros vaisseaux.

J'ai examiné autant qu'il m'a été possible, toutes sortes de coupes de deux cœurs semblables, & de leurs oreillettes, &c. non pas tant en prétendant pouvoir trouver un assemblage de différentes portions de deux cœurs qui imitât entièrement la composition du cœur monstrueux dont il s'agit, qu'en espérant trouver au-moins quelques petites traces de rapport entre ces portions, à-peu-près comme on en peut trouver dans les combinaisons extraordinaires, soit artificielles, soit notoirement accidentelles, de quelque partie d'animaux ou de plantes, même dans les combinaisons les plus bizarres. Mais il m'a été impossible d'en trouver ici, & je n'entrevois aucun moyen d'y parvenir, en examinant avec de vrais yeux anatomistes. Les tentatives par dissection & par figures exprimeroient plus évidemment la difficulté, que la description.

Il est bon d'avertir que je parle ici des cœurs semblables en conformation : car si  
l'un

l'un des deux étoit conformé à l'ordinaire, & l'autre conformé à contre-sens; comme l'étoit celui du Soldat des Invalides, dont j'ai parlé dans la première Partie de mon Mémoire, je n'y trouverois peut-être pas tant de difficulté; mais aussi alors la conformation originairement extraordinaire d'une partie, rendroit entièrement inutile tout ce qu'on pourroit avancer en faveur de la conformation accidentelle du total.

Les deux petites cloisons qui, au bas de la veine-cave supérieure, outre les valvules triglochines ordinaires, étoient sur les côtés de cette veine, & la séparoient des deux artères du côté droit, étoient certainement des parties surnuméraires, dont il ne se trouve ni traces ni apparence dans l'état ordinaire. Elles étoient même organisées, puisqu'elles ont paru à M. Lémery pouvoir faire l'office de valvules. Ainsi voilà dans un même sujet, parmi & outre les parties dont la conformation extraordinaire est censée être accidentelle, d'autres parties extraordinaires & surnuméraires, dont on ne peut attribuer ou rapporter la formation à aucun accident, & qu'on est par conséquent obligé de regarder comme réellement originaires.

5. Les deux artères pulmonaires, après avoir fait un peu de chemin sur les côtés, se partageoient chacune en deux, pour les deux grands lobes de chaque poumon entier.

Les deux aortes formoient chacune deux artères carotides, une artère sous-clavière, un canal de communication avec l'artère pulmonaire du même côté, une artère axillaire;

&c

& enfin ces deux aortes formoient chacune de son côté une aorte descendante, laquelle alloit se loger avec la pareille aorte descendante de l'autre côté, dans une sinuosité formée par la fausse épine, où les deux aortes descendantes s'anastomofoient ensemble, & ne formoient plus qu'un seul tronc commun qui fournissoit les divisions d'arteres comme dans l'état naturel.

*Réflexion.* Pour placer latéralement aux deux côtés de la base de ce cœur composé, les deux gros troncs d'arteres, & y placer chaque tronc d'aorte au-dessus de chaque tronc d'artere pulmonaire, il faudroit s'imaginer dans le cœur originaire du fœtus gauche une portion ou coupe, non-seulement très bizarre, mais encore très défavantageuse par sa tournure, pour pouvoir en imaginer l'union avec le restant de l'autre cœur. Mais à l'égard des gros vaisseaux du cœur droit, ou celui du fœtus qui étoit à droite, il me paroît impossible d'imaginer le tronc de l'aorte, le tronc de l'artere pulmonaire, & le canal de communication contournés & distribués, comme il le faudroit selon l'exposition de M. Lémery, & selon la Figure qui les représente, à moins que ce cœur droit ou du côté droit ne fût originairement formé à contre-sens, comme j'ai dit ci-dessus, par rapport au côté droit du cœur monstrueux.

6 Au-dessous de chaque tête, étoit un pharynx suivi d'un œsophage, qui descendoit dans la poitrine commune le long des parties latérales externes de l'épine particuliere qui répondoit au col d'où il venoit. Ces deux œso-

œsophages, l'un à gauche, & l'autre à droite, alloient ensuite percer les parties latérales du diaphragme, & se terminoient par deux estomacs, un de chaque côté, qui occupoient aussi les parties latérales de la région supérieure du bas-ventre.

Chacun de ces estomacs formoit un arc ou demi-cercle, & ils entouroient par-là le foye, à l'exception de sa partie supérieure, de manière que la petite courbure de chacun regardoit le foye, & la grande regardoit les fausses côtes. Ils se terminoient chacun par un pylore au-dessous du foye, & il partoît de chaque pylore un petit bout d'intestin; de sorte qu'il y avoit deux pylores avec deux bouts d'intestins. Ces deux bouts ou portions se réunissoient bien-tôt en un canal commun, qui se portoit de la région épigastrique dans le flanc droit, & après avoir fait ses circonvolutions à l'ordinaire, aboutissoit entre les deux releveurs de l'anus.

*Réflexion.* Si l'on examine attentivement & avec toute l'exactitude anatomique la disposition de ces deux œsophages, de ces deux estomacs, & de ces deux bouts d'intestin, qui apparemment tenoient lieu de deux duodénus, on trouvera, si je ne me trompe, sur l'œsophage du côté droit, sur l'estomac du même côté, & sur le bout d'intestin qui en dépend, la même difficulté que j'ai fait remarquer ci-devant sur le côté droit du cœur monstueux, sur les gros vaisseaux, & sur le canal artériel de ce côté; savoir, 1<sup>o</sup>. que la situation extraordinaire de ces parties, telle qu'elle est ici, n'est pas concevable, sans y supposer une

une organisation tout-à-fait à contre-sens ; 2°. qu'une telle organisation ne pouvant être expliquée par aucun accident, paroît réellement originaire.

L'aboutissement des deux petits bouts d'intestin à un simple canal intestinal très long, & la formation de toute la suite des différentes circonvolutions flottantes d'un tel canal, par la confusion accidentelle de deux pareils canaux originairement séparés, me paroissent encore aussi peu favorables au système des accidens, que l'intestin bifurqué de la Fille à un corps & demi, l'intestin commun aux deux Enfants joints ensemble, & le cordon ombilical unique des deux Enfants séparés, dont les histoires sont rapportées ci-devant.

7. Le foye étoit au milieu de la partie supérieure du bas-ventre entre les deux estomacs, & dans l'espece de cercle qu'ils formoient autour ; il n'étoit point divisé en lobes ; sa partie supérieure, au-lieu d'être dans le bas-ventre, & au-dessous du diaphragme, comme le reste de son volume, traversoit la portion tendineuse du diaphragme, & occupoit la partie inférieure de la poitrine, où elle étoit fortement attachée au péricarde ; la veine ombilicale lui servoit aussi de ligament, comme à l'ordinaire.

*Réflexion.* S'il n'y a point d'inconvénient d'admettre dans un même sujet, deux sortes d'extraordinaires, l'une par accident, & l'autre d'origine, on ne feroit pas grande difficulté de laisser au système des accidens, la formation de ce foye extraordinaire ; d'autant plus que dans l'exposé, il n'est pas fait men-

tion.



tion de conduits biliaires, ni de veine-porte, qui auroient peut-être donné lieu de juger autrement.

## V.

Après ces quatre exemples détaillés des Monstres composés, mon dessein étoit de donner un Abrégé chronologique de tous les autres, dont l'Académie a pris connoissance, & dont plusieurs sont assez favorables au système des accidens, d'autres y paroissent contraires, & quelques-uns très équivoques. Mais comme on peut, par le moyen des Tables \* de M. Godin, de cette Académie, trouver assez facilement tous ces autres exemples, je me contenterai d'en rapporter deux que j'accompagnerai d'autres semblables, tirés de notre célèbre Riolan, & y joignant quelques-uns qui n'ont pas encore été insérés dans les Mémoires de l'Académie.

1705. Par M. Littre. Une Matrice partagée intérieurement en deux cavités latérales, par une cloison mitoyenne, auxquelles deux cavités répondoient extérieurement deux convexités très distinctes; le reste de l'extérieur du corps de cette Matrice étoit simple & uniforme, comme à l'ordinaire; chacun des deux fonds n'avoit qu'une trompe, &c. laquelle étoit avec le reste de ses accompagnemens, du côté opposé à l'autre fond, & il n'y avoit rien de tout cela aux côtés voisins de ces deux fonds.

*Réflexion.* Ce n'est pas le seul exemple d'une Matrice double. Riolan, dans son Anthro-

\* Ces Tables s'impriment actuellement à Amsterdam chez Pierre Mortier, fort augmentées.

thropographie, en rapporte deux exemples, l'un d'une femme disséquée dans les Ecoles des Lombards en 1599, & l'autre qu'il avoit lui-même disséquée en 1615. En parlant de la première, il dit : *Uterus septo medio divisus erat* ; & de l'autre : *Ab orificio externo usque ad fundum duplex erat matrix, mediano pariete secreta ; reliquæ partes genitales simplices erant, ac si fuisset unus uterus.*

Cela me paroît aussi difficile à expliquer par le système des accidens, que le contresens des viscères du Soldat des Invalides, & la formation des parties surnuméraires bien organisées, dont il y a tant d'exemples bien avérés, comme de six doigts, de huit vertèbres du col, de treize côtes, de différens muscles, &c. tels que les muscles pectoraux extraordinaires, dont M. Dupuy, Médecin de Rochefort, a communiqué l'histoire à l'Académie en 1726.

M. de Fontenelle dans son Histoire, au sujet de l'observation de M. Littré, dit avec grande raison, que les dispositions extraordinaires des parties internes doivent faire naître aux Médecins des cas imprévus, qui rompent toutes les mesures de l'art. Il applique sa réflexion au cas de superfétation ; & un peu après : Comment, dit-il, cette matrice double a-t-elle pu être l'effet d'un accident fortuit du développement ? il est difficile de l'imaginer, répond-il. Seroit-ce, continue-t-il, que deux œufs femelles se seroient attachés ensemble, & que toutes les parties de l'un auroient péri, excepté sa matrice, qui par conséquent se seroit trouvée double dans

le fœtus résultant de ce mélange? Cette supposition, répond encore M. de Fontenelle, paroît un peu forcée.

En 1723, M. Geoffroy communiqua une observation sur deux enfans unis l'un à l'autre par un nombril commun, de sorte que le tout ensemble n'étoit que deux moitiés de deux corps, unies par le plan inférieur de chacun. Ces deux moitiés étoient posées du même sens, & les têtes qui terminoient le tout, étoient tournées en même tems, ou vers le haut, ou vers le bas, &c. On a vu ce monstre déjà âgé de trois semaines bien vivant. Ces deux enfans avoient deux nourrices; ils tetoient & mangeoient de la bouillie avec beaucoup d'appétit & un grand air de santé: quelquefois l'un tetoit, pendant que l'autre dormoit; ils ont été tous deux baptisés, & nommés *Jeanne*.

Si des monstres à deux têtes, comme celui-ci, dit M. de Fontenelle là-dessus, vivoient assez longtems, il seroit curieux d'observer la différence des pensées & des volontés des deux têtes, & comment le monstre total se prendroit à les accorder, ou à les sacrifier les unes aux autres.

*Réflexion.* Je rapporte cet exemple en partie, à cause de sa ressemblance avec celui de M. Duverney; en partie pour donner, en attendant mieux, quelque satisfaction au souhait de M. de Fontenelle, par deux exemples tirés d'une Dissertation Latine de Riolan, sur un monstre né à Paris en 1605, laquelle se trouve à la fin de son Anthropographie. Voici ses propres paroles: *In Anglia non procul ab*

*Oxo-*

*Oxonia natum est monstrum biceps, quatuor manibus donatum, sed ventre unitum, & partibus inferioribus unicum. Ex istis gemellis uno vigilante, alter dormiebat; dum hic latam faciem ostenderet, ille tristis & mœstus apparebat; quindecim dies vixere, sed alter unico die alteri supervixit.*

*Memorabilis est historia monstri cujusdam in Northumbria orti, quod ventre cohærebat, gemino capite, quaternis manibus, sed inferiores partes communes habebat. Id Rex diligenter & erudiendum & educandum curavit, ac maxime in musicis, qua in re mirabiliter profecit, quin & varias linguas edidicit: & variis voluntatibus duo corpora secum discordia dissentiebant, ac interdum litigabant, cum aliud alteri non placeret; interdum veluti in commune consultabant. Illud etiam in illo memorabile fuit, quod cum infernè crura lumbivè offenderentur, utrumque corpus communiter dolorem sentiret; cum verò supernè pungeretur, aut alioqui laderetur, ad alterum corpus tantum doloris sensus perveniret; quod discrimen in morte fuit magis perspicuum. Nam cum alterum corpus complures ante alterum dies extinctum fuisset, quod superstes fuit, dimidio sui computrescente paulatim contabuit. Vixit id monstrum annos viginti octo, ac decessit, administrante rem Scoticam Joanne Prorege.*

„ C'est à dire : En Angleterre, pas loin  
 „ d'Oxford, nâquit un Monstre à deux têtes, & ayant quatre mains. Il étoit joint  
 „ par le ventre, & unique par rapport aux  
 „ parties inférieures. Tandis que l'un de ces  
 „ deux jumeaux veilloit, l'autre dormoit; &  
 „ lorsque le visage de l'un montrait de la  
 „ gayeté, l'autre paroissoit triste & mélancolique.  
 „ cho-

cholique. Ils vécurent quinze jours, l'un n'ayant survécu l'autre que d'un seul jour. On raconte aussi une histoire mémorable d'un Monstre né dans le Northumberland, lequel étoit joint par le ventre, ayant deux têtes & quatre mains, mais il avoit les parties inférieures communes. Le Roi le fit élever & instruire avec soin, & surtout il lui fit apprendre la Musique; non-seulement il y fit des progrès merveilleux, mais il apprit encore plusieurs Langues. Ces deux corps ne s'accordant pas, avoient des volontés différentes, & se querelloient quelquefois quand ce qui plaisoit à l'un ne plaisoit pas à l'autre; quelquefois aussi ils prenoient conseil l'un de l'autre. Ce qu'il y eut de plus remarquable, fut que lorsqu'on leur faisoit mal aux cuisses ou aux reins, l'un & l'autre ressentoit de la douleur; mais lorsqu'on piquoit, ou qu'on faisoit autrement mal à l'un des deux aux parties supérieures, il n'y avoit que l'un des deux qui le sentoit. Cette différence fut encore plus évidente à la mort; car l'un des deux corps étant mort plusieurs jours avant l'autre, le survivant dépérit peu à peu, à mesure que l'autre moitié de lui-même pourrissoit. Ce Monstre vécut 28 ans, & mourut sous le gouvernement de Jean, Vice-Roi d'Ecosse.

En 1733, M. le Cardinal de Polignac a fait voir à la Compagnie, deux petits Veaux joints ensemble par leurs poitrines & par le derrière de leurs têtes; de sorte que la situation des deux têtes par rapport à celle des

*Mém.* 1734.

Gg

deux

deux troncs étoit telle, qu'en regardant directement le milieu du dos de l'un, on voyoit tout-à-fait à plein & en même tems les parties latérales, ou le profil des deux têtes, & en regardant l'une des deux têtes directement de front, on voyoit tout à la fois les deux côtés ou le profil des deux troncs & de toutes leurs parties. Il n'y avoit aucun moyen de distinguer extérieurement auquel des deux troncs appartenoit chaque tête; l'une étoit plus difforme que l'autre, & avoit au haut du front une espèce de cavité quadrangulaire, dans laquelle les deux yeux étoient placés fort près l'un de l'autre, & en partie cachés par les bords de la cavité. (*Voyez les Fig. XII. XIII. & XIV.*). La disposition de ces deux Veaux étoit en cela à-peu-près comme celle du Fœtus humain, dont M. de la Condamine a donné la description & la figure dans les Mémoires de cette année.

Son Eminence a encore fait voir à la Compagnie deux petits Pigeons, dont chacun avoit deux têtes unies ensemble par les parties latérales de leurs crânes. Ces deux Monstres étoient tous deux d'une même mere, l'un étoit né un mois après l'autre. Dans l'un de ces petits Pigeons, les deux têtes étoient chacune articulées avec un petit col particulier, & ces deux petits cols formoient ensuite un seul col commun posé sur un seul tronc, dont toutes les autres parties étoient simples & à l'ordinaire, comme celles d'un seul & unique tronc. Les deux têtes de l'autre petit Pigeon étoient articulées sur un seul col, comme les têtes du Faon du Roi, & du petit Veau de




Fig. II.



Fig. I.

Fig. III.













*Handwritten text, possibly a signature or date, located at the bottom of the page.*





VIII. IX.





*Fu*  
*ce*

*a*












*Fig. XIII.*





Fig

XVIII.





de M. de Reaumur, dont il est parlé au commencement de cette Partie. *Voyez les Fig. XV. XVI. XVII. & XVIII.*

*Réflexion.* La difficulté me paroît ici en général semblable à celle que j'ai marquée dans l'examen du Faon du Roi, & du Veau de M. de Reaumur; mais en particulier elle me paroît beaucoup plus grande par rapport à la disposition latérale des têtes des petits Veaux de M. le Cardinal, & de celles du Fœtus humain de M. de la Condamine.



QUE L'OBLIQUITÉ DE L'ECLIPTIQUE  
diminue, & de quelle manière;

ET QUE LES NOEUDS DES PLANETES  
sont immobiles.

Par M. G O D I N. \*

**J**E traiterai ici ces questions astronomiquement, & sans m'embarrasser d'aucune Théorie physique, soit en déduisant immédiatement des observations ce que j'aurai à établir, soit en faisant des hypothèses dont on verra l'accord avec les observations.

Quelque précision que feu M. de Louville ait apportée dans son Mémoire † sur la diminution d'obliquité de l'Ecliptique, qu'il détermine d'une minute en 100 ans, il y a toujours

\* Assemblée publique du 13 Novémb. 1734.

† *Acta Erudit. Lips.* 1719.

jours deux raisons de douter de la certitude de cette détermination: la premiere, à cause qu'il employe les mêmes réfractions, telles que nous les avons ici, pour corriger les observations des anciens Astronomes, faites en differens tems & en differens lieux. La seconde est que la hauteur du Pole à Marseille, qui est le principal fondement de son examen, ne paroît pas bien certaine: elle a été donnée encore par d'autres Astronomes, M<sup>rs</sup>. Cassendi, Cassini, de la Hire, & il y a entre eux environ 4 minutes de difference.

Pour éclaircir ces difficultés, j'ai cru qu'il étoit mieux d'employer des observations récentes, faites avec l'exaetitude de l'Astronomie moderne, & dans les mêmes lieux, ou dans differens, mais dont les réfractions fussent connues.

Celles que je choisis pour fondamentales, furent faites en 1655, à Bològne, par feu M. Cassini, au gnomon de St. Pétrone qu'il venoit de construire; l'obliquité de l'Ecliptique qui en résulte, est de  $23^{\circ} 29' 15''$ .

Or il est certain, par toutes les observations faites à Paris & en d'autres parties du Monde, ces dernières années, depuis 1730, que cette obliquité est à présent de  $23^{\circ} 28' 20''$ , sans qu'il y ait peut-être 5 secondes d'erreur. Elle a donc diminué de 55 secondes en 80 ans, ou, à très peu près, d'une minute en 90 ans. Par-là on représentera les observations des Astronomes modernes, M<sup>rs</sup>. Richer, de la Hire, Roemer, Bianchini, de Louville, à 5 secondes près. On trouvera, par exemple, pour n'en citer que deux dont les

con-

conditions font connues, & que M. de Louville n'a point citées, que cette obliquité a dû être en 1681 de  $23^{\circ} 29'$ , telle que M. de la Hire l'a trouvée alors à Paris. Qu'en 1706, elle a été de  $23^{\circ} 28' 41''$ , comme elle résulte des observations de M. Roemer, faites à Copenhague.

Puisque l'angle de l'Ecliptique & de l'Equateur diminue, il faut que l'un de ces deux cercles s'approche de l'autre. Si l'on suppose que ce soit l'Equateur qui s'approche de l'Ecliptique, ou que dans le système de Copernic, l'axe de la révolution diurne de la Terre devienne peu à peu perpendiculaire au plan de son orbite, en ne considérant que ce qui doit arriver jusqu'à la confusion des deux cercles, ou, ce qui est la même chose, jusqu'au parallélisme exact des deux axes de la révolution diurne & du mouvement annuel; il est évident que les Etoiles fixes, indépendamment de ce qui doit résulter de leur mouvement en longitude, changeront leur déclinaison par les loix suivantes.

1<sup>o</sup>. Les Etoiles dont la latitude & la déclinaison font de même dénomination, toutes deux boréales, ou toutes deux australes, augmenteront en déclinaison, si leur latitude est plus grande que leur déclinaison; & au contraire, si elle est plus petite, leur déclinaison diminuera.

2<sup>o</sup>. Si la latitude & la déclinaison font de différente dénomination, les Etoiles diminueront de déclinaison jusqu'à devenir nulle; après quoi cette déclinaison prendra la même

dénomination que la latitude, & sera sujette à la premiere loi.

Or on peut savoir fort exactement quel doit être le changement d'une Etoile fixe en déclinaison, en vertu de son mouvement en longitude qui est connu, & de sa déclinaison une fois observée; Donc en prenant une telle observation pour époque, on aura dans la suite un fort bon moyen de reconnoître si la déclinaison des Etoiles fixes subit d'autres changemens que ceux qui leur arrivent par leur mouvement en longitude; & par conséquent si l'Equateur s'approche de l'Ecliptique, ou celui-ci de l'autre. Dans ce second cas, la déclinaison des Etoiles sera telle que le mouvement en longitude la doit donner, mais leur latitude changera; au-lieu que dans le premier cas elle est toujours la même, & la déclinaison obéit à deux causes de variation.

Je suppose ici que l'axe de ce mouvement, soit de l'Ecliptique, soit de l'Equateur, passe par les points des Equinoxes, parce que je ne vois rien encore qui m'oblige de le supposer autrement situé. On voit bien d'abord qu'il ne passe pas par les points qui répondent aux Solstices, puisque l'obliquité diminue, & que celle de ces points que nous prenons pour la plus grande, devroit toujours être la même. D'où il suit, que s'il est vrai, comme plusieurs Savans l'ont cru, qu'Herodote \* ait voulu dire d'après les Egyptiens, que

\* *Hist. lib. 2. sed hæc non videtur dixisse. Vid. Pompon. Melam lib. 1. & in eum Vadiani Comment. pag. mibi 55. Fracastorii Homocentr. sect. 3. cap. 2. Riccioli Almag. novum, t. 1. p. 165.*



que l'Ecliptique eût été autrefois perpendiculaire à l'Equateur, son obliquité présente de  $23^{\circ} 28'$  nous prouve que ce mouvement ne se fait pas sur des points plus éloignés des Equinoxes, que de  $23^{\circ} 28'$ . Mais sans faire aucune attention à cette prétendue tradition, je suppose l'axe de ce mouvement placé comme j'ai dit, & je vois que toutes les observations & les raisonnemens astronomiques concourent à l'y fixer: on en va voir une partie dans la suite.

Si les Anciens nous avoient laissé des observations exactes de la position des Etoiles fixes, & sur-tout en déclinaison, leur comparaison avec les nôtres décideroit aujourd'hui lequel des deux cercles s'approche de l'autre: mais celles que rapporte Ptolémée \*, les seules qui nous restent de l'Antiquité, ne sont pas propres à nous éclaircir là-dessus. Tantôt elles favorisent une opinion; elles sont, par exemple, approcher l'Equateur de l'Ecliptique immobile; & tantôt l'opinion contraire: pour plus de précision, j'ai corrigé ces déclinaisons rapportées par Ptolémée, en cette sorte. Il est vraisemblable que cet Astronome les a déduites de leur hauteur méridienne ajoutée ou soustraite de la hauteur de l'Equateur à Alexandrie, qu'il a toujours supposée dans son Almageste de  $59^{\circ} 2'$ ; mais M. de Chazelles la trouva en 1692 de  $58^{\circ} 49'$ : Par là les déclinaisons boréales de Ptolémée sont trop petites de  $13'$  & les australes trop grandes de la même quantité. Mais comme cela ne me donnoit aucun éclaircissement, j'ai pris

Gg 4

un

\* *Lib. 7. Almagest.*

un autre chemin. Supposant & corrigeant les déclinaisons que Ptolémée rapporte, dont l'observation lui a été plus facile que toute autre, & supposant aussi l'obliquité de l'Ecliptique de son tems, telle qu'elle résulte de celle d'aujourd'hui augmentée de 1' en 90 ans, & prenant enfin le lieu des Etoiles, comme il résulte aussi des observations modernes, j'ai cherché quelle devoit être la latitude de ces Etoiles fixes; & comparant cette latitude avec celle qu'elles ont aujourd'hui, j'ai reconnu que la plupart s'accordent à donner à l'Ecliptique le même mouvement que demande la diminution de son obliquité depuis Ptolémée jusqu'à nous.

Ce même argument qui est très fort, a été employé par Tycho \* le premier pour le même sujet: mais parce qu'il prend les déclinaisons des Etoiles telles que Ptolémée les donne, & qu'il suppose l'obliquité de l'Ecliptique trop grande de plus de 5', la même qui a été donnée par Eratosthenes, mais deux siècles avant J. C. & trois & demi avant Ptolémée; & enfin que les latitudes qu'il donne à ces Etoiles, tirées de ses propres observations, n'ont pas la précision des nôtres; il étoit nécessaire de renouveler cet argument, & de le revêtir de toutes ses circonstances les plus conformes aux faits que nous connoissons.

En voici un exemple sur l'Etoile appelée *la claire de l'Aigle*, qui est une de celles que †

Ric-

\* *Progymnasm. lib. 1. p. 233. propr. Edit. Authoris.*

† *Almag. nov. 1. 3. p. 442.*

Riccioli regarde comme peu favorables à cette hypothese.

Sa déclinaison, suivant Ptolémée, est de  $5^{\circ} 50'$  boréale; y ajoutant  $13'$ , elle viendra de  $6^{\circ} 3'$ . Par mes observations de la longitude de cette Étoile faites en 1732 & 1733, & le mouvement connu des Étoiles fixes, elle étoit du tems de Ptolémée en  $5^{\circ} 33'$  *W*, & par conséquent fort proche du colure des Solstices, ou du lieu de la plus grande variation en latitude; l'obliquité étoit alors de  $23^{\circ} 46'$ , d'où l'on trouvera la latitude de cette Étoile de  $29^{\circ} 43'$  & environ  $10''$ ; mais cette latitude est aujourd'hui de  $29^{\circ} 24' 30''$ , elle a donc diminué depuis Ptolémée jusqu'à nous, de  $18' 40''$ ; & si l'on a égard à l'effet de la réfraction sur la déclinaison de l'Étoile, cette diminution sera encore un peu moindre: mais la diminution de l'obliquité de l'Ecliptique est pour le même tems de  $17' 40''$ , d'où l'on voit que cette Étoile, presque placée sur le colure des Solstices, a diminué sa latitude de la même quantité à-peu-près que l'obliquité de l'Ecliptique, comme il a dû arriver, si ce cercle s'est effectivement approché de l'Equateur.

Jusqu'ici ce sentiment me paroît très probable, étant confirmé de la même manière par le plus grand nombre des Étoiles dont la déclinaison a été observée par Ptolémée: mais il en résulte deux conséquences remarquables, qui serviront de preuves complètes de ce sentiment, si ces conséquences se trouvent conformes aux observations.

La première est, que les plus grandes lati-

tudes des Planetes, ou l'inclinaison de leurs orbites, doit changer; la seconde est, que leurs Nœuds ascendans étant tous dans les six premiers Signes du Zodiaque, ils doivent indépendamment de toute autre cause, rétrograder par rapport aux Equinoxes considérés comme fixes, plus ou moins les uns que les autres, suivant leur situation particuliere & l'angle des orbites. Un seul triangle que l'on résoudra pour chaque Planete en fera la preuve, & l'on trouvera, en supposant les Nœuds des Planetes & leur inclinaison à l'Ecliptique pour la fin de cette année, comme les donne la Table suivante (A), & que ces Nœuds sont fixes par rapport aux Etoiles; que 100 ans avant, c'est-à-dire, au premier Janvier 1635, ces Nœuds & ces Inclinaisons étoient comme les donne la seconde Table (B).

Table (A).

| Nœuds en 1734. |     |     |   | Inclinaison en 1734. |     |
|----------------|-----|-----|---|----------------------|-----|
| ♂              | 15° | 21' | ♄ | 7°                   | 12' |
| ♀              | 14  | 20  | ♂ | 3                    | 23  |
| ♂              | 17  | 36  | ♄ | 1                    | 51  |
| ♂              | 7   | 27  | ♂ | 1                    | 20  |
| ♂              | 22  | 11  | ♂ | 2                    | 31  |

Table (B).

| Nœuds en 1634. |     |     |    | Inclinaison en 1634. |            |
|----------------|-----|-----|----|----------------------|------------|
| ♂              | 15° | 27' | 0" | ♄                    | 7° 10' 48" |
| ♀              | 14  | 36  | 30 | ♂                    | 3 23       |
| ♂              | 17  | 47  | 0  | ♄                    | 1 50 15    |
| ♂              | 7   | 59  | 7  | ♂                    | 1 20       |
| ♂              | 22  | 31  | 0  | ♂                    | 2 31 20    |

D'où

D'où l'on voit que les Nœuds ont rétrogradé en 100 ans depuis 1634 jusqu'en 1734.

|            |    |    |
|------------|----|----|
| Celui de ♀ | 6' | 0" |
| ♀          | 16 | 30 |
| ♂          | 11 | 0  |
| 24         | 32 | 7  |
| h          | 20 | 0  |

Mais ce mouvement rétrograde n'est tel, qu'en supposant les Nœuds fixes par eux-mêmes, & que les points Equinoctiaux soient immobiles aussi: cette dernière supposition qui est fautive, étant rectifiée, change le mouvement relatif des Nœuds, & les fait avancer suivant l'ordre des Signes, à cause que le mouvement de précession des Equinoxes se faisant contre l'ordre des Signes, il fait parcourir en apparence en 100 ans à chaque point du Ciel un arc de  $1^{\circ} 24' 35''$ , beaucoup plus grand qu'aucun de ceux que nous venons de trouver que les Nœuds devoient parcourir en rétrogradant. Par-là on trouvera que les Nœuds ascendants des Planetes étoient au commencement de l'année 1635, comme il suit, Tab. (C).

Table (C).

| Nœuds en 1634. |     |     |       | Mouvement en 100 ans<br>depuis 1634. |    |                 |
|----------------|-----|-----|-------|--------------------------------------|----|-----------------|
| ♀              | 13° | 55' | 40" ♀ | 1                                    | 25 | 20 <sup>a</sup> |
| ♂              | 13  | 6   | 12 II | 1                                    | 13 | 48              |
| ♂              | 16  | 28  | 36 ♀  | 1                                    | 7  | 24              |
| 24             | 6   | 44  | 20 ☊  |                                      | 42 | 40              |
| h              | 21  | 5   | 20 ☋  | 1                                    | 5  | 40              |

G g 6

• Ces

Ces Nœuds comparés à ceux de 1734, de la Table (A), donnent le mouvement pour 100 ans, comme il paroît par la même Table (C), d'où le mouvement annuel se déduit :

|        |         | par les Tables modern. | Difference. |
|--------|---------|------------------------|-------------|
| pour ♀ | 51" 12" | 1' 25" 0"              | 33" 48" —   |
| ♀      | 44 20   | 0 46 0                 | 1 40 —      |
| ♂      | 40 30   | 0 37 0                 | 3 30 +      |
| ♂      | 25 36   | 0 14 0                 | 9 36 —      |
| ♂      | 39 24   | 1 12 0                 | 32 36 —     |

Parmi ces mouvemens annuels déduits de l'hypothese des Nœuds fixes, & de la diminution d'obliquité de l'Ecliptique, ceux de Vénus & de Mars s'accordent à ce qui en a été déterminé ci-devant par les Astronomes, en conséquence des observations immédiates: je puis donc supposer qu'à l'égard de ces deux Planetes cette théorie de leurs Nœuds est vraie, puisque ce que j'en déduis s'accorde avec les observations. Il ne paroît pas qu'il en soit de même des Nœuds de Mercure, Jupiter & Saturne.

Les Tables astronomiques les plus estimées donnent de mouvement annuel au Nœud de Mercure 1' 25", & je ne le trouve que de 51" 12"; la difference est presque de 34", ce qui est fort considérable. Mais il est certain que l'on a pris jusqu'à présent ce mouvement beaucoup plus prompt qu'il n'est en effet; le moyen de s'en convaincre est de comparer la Conjonction écliptique de cette Planete avec le Soleil, observée en 1723, avec une semblable observée en 1631 par Gassendi: il en

en résulte un mouvement annuel de  $1' 16''$ , déjà plus petit de  $9''$  que celui des Tables astronomiques. Mais si, au-lieu de l'observation de Gassendi qui ne fut pas complète, on compare celle de 1723 à celle qui fut faite en 1690, l'une & l'autre avec exactitude & par les Astronomes de l'Académie, on trouvera, comme M. Cassini l'a rapporté dans nos Mémoires de 1723, que ce mouvement annuel n'est que de  $53''$ , à moins de  $2''$  près du mien.

De même je donne au Nœud de Jupiter un mouvement annuel de  $25'' 36''$ ; les Astronomes modernes ne lui en donnent que  $14''$ , je ne fais sur quel fondement: car si nous employons à cette recherche la méthode ordinaire, qui est de comparer deux lieux du même Nœud dans des tems fort éloignés, nous trouverons le mouvement que je lui attribue confirmé. La conjonction de Jupiter avec une Etoile fixe de la constellation du Cancer, observée 241 ans avant J. C. & rapportée par Ptolémée, est la plus célèbre & la plus propre pour ce dessein. Feu M. Maraldi \* qui a calculé lui-même cette observation, en a conclu que le Nœud de Jupiter étoit alors en  $24^{\circ} 43' II$ : mais le même M. Maraldi trouva ce Nœud en 1693 en  $7^{\circ} 20' 6''$ . Donc en 1934 ans le Nœud avoit avancé suivant l'ordre des Signes, de  $12^{\circ} 37'$ , ce qui donne pour le mouvement annuel  $23'' 30''$ , à  $2'' 6''$  près de ce que j'ai déterminé.

Enfin, j'ai donné au Nœud de Saturne un mou-

\* Mémoires de l'Acad. 1706.



mouvement annuel de  $39'' 24''$ , au-lieu qu'on le croit communément de  $1' 12''$ , près de  $33''$  plus grand. Je me fers encore ici d'un examen fait par M. Maraldi \* des observations anciennes. Par celles de Tycho faites en 1592, lorsque Saturne étoit proche de son Nœud, ce Nœud se trouve en  $21^{\circ} 6'$ . M. Maraldi le trouva en 1696 en  $22^{\circ} 10'$  du même Signe. Donc en 104 années il avoit eu un mouvement direct de  $1^{\circ} 8'$ , ce qui donne pour le mouvement annuel  $39'' 15''$ , à  $10''$  près de ce que j'ai trouvé.

Si l'on compare de même ce qu'en dit † Ptolémée en des termes fort généraux, avec l'observation de 1696, on trouvera ce mouvement annuel seulement de  $12''$  plus grand que par les observations de Tycho; mais comme il n'y a aucune précision dans ce qu'en dit Ptolémée, on ne doit pas s'y arrêter.

Or il faut remarquer, & cela est visible, que ce mouvement des Nœuds des Planetes ne doit pas être recherché par les observations anciennes comparées aux modernes: car comme il n'est que relatif & occasionné par le mouvement de l'Ecliptique en déclinaison, qui va couper l'orbite des Planetes en differens points, il suit que ce mouvement ne doit pas être le même en differens intervalles de tems. Il n'y a que Jupiter & Saturne, mais le premier principalement, pour lesquels cette méthode puisse être d'usage, à cause de la situation particuliere de leur Nœud proche du commencement de l'Ecrevisse, & à cause.

\* *Mém. Acad.* 1704.† *Almagest.*



cause de leur peu d'inclinaison. Mefcure, par exemple, dont l'inclinaison est fort grande, n'a son Nœud qu'au 15<sup>e</sup>. degré du Taureau; c'est pourquoi les observations les moins éloignées sont les plus propres pour trouver les mouvemens de ses Nœuds.

En général, on voit bien que ces mouvemens seront inégaux en différens tems, & par conséquent plus les observations seront éloignées, plus elles donneront d'inégalités, à moins que le mouvement annuel ne soit si petit que ces inégalités deviennent en quelque façon insensibles; & c'est ce qui arrive particulièrement dans le Nœud de Jupiter dont le mouvement annuel est le moindre.

Cette théorie au contraire est fort commode & fort exacte pour représenter la position des Nœuds dans les tems les plus reculés. Par exemple, elle donne très bien le lieu du Nœud de Jupiter pour l'année 241 avant J. C. tel qu'il a été calculé par M. Maraldi sur l'observation rapportée par Ptolémée. L'intervalle entre ce tems-là & le nôtre, étant de 1975 ans, le mouvement de précession des Equinoxes a été de  $27^{\circ} 50' 31''$ : c'est pourquoi si l'Ecliptique eût toujours eu la même obliquité qu'aujourd'hui, le Nœud de Jupiter supposé fixe & à présent en  $7^{\circ} 27' 00''$ , eût été alors en  $20^{\circ} 23' 31''$  II; mais à cause du changement d'obliquité de 1' en 90 ans, son obliquité étoit alors de  $23^{\circ} 50' 17''$ , d'où l'on conclut que le Nœud de Jupiter étoit aussi alors en  $25^{\circ} 28' 30''$  II. L'observation calculée le donne en  $24^{\circ} 43'$  du même Signe; la

la difference n'est que de  $45' \frac{1}{2}$  dont la théorie le donne trop avancé.

Si l'obliquité ne diminue que d'une minute en 100 ans, comme M. de Louville l'a pensé, le Nœud se trouvera en  $23^{\circ} 48' 38''$  II, moins avancé de  $54' 22''$  que par le calcul tiré de l'observation; d'où l'on voit qu'afin de représenter parfaitement cette observation, telle qu'elle a été calculée par M. Maraldi, il suffiroit de supposer que l'obliquité de l'Ecliptique change d'une minute en 94 ans.

Si l'on examine maintenant de quelle manière la théorie communément reçue du mouvement des Nœuds de Jupiter, & les Tables astronomiques les plus exactes, représentent cette observation, on verra que celles de M. de la Hire, par exemple, mettent alors ce Nœud en  $29^{\circ} 35' 15''$  II, à presque  $5^{\circ}$  de l'observation; tandis que selon les mêmes Tables, le Nœud de Jupiter ne parcourt ces cinq degrés à l'égard des points équinoctiaux qu'en près de 1250 ans.

Cet accord si singulier entre les conséquences tirées de la diminution d'obliquité de l'Ecliptique pour la théorie des Nœuds des Planètes, & celles qui ont été déduites des observations, sans égard à cette vue, prouve qu'en effet l'Ecliptique s'approche, & non pas l'Equateur; car en supposant d'abord, comme j'ai fait, les Nœuds fixes, & que ce soit l'Equateur qui s'approche de l'Ecliptique, ces Nœuds n'auront d'autre mouvement que celui que nous remarquons dans les Etoiles fixes. Ils avanceront donc tous également, &

& de  $1^{\circ} 24' 35''$  en 100 ans; mais les observations & les Tables astronomiques leur donnent un mouvement fort différent dans le même tems, par rapport aux Equinoxes, plus grand aux uns, & moindre aux autres. Il s'ensuivroit donc que les Nœuds seroient mobiles, rétrogrades dans certaines Planètes, comme Vénus, Mars & Jupiter, & directs dans les deux autres, Mercure & Saturne; ce que je ne crois pas devoir être admis sans de bonnes preuves. La maniere dont je conçois ces mouvemens fournit peut-être encore l'explication d'un phénomène qui a paru mériter attention. M. de Fontenelle l'expose ainsi dans l'Histoire de l'Académie de 1706.

„ Le mouvement des Nœuds des Planètes  
„ pourroit bien n'avoir pas toujours la même direction, mais rétrograder quelquefois, & avoir des especes de vibrations régulières. A l'égard de la Lune (continue M. de Fontenelle) cela est constant; M. de la Hire croit en être sûr pour Saturne; peut-être dans les autres Planètes, les irrégularités du mouvement des Nœuds sont-elles moins sensibles.

\* On a cru remarquer à-peu-près la même chose dans les Nœuds de Vénus; mais cela ne vient que de ce qu'on a trouvé le mouvement annuel, par des observations fort proches, plus petit que celui qu'on trouvoit par d'autres observations plus éloignées, comme il a dû arriver en effet suivant ma théorie.

A l'égard des inclinaisons des Orbites, elles varient.

\* *Mémoires de l'Acad. tome X. p. 213.*

varieront aussi un peu, mais je ne trouve pas de difference sensible entre l'inclinaison de 1734, & celle de 1634; il n'y a que Mercure où cette difference va à 1' 12". Il faudra toujours y faire attention dans la suite.

Puisque les hypotheses que j'ai faites ci-dessus, & que les calculs que j'en ai déduits, s'accordent si bien avec les observations, je crois pouvoir en tirer les quatre conséquences suivantes.

1°. Que l'obliquité de l'Ecliptique diminue.

2°. Que ce mouvement se fait sur les deux points des Equinoxes.

3°. Que c'est l'Ecliptique qui s'approche de l'Equateur.

4°. Enfin, Que les Nœuds des Planetes n'ont aucun mouvement propre, mais qu'ils paroissent avancer suivant la suite des Signes, inégalement en differens tems.

\* Quelques Astronomes avoient déjà soupçonné ces Nœuds fixes, mais sans autre fondement, du moins que je sache, que le peu de difference du mouvement de ces Nœuds à celui des Etoiles fixes, ou de la précession des Equinoxes. Ici ces quatre points se lient naturellement ensemble, & paroissent aussi bien prouvés que le comporte la nature des connoissances astronomiques. On verra une autre fois l'effet qui résulte de ces mêmes hypotheses pour le mouvement des Aphélie. Je n'ai voulu examiner ici que les Nœuds,

&

\* *Sireet. Astron. Carolin. p. 34. & ad Lect. edit. Noriberg.*

*Whiston Prel. Astron. p. 194.*

& même le Nœud ascendant seulement ; car le Nœud descendant pourroit bien , en suivant la même loi , n'avoir pas les mêmes nombres , & il n'est pas sûr que les Nœuds d'une Planète soient opposés l'un à l'autre. Dans Saturne & dans Vénus , il semble par quelques observations faites depuis un siècle & demi , que la ligne des Nœuds ne passe pas par le Soleil ; mais c'est une chose à examiner dans la suite , & ce que j'ai dit ici des Nœuds en général , fera fort utile à cet examen.



## SIXIEME MEMOIRE

### SUR L'ELECTRICITE.

*Où l'on examine quel rapport il y a entre l'Electricité, & la faculté de rendre de la Lumière, qui est commune à la plupart des corps électriques ; & ce qu'on peut inferer de ce rapport.*

Par M. DU FAY.

**J**E ne parlerai point dans ce Mémoire , de tout ce qui se trouve dans un grand nombre d'Auteurs sur la Lumière des corps électriques ; il me faudroit pour cela remonter à ces tems où la Physique remplie de fables admettoit des pierres précieuses qui rendoient dans l'obscurité une lumière égale à celle d'un flambeau allumé. Beaucoup d'exagération , des faits véritables , mais mal rédigés , & quelques circonstances omises dans le

le récit de ces faits, ont vraisemblablement donné lieu à ces récits merveilleux, dont on a embelli la description de l'escarboucle & des autres pierres de semblable nature.

Nous nous en tiendrons à des expériences plus récentes, & à des faits plus positifs, & nous n'examinerons la Lumière qu'entant qu'elle sera liée à l'Électricité, sans parler des autres phosphores qui n'y ont point de rapport, ou du moins dans lesquels nous n'y en connoissons point. Otto de Guerike\* que nous avons cité fort au long dans le premier Mémoire, a remarqué que la boule de soufre sur laquelle il a fait un si grand nombre d'expériences singulières par rapport à l'Électricité, étoit lumineuse lorsqu'elle étoit frottée dans l'obscurité.

Boyle a fait un petit Ouvrage intitulé *Adamas lucens*, dans lequel il y a plusieurs faits singuliers. Mais celui de tous qui a traité cette matière avec le plus d'exactitude, est Hauksbee; & comme son objet principal étoit de considérer la lumière des corps par rapport à leur électricité, nous allons donner une idée des principales expériences qu'il a faites à ce sujet. J'ai eu tant d'attention à citer dans mes Mémoires précédens sur l'Électricité, & principalement dans le premier de tous, les Auteurs desquels j'ai tiré quelques expériences, que je croyois être à l'abri de tout reproche à cet égard; cependant j'ai appris que quelques personnes, sur les lectures que j'ai faites dans les Assemblées publiques, ont

ju



jugé que j'avois eu deſſein de m'attribuer les découvertes de pluſieurs Auteurs: je réitere donc aujourd'hui les proteſtations que j'ai faites à ce ſujet dans mon troiſieme Mémoire. Comme j'ai entrepris de traiter avec quelque détail une matiere qui juſqu'à préſent ne l'avoit été qu'imparfaitement, & pour ainſi dire, en paſſant, par divers Auteurs, j'ai été forcé d'employer les expériences de ceux qui m'ont précédé; mais ce n'a jamais été dans la vue de me parer de ce qu'elles ont de neuf & de ſingulier, puisſque j'ai toujours cité les Auteurs d'où je les ai tirées: ſ'il y en a d'autres que j'aye cru m'être propres, & qui ſe trouvent dans quelques Auteurs dont je n'aye pas eu connoiſſance, on me feroit injuſtice de croire que j'ai voulu cacher la ſource d'où je les ai tirées, & je puis aſſurer que mon ſilence ne viendra que de ce que je les aurai ignorés; car je n'ai pas même négligé de rendre la juſtice qui étoit dûe aux perſonnes qui m'ont donné verbalement quelques avis dont j'ai profité, & je ſuis perſuadé que cette juſtice que l'on rend fait infiniment plus d'honneur que n'en pourroit faire la découverte même. Après cette courte apologie que j'ai cru néceſſaire, je reviendrai aux expériences d'Hauksbee.

\* Il a frotté dans le vuide ſur une étoffe de laine une boule de verre creuſe, elle a donné d'abord une belle lumière pourpre, qui a blanchi & diminué d'éclat à meſure qu'il a laiſſé rentrer l'air dans le récipient. Ce qu'il

y

\* *Eſper. Fiſicometan. in Firenz. 1716. p. 19.*

y a de très singulier , c'est que refaisant la même expérience une seconde fois avec la même boule de verre, cette lumière pourpre n'a pas paru; mais ayant repris une autre boule, elle donna pour la première fois seulement, une semblable lumière, après quoi elle fut toujours blanche comme il étoit arrivé avec la première boule: en sorte qu'il paroît que le verre peut s'épuiser de la matière propre à produire cette lumière purpurine, au-lieu que toutes les autres expériences concourent à prouver que le verre, ainsi que tous les autres corps électriques, ne diminuent point de vertu, quelque nombre de fois & quelque tems qu'ils aient été frottés.

Il a imbibé ensuite, premièrement d'esprit de vin & ensuite de dissolution de nitre, la laine sur laquelle se faisoit le frottement, pour voir si cela apporteroit quelque changement à l'expérience; mais cela n'a pas empêché la lumière de paroître en forme d'éclairs: il est vrai que le mouvement qu'il imprimoit à la boule de verre, étoit si rapide, que la laine en étoit échauffée au point d'être brûlée.

\* Le globe dont nous avons parlé dans les Mémoires précédens, étant vuide d'air & tourné rapidement sur son axe, devient très lumineux dans tout son intérieur, lorsqu'on appuye légèrement la main sur sa surface extérieure, & la lumière n'en est ni plus considérable ni plus vive lorsqu'on appuye la



la main beaucoup davantage , & que par conséquent le frottement devient plus fort : cette lumière est dans le même cas que nous avons déjà remarqué à l'égard du tuyau ; il n'en sort point de ces parties brillantes qui s'attachent aux corps voisins , comme il arrive lorsque l'intérieur du globe ou du tube est rempli d'air dans son état naturel ; & ce qui est assez singulier , c'est que dans l'un ni dans l'autre cas , la chaleur du tube n'augmente pas sensiblement sa lumière\*.

M. Hauksbee a ajusté l'un dans l'autre deux récipients cylindriques , en sorte qu'au moyen de deux différentes roues † , semblables à celle que nous avons décrite dans le premier Mémoire , on pouvoit les faire tourner séparément ou ensemble , soit du même sens , soit en sens contraire ; il y avoit aussi un robinet ajusté à chacun de ces récipients , pour pouvoir pomper l'air de l'un indépendamment de l'autre ; & il a remarqué que si l'on pose la main sur le récipient extérieur , tandis qu'il est tourné rapidement , la lumière qui en sort va s'appliquer sur la surface du récipient intérieur , mais que cette lumière est beaucoup plus vive si les deux récipients tournent à la fois , soit que ce soit du même sens , ou en sens contraire. La même chose arrive , quoique le récipient intérieur soit vuide d'air. On peut voir dans l'Auteur même tout le détail de cette expérience , si l'on n'en a pas une idée assez claire par la description abrégée.

\* Page 46.

† Page 55.

abrégée que je viens d'en faire; mais je n'aurois pas pu l'expliquer plus nettement, sans copier tout ce qui est dans le Livre même. Ce sont-là les principales expériences qu'a fait M. Hauksbee sur la lumière des corps dont l'électricité est celle que nous avons appelée *vitree*; voici maintenant celles qu'il a faites sur ceux de l'électricité résineuse, ou sur les uns & les autres compris &, pour ainsi dire, confondus dans la même expérience.

\* Il a frotté très rapidement dans le vuide une boule d'ambre sur de la laine; elle a donné une belle lumière, & beaucoup plus vive & plus abondante qu'elle n'avoit fait étant frottée dans l'air libre aussi fortement & avec la même vitesse. † Le soufre frotté dans l'air libre lui a donné très peu de lumière, & dans le vuide il n'y en a eu aucune.

‡ Un cylindre de gomme-laque tournant rapidement sur son axe dans l'air libre, a donné beaucoup de lumière lorsqu'il a appliqué dessus un morceau de flanelle; mais il en a donné beaucoup davantage lorsque ç'a été la main: cette lumière partoît de l'endroit où se faisoit le frottement, & se répandoit sur tout le cylindre; elle disparoissoit dans l'instant que le mouvement cessoit, & il ne se détachoit point de ces parties brillantes, qui dans les expériences faites avec le verre, vont s'appliquer sur les corps voisins. La lumière produite par le frottement du même cylindre sur la laine dans le vuide, étoit beaucoup

coup plus vive que dans l'air libre; en sorte qu'il a remarqué dans la gomme-lacque presque tous les phénomènes qu'il avoit observés dans l'ambre.

Voici maintenant une expérience qui tient aux deux électricités combinées ensemble, & qui, suivant qu'elle est décrite par M. Hauksbee, paroît un des plus étranges paradoxes qui se puisse imaginer en Physique. Il a pris un globe de verre \* de six pouces de diamètre, qu'il a enduit intérieurement de cire d'Espagne, à l'exception des Poles où il avoit réservé un espace de 3 ou 4 pouces sans y mettre de cire; en ayant ensuite pompé l'air, & l'ayant ajusté sur la machine ou tour dont nous avons parlé, il fit les observations suivantes. A peine y eut-il appliqué la main pour occasionner le frottement, qu'il apparut, malgré l'obscurité, l'image & la figure distincte de toutes les parties de sa main peinte sur la surface concave & intérieure de la cire d'Espagne, en sorte que cette cire sembloit être devenue transparente, & qu'on peut même dire qu'elle l'étoit réellement; car il voyoit sa main précisément comme s'il n'y eût eu que le verre seul sans aucun enduit de cire d'Espagne: il a observé de plus que la cire n'étoit pas moins transparente dans les endroits où l'enduit étoit plus épais, que dans les autres; elle l'étoit pareillement dans quelques parties qui s'étoient un peu écartées du verre en se refroidissant, mais la lumière étoit moins vive en ces endroits que dans

\* Page 107.

Mém. 1734.

dans le reste du globe. Cette transparence qui faisoit que la main appliquée extérieurement sur le globe paroïssoit peinte en-dedans, étoit d'une espece singuliere, car on ne voyoit pas cette image de la main en regardant sur les endroits du globe enduits de cire, il falloit regarder dans l'intérieur du globe par les deux endroits où il n'y avoit point de cire, & alors on voyoit distinctement l'image de la main peinte sur la cire de la maniere que nous venons de le décrire. La couleur de cette lumiere étoit la même que s'il n'y eût eu que le verre seul; mais ayant laissé rentrer dans le globe un peu d'air, la lumiere cessa de paroître dans les parties enduites de cire, & continua dans celles où il n'y avoit que le verre seul.

Voilà les principales expériences que j'ai trouvées dans les Auteurs sur la lumiere des corps électriques, car je ne parle point des phosphores qui sont en très grand nombre, mais qui n'ont aucun rapport à l'électricité; je considère uniquement la raison que peuvent avoir entre elles ces deux propriétés singulieres: & pour suivre dans cet examen le même ordre que dans les autres Mémoires, je considérerai séparément les deux especes d'électricité dont j'ai reconnu & démontré l'existence, & je vais commencer par rapporter quelques observations sur la lumiere des corps électriques résineux.

Si l'on prend un morceau d'ambre, de gomme copal, de cire d'Espagne, ou de soufre, & qu'on le frotte dans l'obscurité, il en sort de la lumiere; & ces quatre matieres m'ont

m'ont paru en donner presque également & de la même manière, lorsque les morceaux dont je me servois étoient à-peu-près de la même grosseur. Si donc on prend une boule, ou, pour plus de commodité, une pomme de canne d'ambre, & qu'on la frotte par dessus avec la main, on apperçoit entre l'ambre & la main une lumière continue pendant le frottement; mais si après l'avoir légèrement frottée deux ou trois fois, on enlève subitement la main de dessus sans la glisser, & qu'ensuite on approche le doigt du bord de cette pomme, sans même la toucher, on voit un petit cylindre d'une lumière très vive qui sort de l'ambre, va frapper le doigt, & retournant du doigt à l'ambre, se sépare sur la surface en rayons brillans disposés en forme d'éventail, & disparoît dans l'instant. Si, au lieu d'appliquer le doigt au bord de la pomme d'ambre, on le pose au milieu en-dessus, la lumière fait le même mouvement; mais en retournant du doigt sur l'ambre, les rayons se disposent en soleil, qui a pour centre l'endroit où le doigt a été appliqué.

Lorsque j'ai répété cette expérience plusieurs fois de suite, il est souvent arrivé qu'il n'étoit pas nécessaire de frotter l'ambre pour exciter cette lumière, & qu'il suffisoit de frapper dessus un peu fortement avec la main, & de la relever brusquement sans la glisser sur l'ambre. Quelquefois, au contraire, la lumière ne paroissoit que difficilement en frottant avec la main, & en ce cas je me servois d'un morceau d'étoffe de laine, & l'expérience réussissoit de la même manière lorsque j'ap-



prochois le doigt. Il y a toute apparence que ces variétés dépendent de quelque humidité ou graisse qui se rencontre dans la main, car j'ai souvent vu que je ne pouvois exciter de la lumiere avec le creux de la main, tandis qu'avec la paume ou le bout des doigts, cela réussissoit parfaitement. Lorsqu'on trouve de ces sortes de difficultés, le plus court est de se servir d'une étoffe de laine ou de soye, car en s'obstinant à frotter avec la main on s'échauffe, & cela nuit d'autant à la réussite de l'expérience.

Voici maintenant quelques circonstances qui accompagnent cette expérience, qui n'ont point encore été observées, & qui méritent attention. Lorsque la pomme d'ambre a été frottée, j'ai quelquefois attendu jusqu'à deux minutes pour en approcher le doigt, & l'éclat de lumiere s'est fait à l'ordinaire; mais il a été moins vif, & lorsque j'ai attendu plus longtems, il ne s'en est point fait du tout. Si au-lieu d'approcher de l'ambre frotté le doigt ou la main, je me servois d'un morceau de laine, de soye, de papier, ou de quelque autre corps semblable, il ne sortoit de l'ambre aucune lumiere, ou s'il en paroisoit quelquefois, elle étoit si foible qu'on avoit peine à l'appercevoir. La même chose arrivoit lorsque j'approchois de l'ambre un autre morceau d'ambre, de copal, de souphre, &c. Ce sont donc les corps électriques, ou plutôt ceux qui ont le plus de disposition à le devenir, qui ne font point sortir de l'ambre frotté cette lumiere qui paroît si l'on en approche le doigt: on voit combien

ce

ce fait a de rapport avec la plupart des expériences que nous avons décrites dans les Mémoires précédens. Nous y avons vu que les corps les plus propres à devenir électriques par eux-mêmes, étoient ceux qui le devenoient le moins par communication: ici ces mêmes corps ne font point sortir la lumière des corps électriques résineux, tandis que les autres le font, même sans y être appliqués immédiatement.

Pour que le rapport fût exact, il falloit que la foye, la laine, l'ambre & les autres corps semblables étant mouillés, c'est-à-dire, étant dans la disposition la plus contraire à l'électricité, il falloit, dis-je, qu'ils fissent le même effet que le doigt; c'est effectivement ce qui arrive, & lorsqu'après avoir frotté de l'ambre, de la copal, du souphre, &c. j'en ai approché quelqu'un de ces mêmes corps, ou quelque corps que ce soit, mouillé, il en est sorti l'éclat de lumière de même que si j'en avois approché le doigt ou la main. Enfin les métaux rendent l'analogie entièrement complete. Nous avons vu par les Mémoires précédens, que les métaux sont les corps les moins propres à devenir électriques par eux-mêmes, & qu'en même tems ce sont ceux qui le deviennent le plus facilement par communication; ils doivent donc par cette même raison faire sortir la lumière des corps électriques: c'est en effet ce qui arrive, & il m'a paru que le choix des métaux étoit à-peu près indifférent. Mais l'expérience la plus frappante en ce genre, est de frotter un morceau de copal ou autre corps semblable, &

d'en approcher ensuite une canne à pomme d'ambre; on voit que si l'on applique l'ambre sur la copal, il n'en sort point de lumière, & qu'elle paroît ensuite si l'on en approche la virolle d'or ou d'autre métal qui joint la pomme à la canne; car il est à remarquer que lorsque le corps électrique est frotté de manière à pouvoir donner de la lumière, si on le touche avec une de ces matières que nous avons reconnu n'être point propres à la faire paroître, cela ne le dépouille pas de la faculté de donner de la lumière, & qu'elle paroît aussi-tôt qu'on vient à en approcher le doigt, un métal, &c. en sorte que l'on peut encore ajouter aux principes que nous avons établis, celui-ci : Que les corps résineux ayant été rendus électriques par le frottement, si l'on en approche les corps les moins propres à devenir électriques, ils en font sortir de la lumière, & qu'au contraire les électriques résineux ne le font point.

Quoique j'aye parlé en général de tous les corps dont l'électricité est résineuse, il s'en faut beaucoup néanmoins que la lumière qu'ils rendent soit accompagnée des mêmes circonstances, & il y a sur ce sujet plusieurs observations curieuses à faire: mais ce détail qui seroit immense, & qui paroîtroit aujourd'hui de peu d'importance, deviendra vraisemblablement un jour plus facile, & peut-être fort intéressant, lorsque cette matière sera connue plus parfaitement.

On peut dire la même chose des corps, dont l'électricité est celle que nous avons appelée *vitree*; quoiqu'ils fassent tous à-peu-près



près les mêmes effets par rapport à l'électricité, & qu'il n'y ait presque de différence que par le plus ou le moins de force de cette vertu, les phénomènes qui les accompagnent par rapport à la lumière sont très différens. Ceux dont la vertu électrique est foible, ne rendent point de lumière, ou du moins elle est si peu considérable, qu'elle ne subsiste que dans le frottement, & en ce cas la matière dont on se sert pour frotter, empêche qu'on ne l'aperçoive. Mais comme nous savons que la faculté de rendre de la lumière est une suite assez ordinaire de l'électricité, & que nous avons vu dans le premier Mémoire que tous les corps solides, ou qui peuvent être frottés, sont capables d'électricité, on peut conjecturer qu'ils le sont aussi de rendre de la lumière : mais ce fait n'est pas assez important en lui-même, pour qu'on se donne toute la peine qui seroit nécessaire pour le vérifier; il nous reste un assez grand nombre de faits curieux à observer dans les corps dont la lumière peut être très sensiblement excitée, pour que nous puissions négliger ceux-là, ou du moins les remettre à un autre tems.

Nous avons parlé dans les Mémoires précédens, de la lumière que rend le verre dans différentes expériences, nous en dirons encore quelque chose dans la suite; mais je dois commencer par les pierres précieuses qui me paroissent, à proportion de leur volume, être plus lumineuses que toutes les autres matières que j'ai essayées. Je n'en ai trouvé aucune qui ne rendît de la lumière étant frottée, mais avec des variétés dont il m'a été

impossible de démêler la cause, parce que souvent elles se rencontrent dans des pierres de même nature & de même espece. J'ai, par exemple, trouvé des diamans, qui pendant qu'on les frottoit sur une étoffe de laine, ou autre matiere semblable, paroissoient entourés d'une lumiere tranquille qui les suivait dans tout le mouvement qu'on leur donnoit, & qui disparoissoit si-tôt qu'on cessoit de les frotter. D'autres ne sont pas sensiblement lumineux tandis qu'on les frotte; mais si, après les avoir frottés, on vient à glisser le doigt ou l'ongle dessus, on en voit sortir de petites étincelles brillantes. Il y en a sur lesquels il suffit de passer le bout du doigt, & qui à chaque fois qu'on le passe, donnent une lumiere douce & tranquille, sans éclats ou étincelles, qui semble suivre le doigt, & s'évanouit si-tôt qu'il ne touche plus la pierre. D'autres en les frottant de la même maniere, conservent cette lumiere 4 ou 5 secondes; en sorte que recommençant à passer le doigt dessus, lorsque leur lumiere s'affoiblit, ils paroissent donner une lumiere presque continue & uniforme. Enfin il y en a qui frottés sur la laine, la soye, &c. s'impregnent d'une lumiere qu'ils conservent pendant plusieurs minutes. On trouve dans l'Histoire de l'Académie de l'année 1707 \*, diverses expériences faites par M. Bernoulli & M. Cassini, sur plusieurs corps durs frottés contre le verre & les diamans; mais ces observations n'ont aucun rapport à l'électricité, ainsi nous n'en par-

parlerons point présentement. Si l'on examinoit un plus grand nombre de diamans, peut-être y trouveroit-on encore d'autres variétés; mais comme on ne finiroit point si on vouloit s'arrêter à toutes les circonstances qui méritent attention, je vais seulement rendre compte de quelques faits que Boyle rapporte dans le Traité intitulé *Adamas lucens*, dont nous avons parlé plus haut, & qu'il a observés sur un diamant qu'il croyoit alors être le seul qui eût cette propriété; il en a cependant trouvé d'autres depuis qui faisoient à-peu-près le même effet, mais il dit en avoir essayé plusieurs inutilement, ainsi que le crystal de roche: cependant j'ai observé que le crystal de roche, & tous les diamans & autres pierres précieuses transparentes, ont donné de la lumière de quelqu'une des manières dont je viens de parler à l'égard des diamans.

Le diamant dont s'est servi M. Boyle étoit long de 4 lignes & un peu moins large, il avoit une table assez grande, il étoit d'ailleurs d'une vilaine eau, & avoit un nuage blanchâtre qui occupoit environ le tiers de la pierre: il l'examina au microscope, & n'y trouva rien de singulier.

Ce diamant conservoit sa lumière après avoir été frotté, en sorte que l'agitant dans l'obscurité avec vitesse, on voyoit une trainée de lumière continue; étant exposé de fort près à la flamme d'une bougie, & ensuite transporté dans l'obscurité, il conservoit une lumière sensible, mais plus foible que celle qui étoit excitée par le frottement. J'ai ten-

Hb 5.

té.

ré cette expérience sur un grand nombre de diamans, & j'en ai trouvé plusieurs qui faisoient le même effet, & dont quelques-uns ont conservé dans l'obscurité une lumière sensible pendant plusieurs minutes.

M. Boyle a observé de plus, qu'appliquant ce diamant sur un fer chaud, ou le tenant quelque tems pressé sur sa main, ou quelque autre partie de son corps échauffée, il rendoit un peu de lumière, mais très foible. Ayant essayé si le diamant, après avoir été rendu lumineux par quelqu'un de ces moyens différens du frottement, avoit contracté quelque vertu électrique, il a trouvé qu'il n'en avoit aucune : ce qui semble prouver que cette lumière est d'une autre nature que celle qui accompagne l'électricité que nous avons appelée vitrée.

Il a aussi cru remarquer quelque différence dans la vivacité de la lumière de ce diamant, suivant la couleur de l'étoffe sur laquelle il étoit frotté, en sorte qu'elle étoit plus brillante sur une étoffe blanche que sur une noire. La lumière étoit pareillement excitée en le frottant sur divers autres corps, comme du bois, de la fayence, de la corne, &c.

Ayant rendu ce diamant lumineux par le frottement, il l'a plongé dans l'eau, & ensuite dans diverses autres liqueurs, comme l'esprit de vin, les esprits acides, les liqueurs alkalines, &c. & il y a conservé sa lumière; mais ayant tenté de l'exciter sous l'eau même, en y plongeant un morceau de bois, & frottant le diamant dessus, il n'a pas pu y réussir :

réussir : il a aussi observé que lorsqu'il avoit été mouillé , il falloit le frotter beaucoup plus longtems pour exciter sa lumiere ; cependant il lui est quelquefois arrivé de le rendre un peu lumineux en le tenant quelque tems plongé dans l'eau chaude.

Il a éprouvé qu'on pouvoit exciter sa lumiere sans le chauffer, ni le frotter, en le pressant fortement sur un morceau de fayence, ou en appuyant brusquement un poinçon d'acier contre la table du diamant ; mais il est aisé de juger que toutes ces manieres de le rendre lumineux, ne le faisoient point devenir électrique : ce qui prouve de plus en plus la difference que nous avons déjà supposée entre la matiere de l'électricité & celle de cette espece de lumiere.

J'ai fait avec soin la plupart de ces expériences, & elles m'ont toutes réussi à-peu-près de la même maniere qu'à M. Boyle, avec cette difference, que je n'ai jusqu'à présent trouvé aucun diamant qui ne rendît de la lumiere étant frotté ; toutes les autres pierres précieuses que j'ai essayées en ont rendu aussi, ainsi que je l'ai déjà dit. Mais le plus ou moins de lumiere ne dépend ni de la beauté, ni de la grosseur de la pierre : j'ai frotté pendant assez longtems deux très gros diamans de l'eau la plus belle & la plus seche, ils n'ont pris qu'une lumiere assez foible qu'ils ont conservée pendant très peu de tems, mais qu'ils n'ont pas perdue en passant dessus un linge mouillé ; ils n'avoient l'un & l'autre qu'une très médiocre électricité : un troisieme diamant d'une aussi belle eau, mais taillé d'une

façon extraordinaire, qu'on nomme à *l'Indienne*, ou *en puits*, étoit très lumineux pour peu qu'on le frottât, il étoit aussi très électrique; cependant je ne connois entre ces diamans d'autre difference que celle de la taille, les deux premiers ayant une très grande table, & le dernier l'ayant fort petite, mais étant très élevé & très profond. Je n'ai pas osé chauffer les deux premiers à la flamme, craignant de ne les pas chauffer assez également à cause de leur grande étendue, & qu'il ne leur arrivât quelque accident; mais je juge par l'analogie des autres expériences que j'ai faites, qu'ils n'auroient contracté que très difficilement de la lumière, & qu'en ce cas même elle auroit été très foible: mais j'ai chauffé le troisieme à la flamme d'une bougie, & l'ayant transporté dans l'obscurité, il a paru entouré d'une lumière très vive & à peu-près semblable à celle des vers luisans. La même chose est arrivée à un petit diamant bleu, & à un diamant jauné d'une grosseur assez considérable: mais cette sorte de lumière n'ayant aucun rapport à l'électricité, puisque tous ces diamans dans le tems qu'ils rendoient le plus de lumière, n'avoient aucune attraction sensible, je me contenterai de dire présentement que plusieurs diamans, quelques pierres précieuses, le crystal de roche, & plusieurs autres corps qu'on ne s'aviserait pas de soupçonner, étant exposés à la flamme, ou à la chaleur, ou au Soleil, ou même à la seule lumière du jour, quoiqu'à l'ombre du Soleil, ainsi que je l'ai éprouvé, y acquierent une lumière qu'ils conservent dans l'obscurité pendant.

dant un tems assez considérable. Ce Phénomene nouveau mérite une attention particulière, & peut faire le sujet d'un travail très curieux; mais qui ne paroît pas avoir de rapport à l'objet actuel de nos recherches. Les Auteurs qui ont dit que certaines pierres précieuses, & en particulier le diamant, étoient dans l'obscurité, étoient peut-être beaucoup mieux fondés qu'on ne l'a cru jusqu'à présent. Qu'une personne ayant demeuré quelque tems dans un lieu obscur, & ayant par conséquent la prunelle fort dilatée, y ait vu apporter un diamant qui auroit été exposé pendant quelques minutes au Soleil, ou à quelque autre chaleur équivalente, ou simplement à la lumière du jour; elle aura certainement vu ce diamant lumineux; & comme ç'aura été sans dessein que ce diamant aura été exposé au Soleil, ou à la lumière, on n'aura pas imaginé d'attribuer ce fait singulier à une cause aussi légère; on aura pensé, ou que les diamans sont lumineux par eux-mêmes, ou que c'en est une espèce particulière à laquelle on a donné le nom d'escarboucle, dont par la suite on a embelli la description & exagéré les propriétés.

J'ajouterai encore, que si quelqu'un veut tenter ces expériences sur le peu que j'en ai dit, il y trouvera des variétés surprenantes, dont il n'est pas tems de donner maintenant l'éclaircissement; j'ai voulu seulement indiquer les principaux faits sur lesquels je compte fonder quelque jour un nouveau travail, & tâcher en même tems de faire naître à quelqu'un l'envie d'y travailler aussi de son côté, per-



suadé que rien n'est plus propre à augmenter les connoissances que nous avons en Physique, que le concours du travail de plusieurs personnes sur une même matiere. Mais il est tems de revenir à l'électricité vitrée.

J'ai essayé un grand nombre de diamans, & quoique tous aient été rendus électriques par le frottement, & qu'ils aient tous donné de la lumiere, il y a eu des differences très considérables dans leurs effets, dont il est difficile de pouvoir assigner la cause: ce que je puis seulement dire en général, c'est que les plus gros diamans, comme du poids de 70 à 80 grains, ne sont ni plus électriques, ni plus lumineux que les petits; que même la beauté & la netteté du diamant ne paroît pas y rien faire, mais la façon dont il est taillé n'est pas aussi indifférente: j'ai toujours trouvé que ceux qui sont plats & ont une grande table, sont moins électriques & moins lumineux que les brillans élevés.

Les diamans de couleur méritent une attention particuliere; de tous les jaunes que j'ai essayés, je n'en ai trouvé qu'un qui ne fût que médiocrement électrique; tous ont été très lumineux: un très beau diamant fleur de pêcher rendoit une lumiere considérable dès le premier frottement, & étoit électrique, mais moins que les jaunes: un verd n'a pris que difficilement de la lumiere, & cependant il étoit plus électrique que le précédent: un diamant bleu d'une assez grande étendue, mais rempli de points & de glaces, n'a point donné de lumiere sensible étant frotté; il en sortoit seulement quelques étincelles, lorsqu'après



qu'après l'avoir frotté on en approchoit le doigt ; cependant il étoit très électrique : enfin un diamant couleur d'améthyste faisoit les mêmes effets, tant par rapport à la lumière, que par rapport à l'électricité. J'ajouterai que tous les diamans dont je viens de parler étoient brillants : je les ai frottés sur différens corps, sans y avoir remarqué de différence bien sensible ; non plus que par rapport à la couleur de l'étoffe sur laquelle je les frotois, quoique M. Boyle dise y en avoir remarqué.

Les exemples que nous venons de rapporter suffisent pour faire voir que la faculté de rendre de la lumière n'est pas tellement dépendante de la vertu électrique, qu'il n'y ait des corps de même nature & de même espèce, dont les uns sont plus lumineux & moins électriques, & les autres au contraire plus électriques & moins lumineux ; d'où il résulte, que quoique ces deux propriétés paroissent extrêmement liées l'une à l'autre, elles ne tiennent pas cependant à la même cause ; & on peut apporter une preuve bien simple & bien décisive de cette différence, qui est, que si l'on frotte un diamant capable de devenir électrique & lumineux, & qu'après l'avoir frotté on le mouille, ou que simplement on l'humecte avec l'haleine, sa vertu électrique se trouve anéantie sur le champ, mais sa lumière subsiste aussi long-tems que s'il n'avoit point été mouillé.

J'ai fait les mêmes expériences sur toutes les espèces de pierres précieuses ; mais les variétés qui en résultent n'ont rien d'assez déterminé, pour qu'on puisse savoir s'il les faut

attribuer à la couleur, à la taille, à la dureté, ou à quelque autre cause moins connue; ainsi je n'entrerai dans aucun détail à ce sujet, & je me contenterai d'ajouter aux autres principes découverts dans les Mémoires précédens, celui-ci: Que la lumière excitée par le frottement n'est pas tellement liée à l'électricité, qu'elle ne puisse subsister lorsque cette dernière propriété est anéantie par le moyen de l'humidité.

Je ne rappellerai point ici les expériences dont nous avons parlé dans les Mémoires précédens par rapport à la lumière qui accompagne toujours l'électricité du verre; mais j'observerai que ce Phosphore si connu qui se fait en vuidant d'air un matras dans lequel il y a du Mercure, est une nouvelle preuve de la différence réelle qu'il y a entre la matière qui sert à l'électricité, & celle qui occasionne la lumière; car si l'on frotte ce matras dans l'obscurité, il devient tout à la fois électrique & lumineux; si au contraire on se contente d'agiter fortement le Mercure, il devient lumineux, comme l'on fait, mais il ne contracte pas la moindre électricité.

La lumière qui accompagne l'électricité n'est pas toujours une simple lumière; elle est quelquefois un feu réel & sensible, comme nous l'avons vu dans l'expérience que j'ai rapportée à la fin de mon troisième Mémoire; il est bon de la remettre sous les yeux en peu de mots, parce qu'elle tient à d'autres faits avec lesquels elle concourt pour l'établissement d'un autre nouveau principe.

On suspend une personne sur des cordes  
de

de foye, ou, ce qui revient au même, on le fait monter sur une planche qui est supportée par des pieds de verre, de cire, de souphre, de gomme-lacque, &c. assez élevés pour que les écoulemens électriques soient trop éloignés du plancher & des autres corps solides, pour pouvoir être détournés; on approche de cette personne le tube rendu électrique, sans néanmoins qu'il soit nécessaire de la toucher, cela suffit pour l'environner d'un tourbillon de matière électrique qui se manifeste par tous les effets rapportés dans mon troisième Mémoire. Mais celui de tous qui me paroît le plus surprenant, est que lorsqu'une autre personne approche la main de celle qui est ainsi suspendue, il sort de la partie du corps de cette dernière, la plus proche de la main qu'on en approche, une étincelle de feu accompagnée d'un bruit très sensible, & d'une lumière plus vive de beaucoup que celle qui paroît dans toutes les autres expériences de l'électricité; cette lumière est même, comme nous l'avons dit dans le Mémoire déjà cité, accompagnée d'une douleur semblable à une picquûre ou à une brûlure, dont les deux personnes sont également affectées; & j'ai fait une observation qui est conforme à ce que nous avons vu plus haut, c'est qu'un morceau d'ambre, de verre, ou de tout autre corps naturellement électrique, ne fait point paroître cette étincelle, il faut que ce soit une matière la plus contraire qu'il est possible à l'électricité, comme un corps vivant, un morceau de métal, de glace, toute sorte de matière mouillée, &c.

Un

Un animal vivant suspendu de la même manière, fait précisément les mêmes effets; mais si c'est un animal mort, il ne paroît plus d'étincelles, on ne voit qu'une lumière pâle & uniforme qui paroît sortir de ce corps lorsqu'on en approche la main.

Le corps vivant d'un homme, ou d'un animal, est donc entouré d'une Atmosphere, dont la matiere est capable d'allumer, pour ainsi dire, & de réduire en feu actuel la lumière qui accompagne l'électricité vitrée. Je n'ai pas eu la commodité de faire la même expérience sur l'électricité résineuse, parce qu'elle est en général plus foible, & que l'ambre, qui est le corps en qui elle est la plus forte, se trouve rarement en assez gros morceaux pour pouvoir faire un effet aussi considérable que cela seroit nécessaire pour réussir dans cette expérience; mais je suis persuadé que cela arriveroit de même qu'avec le tube, si on se servoit de quelque corps qui eût à-peu-près autant de vertu électrique.

J'ai fait depuis peu une autre expérience, qui prouve qu'il suffit pour produire ces étincelles brûlantes, de rendre électrique un corps vivant, soit que ce soit par lui-même qu'il le devienne, ou par la communication du tube, ou de quelque autre corps électrique. J'ai pris un Chat, dont j'ai rendu le poil fort électrique, en lui passant à plusieurs reprises la main sur le dos; lorsqu'ensuite j'approchois mon autre main de ses pattes, de son nez, ou de ses oreilles, il en sortoit de pareilles étincelles accompagnées de bruit & de douleur que le Chat paroïsoit ressentir  
très

très vivement, par l'impatience qu'il marquoit de s'enfuir, & que je sentoïis aussi de mon côté dans le doigt ou dans la main.

Cette expérience, quoique très simple, ne laisse pas de réussir assez difficilement; tous les Chats ne deviennent pas aussi électriques les uns que les autres, cela dépend de la rudesse, ou de la douceur de leur poil; il faut choisir ceux dont le poil est le plus rude; il faut de plus qu'il fasse froid & sec, & pour mieux réussir, il faut poser le Chat sur du taffetas, ou quelque autre étoffe de soye, ou sur quelque matiere résineuse, afin que le tourbillon électrique demeure plus abondant autour de son corps, & ne soit point détourné par les corps voisins. Je ne doute point que la même expérience ne puisse se faire de beaucoup d'autres façons, & peut-être que l'effet en seroit encore plus sensible; peut-être même pourroit-on porter ce feu jusqu'à embraser les corps combustibles. Dans un sujet aussi rempli de faits nouveaux & singuliers, il est permis de hasarder des conjectures; je crois donc que c'est un feu réel, ou une matiere très propre à le devenir, qui sort des corps électriques; que cette matiere sortant d'un corps entouré d'une Atmosphere trop peu dense, ou à laquelle il manque peut-être des parties grasses ou sulphureuses, elle ne produit qu'une lumiere tranquille; que sortant du verre dont l'Atmosphere, lorsqu'il est rendu électrique, est chargée de parties sulphureuses que l'on sent très distinctement à l'odorat, elle produit des étincelles qui frappent le visage ou la main très sensiblement,

ment, mais ne sont pas assez embrasées pour qu'on en sente la chaleur; & qu'enfin lorsque cette matiere environne un corps vivant, soit qu'elle en sorte par le frottement, soit qu'elle y vienne par la communication & l'approche du tube, ou de quelque autre corps électrique, elle trouve dans l'Atmosphere de ce corps un aliment convenable qui l'embrase, & la fait devenir un feu actuel, capable de brûler & de causer de la douleur. Ainsi il est très possible qu'on trouve quelque moyen de le réduire à un point d'activité capable d'allumer des corps combustibles, soit en envelopant le corps animé de quelque matiere fort seche & combustible, & en rassemblant quelques-unes des circonstances les plus propres à augmenter l'action de ce feu, soit de quelque autre maniere que l'on peut imaginer, si l'on trouve que ce fait mérite qu'on se donne la peine de le suivre & de s'y arrêter.

Il nous reste à examiner l'effet des deux électricités jointes ensemble. Nous avons rapporté au commencement de ce Mémoire une expérience singuliere de M. Hauksbee dans ce genre, qui consiste à faire tourner sur son axe un globe de verre enduit intérieurement de cire d'Espagne, & dont l'air est exactement pompé: J'ai fait cette expérience avec grand soin, & elle est effectivement une des plus belles de celles qui concernent la lumiere des corps électriques.

Pour enduire de cire d'Espagne l'intérieur de ce globe, il ne faut que la pulvériser, & après l'avoir introduite dans le globe, le tourner sur son axe au-dessus d'un réchaut plein de

de feu; on fait par ce moyen appliquer la cire aux endroits que l'on juge à propos. A mesure qu'elle se refroidit, elle se détache du verre en plusieurs endroits, ce que l'on voit par les lames d'air qui s'y introduisent, & les couleurs d'Iris qui en résultent, & même elle s'éclate & se fend en divers sens; mais tout cela ne nuit en rien à l'expérience. Ayant ainsi préparé ce globe, j'en pompai l'air le plus exactement qu'il me fut possible, & je le fis tourner sur son axe avec beaucoup de rapidité par le moyen du tour décrit dans mon premier Mémoire; à peine eus-je appliqué la main dessus, qu'il parut beaucoup de lumière dans l'intérieur du globe; elle étoit plus vive dans la partie où ma main étoit appliquée, que dans toute autre, & elle y étoit continue; il se formoit outre cela des éclats de lumière qui paroissoient partir de cet endroit, & s'élançoient de toutes parts dans l'intérieur du globe. Jusques-là ces phénomènes sont très-peu différens de ceux qui arrivent avec le globe vuide d'air sans être enduit de cire d'Espagne, mais voici ce qu'il y avoit de plus singulier, & que M. Hauksbee avoit regardé comme un des plus surprenans paradoxes qu'il y eût en Physique; c'est qu'en regardant dans le globe par un endroit qu'à dessein je n'avois point enduit de cire d'Espagne, on y voyoit une image de la main que je tenois appliquée sur le globe, & que cela faisoit le même effet que si ma main eût été lumineuse, & la cire d'Espagne assez transparente pour qu'on la vît à travers.

Un peu de réflexion me fit connoître la  
raison

raison de ce phénomène: j'observai que lorsque j'appliquois le bout de mon doigt sur la surface du globe, cela excitoit en-dedans une lumiere qui sortoit de la cire d'Espagne dans le seul endroit où mon doigt étoit appliqué: lorsque j'appliquois ma main toute entiere, la lumiere sortoit pareillement de tous les endroits où ma main touchoit le globe, mais comme dans l'intervalle de mes doigts le globe n'étoit point frotté, (car je le suppose toujours tournant sur son axe), il s'ensuit qu'il ne paroissoit point de lumiere vis-à-vis cet intervalle, non plus qu'au-delà du contour extérieur de ma main, & par conséquent l'image de la main & des doigts étoit exactement figurée par la lumiere qui, partant de tous les points d'attouchement & traversant la cire, se faisoit voir au-dedans du globe.

Lorsque j'appuyois médiocrement la paume de la main sur le globe, les plis naturels qui y sont & les principaux traits ne portoient point sur le globe, ce qui causoit une ombre vis-à-vis ces traits, & par conséquent les définoit assez correctement sur cette image lumineuse de la main; mais lorsque j'appuyois plus fortement sur le globe, ces ombres disparoissoient, toute la paume de la main étoit lumineuse, & il n'y avoit plus de sensible que le contour extérieur qui demeurant obscur, formoit toujours une image lumineuse de la main. Ainsi ce fait se réduit à prouver qu'un globe enduit de cire d'Espagne intérieurement & vuide d'air, tournant sur son axe, si l'on vient à le toucher extérieurement, il part de tous les points d'attouchement une lumie-

re



re qui passe à travers la cire d'Espagne & paroît dans l'intérieur du globe. J'ai déjà rapporté dans mon troisième Mémoire qu'une plaque de cire d'Espagne n'empêche point l'action des corps électriques, & que le tube attire & repousse des feuilles d'or à travers cette plaque: on voit que c'est ici le même fait, & que, quoique les pores de la cire d'Espagne ne soient point perméables à la lumière ordinaire, ils le sont néanmoins à la matière de l'électricité, & lorsque cette matière est lumineuse, comme dans l'expérience présente, il en résulte les faits que nous venons de décrire.

J'ai appuyé sur le globe, pendant sa rotation, de la laine, du papier, du linge, de la soie; la laine & le papier n'ont donné aucune lumière, le linge très peu, & la soie davantage; mais aucune de ces matières n'a fait, à beaucoup près, aussi bien que la main: les corps durs, comme le bois, les métaux, &c. n'ont rien fait non plus; il faut une matière souple, & qui occasionne un frottement, tel que celui qui est nécessaire dans les autres expériences de l'électricité.

J'ai enduit un pareil globe de gomme-laque pure, & les effets n'en ont point été différens, quoique cette gomme fût transparente; j'en ai enduit un autre de soufre, mais le soufre diminue de volume en refroidissant, ce qui fait détacher l'enduit entièrement, & il se brise lorsque l'on vient à faire tourner le globe. J'ai fait les mêmes expériences avec des tuyaux de verre, mais les différences sont peu considérables, & ne m'ont pas paru pouvoir

voir nous rien apprendre de plus sur le fait de la lumière, ni de l'électricité; ainsi je n'en rapporterai ici aucune.

Je finirai donc ici ce Mémoire, qui est le dernier des six que je m'étois proposé de faire dès le commencement de mon travail sur cette matière, & dans chacun desquels j'avois formé le plan d'examiner quelques-unes des principales propriétés de l'électricité. Quoique cet examen ne nous ait pas donné la connoissance des causes physiques & primordiales de l'électricité, il nous a néanmoins conduit à découvrir plusieurs principes inconnus jusqu'à présent, qui simplifient considérablement la théorie de l'électricité, & qui serviront à l'avenir de base & de fondement à ceux qui voudront faire de nouvelles recherches sur une matière si féconde, & sur laquelle il y a, selon toutes les apparences, encore un grand nombre de découvertes à faire. Voici en peu de mots quels sont ces principes, dont on trouve le détail & les preuves, tant dans ce Mémoire que dans les précédens.

\* 1°. Tous les corps qui sont dans la Nature, sont susceptibles d'électricité, à l'exception des métaux & des matières qui ne sont pas de consistance à pouvoir être frottées.

2°. Tous, sans exception, même les liquides, deviennent électriques par communication; la flamme seule ne le devient point, & n'est point attirée par les corps électriques.

3°. Les

\* II. Mémoire sur l'Electricité,

3°. Les corps naturellement électriques sont les seuls qui le puissent devenir par communication étant posés sur un appui ou base de métal, de bois, ou d'autre matiere qui n'est que peu ou point électrique; & au contraire, le deviennent moins que tout autre sur une base disposée à l'électricité.

\* 4°. Les matieres naturellement électriques interposées entre le tube & les feuilles d'or, ou autres corps légers, laissent passer les écoulemens électriques, au-lieu que toutes les autres matieres les interceptent.

5°. Les électriques sont les moins propres de tous à transmettre au loin l'électricité, & les corps mouillés sont les plus propres.

6°. Le plus grand vent ne détourne point les écoulemens électriques, que l'on fait communiquer au-delà de 1250 pieds au moyen d'une corde ou de quelque autre corps continu.

7°. Les corps de même nature s'impregnent de l'électricité, ou l'interceptent, à-peu-près en raison de leur volume.

8°. Il sort des étincelles brulantes d'un corps vivant rendu électrique par la communication du tube, & cette lumiere ne cause aucune sensation de douleur, si elle sort d'un corps inanimé.

† 9°. Il y a deux électricités différentes & distinctes l'une de l'autre, savoir, la vitrée & la

\* III. *Mémoire sur l'Electricité.*

† IV. *Mémoire sur l'Electricité.*

*Mém. 1734.*

*Li*

la résineuse, dont l'une attire les corps repoussés par l'autre. |

10°. Les corps électriques attirent toujours & indistinctement tous ceux qui ne le sont point, & repoussent au contraire tous ceux qui sont doués de celle des deux électricités qui est de même espèce que la leur.

\* 11°. L'air humide & chargé de vapeurs, nuit à l'électricité, de quelque nature qu'elle soit, & diminue considérablement ses effets.

12°. Les corps électriques placés dans le vuide, y exercent leur action; mais la matiere de l'électricité se porte plutôt dans le vuide que dans le plein, en sorte qu'un tube ou un globe vuide d'air, ne fait d'effet sensible que dans son intérieur. Ces deux dernières observations avoient déjà été faites par M<sup>rs</sup>. Boyle, Hauksbee & Gray, mais avec quelque différence, comme on le peut voir dans le Mémoire cité ci-dessus.

13°. L'air condensé dans l'intérieur du tube paroît nuire autant que l'air raréfié aux effets extérieurs de l'électricité.

† 14. Tous les corps dont l'électricité est un peu considérable, soit qu'elle soit vitrée ou résineuse, sont lumineux, avec quelques différences néanmoins dans la lumière qui y est excitée par le frottement.

15°. La matiere de cette espèce de lumière

\* V. Mémoire sur l'Electricité.

† VI. Mémoire sur l'Electricité.

te n'est pas la même que celle de l'électricité, l'une de ces deux propriétés pouvant subsister indépendamment de l'autre.

16°. Enfin les corps résineux, quoiqu'opakes, donnent un libre passage à la lumière, lorsqu'elle émane de la matière électrique, ou du moins qu'elle en est accompagnée, ainsi qu'on vient de le voir dans la dernière expérience de M. Hauksbee.

Voilà les principes, ou, si l'on veut, les fait simples & primitifs auxquels se peuvent réduire toutes les expériences sur l'Électricité, qui sont connues; le nombre de ces principes diminuera vraisemblablement à mesure que l'on parviendra à une connoissance plus exacte de cette merveilleuse propriété de la matière, qui jusqu'à présent n'étoit indiquée que par quelques expériences très compliquées qui l'avoient fait juger particulière à certaines matières, & dépendante de circonstances bizarres, & dans lesquelles il ne se trouvoit presque rien d'assuré ni de positif. Aujourd'hui c'est peut-être une qualité de la matière en général, dépendante de principes invariables, assujettie à des loix exactes, & qui peut influencer beaucoup plus que nous ne pensons, sur l'œconomie du globe; mais faute d'avoir été considérée dans ce point de vue, nous n'en avons que des connoissances superficielles. J'espère que nous n'en demeurerons pas là, & je suis persuadé que les Amateurs de la Physique ne négligeront pas un champ si fertile, & pour ainsi dire, un nouveau Monde, dans lequel il reste vraisembla-

724 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE  
blement tant de découvertes intéressantes à  
faire.



## P R O B L E M E.

*Une Courbe étant donnée, trouver celle qui seroit décrite par le sommet d'un Angle dont les côtés toucheroient continuellement la Courbe donnée; & réciproquement la Courbe qui doit être décrite par le sommet de l'Angle, étant donnée, trouver celle qui sera touchée par les côtés.*

Par M. F O N T A I N E.

**L**E Problème direct n'a aucune difficulté, aussi n'est-ce que de l'inverse dont il sera ici question. Nous aurons besoin, pour le résoudre, de savoir trouver des Courbes dont les points pris deux à deux ayent une relation donnée; & comme M. Newton donna en 1697, dans les Journaux de Leypsick, une méthode pour cela, nous commencerons par la rappeler ici en forme de Lemme.

## L E M M E I.

Supposons qu'on demande une Courbe \* *BMN* qui ait la propriété qu'exprime l'Equation  $y^2 + y'^2 = a^2$  ( $Ap = x, pM = y, pN = y'$ ), puisqu'à chaque point *p* de l'abscisse l'ordonnée a deux valeurs, l'Equation à la courbe

*BMN*

\* Fig. 1.

$BMN$  aura cette forme  $y^2 + Qy + R = 0$  ( $Q$  &  $R$  sont des quantités composées de  $x$  & de  $y$  constantes); & en résolvant cette E-

quation, on aura  $y = -\frac{1}{2}Q - \sqrt{\frac{1}{4}Q^2 - R}$  &

$y' = -\frac{1}{2}Q + \sqrt{\frac{1}{4}Q^2 - R}$ ,  $y^2 = \frac{1}{4}Q^2 - R + Q$

$\sqrt{\frac{1}{4}Q^2 - R}$  &  $y'^2 = \frac{1}{4}Q^2 - R - Q\sqrt{\frac{1}{4}Q^2 - R}$ ;  
donc par la condition donnée  $Q^2 - 2R = a^2$ ,

& par conséquent  $R = \frac{Q^2 - a^2}{2}$ : ainsi toutes

les courbes exprimées par l'Equation  $y^2 + Qy$

$+ \frac{Q^2 - a^2}{2} = 0$  dans laquelle on pourra don-

ner à  $Q$  telle valeur qu'on voudra en  $x$ , au-

ront la propriété demandée, & on ne sauroit

avoir de ces courbes une Equation plus gé-

nérale; si la relation donnée étoit entre trois

ordonnées, alors on prendroit une Equation

du 3<sup>me</sup> degré; si entre quatre, une du 4<sup>me</sup>,

&c. Si on veut qu'il y ait des ordonnées po-

sitives, & d'autres négatives, on prendra une

Equation dans laquelle cette condition soit

remplie. Enfin on voit bien que cette mé-

thode ne laisse rien à désirer: mais on doit

observer, comme l'a fait M. Newton, que

pour que le Problème soit possible, il faut

nécessairement que la relation à laquelle on

veut satisfaire soit exprimée, par une Equa-

tion dans laquelle les ordonnées entrent tou-

tes de la même manière; car si on proposoit,

par exemple, comme le faisoit M. Jean Ber-

noulli, de trouver une Courbe dont la pro-

priété fût que le quarré de l'une des ordon-

nées par l'ordonnée correspondante fût toujours

un même produit, alors je demanderois de laquelle des deux ordonnées on veut que je prenne le quarré, pour le multiplier par l'autre ordonnée; étant bien évident qu'à moins que toutes les ordonnées fussent égales, il ne sauroit être indifférent de prendre le quarré de l'une des deux, & de le multiplier par l'autre, pour avoir un produit déterminé. Si on me dit que c'est le quarré de la plus grande qui doit être multiplié par la plus petite, alors il n'y aura plus une loi uniforme dans toute la courbe, ce qui est impossible, l'ordonnée à l'une des branches qui est d'abord plus grande devenant à son tour plus petite.

## L E M M E I I.

*La loi de l'Angle TMP étant donnée, trouver la Courbe touchée par la ligne Mp.*

Soit prise sur \* Mp une ligne Ma égale au parametre p de la courbe AMN; & du point a soit menée sur TM la perpendiculaire ab, & soit  $Mb = \phi$  (par  $\phi$  j'entends une fonction des coordonnées  $z$  &  $u$  de la courbe AM), la différence de Mb étant  $d\phi$ , celle de l'an-

gle TMP sera  $-\frac{d\phi}{\sqrt{p^2 - \phi^2}}$  : du point M qu'on

mène sur TM la perpendiculaire Mq, & du point N la ligne Nq qui fasse sur la tangente  $zN$  un angle  $zNq$  qui diffère autant d'un droit que l'angle  $zNp$  diffère de l'angle TMP; ensuite qu'on imagine que l'angle  $TNz$  s'ouvre jus-

\* Fig. 2.



jusqu'à ce que l'angle  $t N q$  soit droit, & le nouvel angle de contingence fera —  $\frac{dz ddu}{dz^2 + du^2}$

$$+ \frac{d\phi}{\sqrt{p^2 - \phi^2}}; \text{ \& comme le rayon de la dé-}$$

veloppée est toujours égal au côté de la courbe divisé par l'angle de contingence, on aura

$$Mq = \frac{\sqrt{dz^2 + du^2}}{-\frac{dz ddu}{dz^2 + du^2} + \frac{d\phi}{\sqrt{p^2 - \phi^2}}}, \text{ \& par le}$$

moyen des triangles semblables  $M N L$ ,  $M b a$ , &  $M p L$ ,  $M q N$ , on aura

$$Mp = \frac{\sqrt{dz^2 + du^2} \cdot \sqrt{p^2 - \phi^2}}{-\frac{p dz ddu}{dz^2 + du^2} + \frac{p d\phi}{\sqrt{p^2 - \phi^2}}}. \text{ Nommant}$$

maintenant  $x$  &  $y$  les coordonnées au point  $p$  de la courbe touchée, si on fait le calcul comme pour les développées ordinaires, on trou-

$$\text{vera } x = \frac{\sqrt{p^2 - \phi^2} \cdot (du \sqrt{p^2 - \phi^2} - \phi dz)}{p^2 \cdot (-\frac{dz ddu}{dz^2 + du^2} + \frac{d\phi}{\sqrt{p^2 - \phi^2}})} + z$$

$$\text{\& } y = \frac{\sqrt{p^2 - \phi^2} \cdot (dz \sqrt{p^2 - \phi^2} + \phi du)}{p^2 (-\frac{dz ddu}{dz^2 + du^2} + \frac{d\phi}{\sqrt{p^2 - \phi^2}})} - u.$$

## SOLUTION.

Que \*  $AMB$  soit la courbe donnée, &  
*I* 4. con-

concevons que les côtés de l'angle  $CMD$  ont dans la figure la position qu'ils doivent avoir, lorsque son sommet est parvenu au point  $M$ , je nomme  $\phi$  le cosinus de l'angle  $CMT$ , &  $\phi'$  celui de l'angle  $DMT$ ; & supposant le rayon  $=p$ , le sinus de l'angle donné  $CMD = n$ , son cosinus  $=m$ , je trouve entre  $\phi$  &  $\phi'$

cette Equation  $\phi^2 - \frac{2m}{p} \phi \phi' + \phi'^2 = nn$ , qui

2, comme on le voit, les conditions que nous avons dit être nécessaires pour pouvoir appartenir à une seule courbe dont l'abscisse sera celle de la courbe  $AMB$  &  $=z$ , & les deux ordonnées seront  $\phi$  &  $\phi'$ . Supposons donc que l'Equation à cette courbe soit  $\phi^2 + Q\phi + R = 0$  (on se souvient que  $Q$  &  $R$  sont des quantités qui dépendent de  $z$  & de  $p$ ),

& nous aurons  $\phi = -\frac{1}{2}Q + \sqrt{\frac{1}{4}Q^2 - R}$ , &

$\phi' = -\frac{1}{2}Q - \sqrt{\frac{1}{4}Q^2 - R}$ . Substituons ces valeurs & leurs quarrés dans l'Equation à laquelle nous devons satisfaire, & nous trouverons

$Q^2 - 2R - \frac{2m}{p}R = nn$ , & par conséquent

$$R = \frac{Q^2 - nn}{2 \cdot (\frac{p+m}{p})} : \text{donc } \phi = -\frac{1}{2}Q + \frac{1}{2\sqrt{p+m}}$$

$$\sqrt{(m-p)Q^2 + 2pnn} \text{ \& } \phi' = -\frac{1}{2}Q - \frac{1}{2\sqrt{p+m}}$$

$\sqrt{(m-p)Q^2 + 2pnn}$ . Mais nous avons appris dans le Lemme second à trouver la courbe touchée, la loi de l'angle  $TMC$  ou  $TMD$  étant donné, & nous venons de déterminer cette loi en trouvant le sinus de cet angle.

con.





convenable aux conditions de notre Problème : donc il est résolu.



## REMARQUES

SUR

### LA METHODE DE M. FONTAINE,

*Pour résoudre le Problème où il s'agit de trouver une Courbe qui touche les côtés d'un Angle constant dont le sommet glisse dans une Courbe donnée.*

Par M. CLAIRAUT.

**L**A Méthode de M. Fontaine consiste en ceci :

Soit \*  $AM$  la courbe donnée,  $CMD$  les côtés de l'angle constant dans une position quelconque,  $\phi$  le cosinus de l'angle  $TMC$ ,  $\phi'$  celui de l'angle  $TMD$ ,  $m$  le cosinus de l'angle constant  $CMN$ ,  $n$  le sinus,  $p$  étant le rayon, on trouvera entre  $\phi$  &  $\phi'$  cette Equation

$$\phi\phi - \frac{2m}{p}\phi'\phi + \phi'^2 = nn. \text{ Pour satisfaire}$$

à cette Equation, on prendra  $\phi = -\frac{1}{2}Q$

$$+ \frac{1}{2\sqrt{p+m}} \sqrt{(m-p)Q^2 + 2pnn} \text{ \& } \phi' = -\frac{1}{2}Q$$

$$- \frac{1}{2\sqrt{p+m}} \sqrt{(m-p)Q^2 + 2pnn} \text{ [par } Q \text{ on}$$

lit 5.

en.

\* Fig. 1.

entend une fonction quelconque de l'abscisse  $z$  de la courbe donnée]. Cette valeur de  $\phi$  qui ne diffère de celle de  $\phi'$  que par le signe du radical, fait que l'Equation générale

$$\phi = -\frac{1}{2}Q \pm \frac{1}{2\sqrt{p^2 + m}} \sqrt{(m-p)Q^2 + 2pnm}$$

détermine la courbe cherchée, puisque le Problème se réduit à trouver la courbe qui touche les côtés  $MC$  placés par l'Equation précédente. On peut parvenir de différentes façons à achever le Problème alors. M. Fontaine avoit commencé par un Lemme qui, en supposant que  $\phi$  fût donné, donnoit les coördonnées de la courbe cherchée.

$$x = \frac{\sqrt{p^2 - \phi^2} (dz \sqrt{p^2 - \phi^2} - \phi dz)}{p \left( -\frac{dz ddu}{dz^2 + du^2} + \frac{d\phi}{\sqrt{p^2 - \phi^2}} \right)} + z$$

$$\& y = \frac{\sqrt{p^2 - \phi^2} (dz \sqrt{p^2 - \phi^2} + \phi du)}{p^2 \left( -\frac{dz ddu}{dz^2 + du^2} + \frac{d\phi}{\sqrt{p^2 - \phi^2}} \right)} - u$$

Ainsi cela termine la Solution.

Voici présentement ce qu'on peut, ce me semble, objecter à cette Solution. Lorsque l'on a trouvé la valeur de  $\phi = -\frac{1}{2}Q$

$$\pm \frac{1}{2\sqrt{p^2 + m}} \sqrt{(m-p)Q^2 + 2pnm}, \& \text{ que}$$

l'on veut employer cette valeur pour la substituer dans les valeurs générales de  $x$  & de  $y$ ,

on est obligé d'avoir  $\sqrt{pp - \phi\phi}$  qui est alors

$$\sqrt{[pp]}$$

$$\sqrt{pp - \frac{1}{4}QQ \pm \frac{1}{2} \frac{Q}{\sqrt{p+m}} \sqrt{(m-p)Q^2} + 2pnn)} - \frac{1}{4 \cdot \frac{1}{2} \sqrt{p+m}} (m-p)Q^2 + 2pnn).$$

Mais il est à remarquer dans cette grande expression que tout ce qui est sous le signe radical est un carré, en sorte qu'elle se réduit à

$$\pm [-\frac{1}{2}Q \frac{\sqrt{p-m}}{\sqrt{p+m}} \pm \frac{1}{2\sqrt{p-m}} \sqrt{(m-p)Q^2} + 2pnn)].$$

Dans ce cas les valeurs de  $x$  & de  $y$ , au lieu d'exprimer une seule & même courbe, en expriment deux, l'une en prenant le signe  $+$ , & l'autre en prenant le signe  $-$ , & il me semble que M. Fontaine doit démontrer que chacune de ces courbes a la propriété demandée, & non pas que ces deux courbes ensemble sont touchées par les côtés de l'angle constant. Car il est très naturel de penser qu'il se pourroit bien faire que pour avoir les deux branches touchées par les deux côtés de l'angle, il faut prendre la quantité précédente de ces deux manières

$$-\frac{1}{2}Q \frac{\sqrt{p-m}}{\sqrt{p+m}} - \frac{1}{2\sqrt{p+m}} \sqrt{(m-p)Q^2 + 2pnn),$$

$$\& +\frac{1}{2}Q \frac{\sqrt{p-m}}{\sqrt{p+m}} - \frac{1}{2\sqrt{p-m}} \sqrt{(m-p)Q^2 + 2pnn),$$

ce qui ne donneroît pas la même courbe, car il faudroit au contraire se servir des deux expressions

$$-\frac{1}{2}Q \frac{\sqrt{p-m}}{\sqrt{p+m}} - \frac{1}{2\sqrt{p-m}} \sqrt{(m-p)Q^2 + 2pnn),$$

$$\& +\frac{1}{2}Q \frac{\sqrt{p-m}}{\sqrt{p+m}} + \frac{1}{2\sqrt{p-m}} \sqrt{(m-p)Q^2 + 2pnn).$$

En se servant de ces deux expressions, on auroit bien la même courbe, mais ne se peut-il pas faire que les tangentes, au lieu d'être placées de manière que  $TMD - TMC$ , ou l'angle  $CMD$ , soit constant, ce soit l'angle  $TMD + TMC$  qui soit constant, de sorte qu'en supposant une autre courbe qui touche les côtés  $Ma''$ ,  $Ma'''$ , des angles  $a''Mb$ ,  $a'''Mb$ , égaux à  $aMb$ ,  $a'MB$  on a un assemblage de deux courbes touchées par l'angle constant  $a''Ma$  ou  $a'''Ma$ ? Cette autre courbe  $cD$  seroit en ce cas celle qui viendrait par l'expression

$$+ \frac{1}{2} Q \frac{\sqrt{p-m}}{\sqrt{p+m}} \pm \frac{1}{2\sqrt{p-m}} \sqrt{(m-p)Q^2 + 2pmn}$$

qui est renfermée dans l'expression générale qui s'est trouvée un quarré. Il me semble que l'on est en droit de penser que cela peut arriver ainsi dans la Solution de M. Fontaine, jusqu'à ce qu'on voye une démonstration du contraire, car il n'y a rien dans sa Solution qui réponde à cette objection. Car quoique par la construction de M. Fontaine, pour un même  $z$  qui répond au point  $M$ , on ait deux cosinus  $Mb$  &  $Mb'$  qui ont ensemble la relation exprimée par l'Equation

$$\phi\phi - \frac{2m}{n}\phi'\phi + \phi'\phi' = nn \text{ qui fait que la dif}$$

ference des angles  $bMa$ ,  $b'Ma$ , est constante, & qui a les conditions nécessaires pour être possible:

Il est à remarquer que les sinus  $Mb$  &  $Mb'$  donnent aussi-bien la position des lignes  $Ma''$ ,  $Ma'''$ , que celle des lignes  $Ma$  &  $Ma'$ , un cosinus ou un sinus peut être positif, quoique



que la tangente  $MC$ ,  $Mc$ , soit en dessus ou en dessous.

Il n'en seroit pas de même si l'expression de la tangente de l'angle  $aMb$  satisfaisoit à la relation requise, pour que l'angle  $aMb$  surpassât l'angle  $aMb$  d'un angle constant. Car supposons que  $aM = p$  pris sur la touchante  $MT$  de la courbe donnée  $MT$ , soit le rayon, pendant que la perpendiculaire  $aff'$  donne les tangentes  $af$  &  $af'$  à l'angle  $aMf'$ . Si l'on avoit une Equation de la courbe cherchée entre l'abscisse  $z$  de la courbe donnée au point  $M$ , & la tangente de l'angle  $aMf$  ou  $aMf'$ , de façon que pour un  $z$  on eût deux valeurs pour  $af$  &  $af'$ , qui fussent telles que  $aMf' - aMf$  fût constant, il n'y auroit pas à choisir à poser ces tangentes en dessus ou en dessous.

Mais comme de l'expression que M. Fontaine trouve pour les cosinus  $Mb$ ,  $\phi$ , &  $Mb'$ ,  $\phi'$ , on peut tirer celle des tangentes  $af$  &  $af'$  des angles  $bMa$  &  $bMa'$ , nous allons vérifier si elles sont telles que  $aMf' - aMf$  soit constant.

Il est clair que  $\frac{p\sqrt{pp-\phi\phi}}{\phi}$  &  $\frac{p\sqrt{pp-\phi'\phi'}}{\phi'}$  seront les tangentes  $af$  &  $af'$ . Comme ces tangentes, ainsi que les cosinus, ne diffèrent que par les signes des radicaux qui entrent dans leurs expressions, il suffira de réduire l'expression  $\frac{p\sqrt{pp-\phi\phi}}{\phi}$ , & l'on en tirera aussi-

tôt celle de  $\frac{p\sqrt{pp-\phi'\phi'}}{\phi'}$ .

I. 7.

Pour

Pour cela on reprendra l'expression que nous avons trouvée de  $\sqrt{pp - \phi\phi}$ , & l'on aura  $af$  ou  $\frac{p\sqrt{pp - \phi\phi}}{\phi}$

$$= p \left[ \frac{-\frac{1}{2} Q \frac{\sqrt{p-m}}{\sqrt{p+m}} - \frac{1}{2\sqrt{p-m}} \sqrt{(m-p)QQ + 2pnn}}{-\frac{1}{2} Q + \frac{1}{2\sqrt{p+m}} \sqrt{(m-p)QQ + 2pnn}} \right]$$

qui donnera  $af'$  ou  $\frac{p\sqrt{pp - \phi'\phi'}}{\phi'} \dots \dots \dots$

$$= p \left[ \frac{-\frac{1}{2} Q \frac{\sqrt{p-m}}{\sqrt{p+m}} + \frac{1}{2\sqrt{p-m}} \sqrt{(m-p)QQ + 2pnn}}{-\frac{1}{2} Q - \frac{1}{2\sqrt{p+m}} \sqrt{(m-p)QQ + 2pnn}} \right]$$

On peut démontrer présentement que ces deux valeurs de  $af$  & de  $af'$  sont telles que la somme des angles  $aMf$  &  $aMf'$  est constante, au lieu de la différence. Pour avoir l'angle constant  $*fMf'$ ; soit  $t$  &  $t'$  les tangentes de deux angles dont on veut trouver la somme, le rayon étant  $p$ ,  $\frac{pt + pt'}{pp - tt'}$  fera la cotangente de la somme des deux angles. C'est un Lemme facile qu'on peut supposer, si l'on substitue dans cette valeur  $\frac{pt + pt'}{pp - tt'}$  pour  $t$  &  $t'$  les valeurs précédentes de  $af$  & de  $af'$ , on aura, après les réductions,  $\frac{2\sqrt{pp - mm}}{m}$  qui est la

la cotangente de l'angle dont le sinus est  $u$ , c'est-à-dire, de l'angle  $CMD$ , en sorte que les courbes de M. Fontaine ne touchent que les côtés de deux angles  $aMf'$ ,  $aMf$ , qui se surpassent d'un angle constant, & qu'il faut une seconde courbe qui touche les côtés des deux angles  $a'Mb$ ,  $a''Mb$ , pour faire l'assemblage de deux courbes qui soient touchées par l'angle \*  $a'Ma'$  ou  $a''Ma$ . Ce qui n'est pas le Problème proposé.

On peut rendre tout ce que je viens de dire plus clair, en prenant un cas particulier, par exemple, celui où l'angle constant est droit, dont j'ai donné une Solution dans ce Volume, p. 281 & suiv. Examinons si la Solution de M. Fontaine donne ce cas-là.

Les tangentes  $af$  &  $af'$  des angles  $TMC$ ,

$TMD$ , deviendront  $\frac{p(\frac{1}{2}Q + \frac{1}{2}\sqrt{2pp - QQ})}{\frac{1}{2}Q - \frac{1}{2}\sqrt{2pp - QQ}}$ .

&  $\frac{p(\frac{1}{2}Q - \frac{1}{2}\sqrt{2pp - QQ})}{\frac{1}{2}Q + \frac{1}{2}\sqrt{2pp - QQ}}$ .

Je dis que ces tangentes sont celles de deux angles  $aMC$ ,  $aMD$ , dont les côtés  $MC$  &  $MD$ , qui touchent la courbe cherchée, ne sont pas à angles droits comme le Problème le demande, mais placées de façon que  $aMf + aMf'$  est un angle droit. Car 1°. ces deux valeurs ne peuvent être que toutes deux positives, ou toutes deux négatives; par conséquent les côtés  $MC$ ,  $MD$ , ne peuvent être distans l'un de l'autre d'un angle droit. 2°.

Le

Le produit de ces deux quantités est  $pp$ , ce qui rend les triangles  $aMf$ ,  $aMf'$ , semblables; par conséquent l'angle  $aMf + aMf'$  vaut un droit.

Pour que les deux côtés  $aM$  fussent à angles droits, il auroit fallu que le produit des quantités précédentes eût été  $-pp$ , c'est-à-dire, qu'une des tangentes  $af$  ou  $af'$  eût été négative, & eût porté le côté  $Mf'$  de l'autre côté de  $MT$ , ainsi que cela se trouve dans ma Solution.

Selon les principes que j'ai donnés, il faudroit au-lieu des quantités précédentes, des valeurs, comme  $R + \sqrt{RR + pp}$  &  $R - \sqrt{RR + pp}$  (par  $R$  on entend une fonction quelconque de  $z$ ) dont le produit est  $-pp$ , & l'on auroit des tangentes  $af$  &  $af''$  opposées l'une à l'autre, qui donneroient des droites  $Mf$ ,  $Mf''$ , à angles droits, ce qui n'arrivera point de la façon de M. Fontaine, c'est-à-dire, en prenant pour  $af$  &  $af'$  des valeurs dont le produit soit  $+pp$ .

Nous finirons ces remarques par un exemple très simple, où les valeurs des tangentes des angles  $aMf$ ,  $aMf'$ , donnent  $+pp$  par leur produit, au-lieu de  $-pp$ . Que ces valeurs

soient  $z + \sqrt{zz - pp}$  &  $z - \sqrt{zz - pp}$ , & que la courbe\*  $AM$  ne soit qu'une ligne droite exprimée par l'Equation  $u = 0$ . Pour trouver l'Equation entre  $AB$ ,  $x$ , &  $BD$ ,  $y$ ,  $AM$  étant  $z$ ,  $aM$ ,  $p$ , &  $af'$ ,  $z + \sqrt{zz - pp}$ , on

\* Fig. 34

on peut se servir des formules de M. Fontaine, ou de la 8<sup>me</sup> Section des Infiniment-petits, en faisant cette Equation  $\frac{x-z}{y} = \frac{p}{z + \sqrt{zz - pp}}$

ou  $x-z(z + \sqrt{zz - pp}) = py$ , & en prenant ensuite la difference, en supposant  $x$  &  $y$  constants, ce qui donne  $x-z(dz + \frac{zdz}{\sqrt{zz - pp}})$

$+ dz(z + \sqrt{zz - pp}) = 0$ , ou  $\frac{x-z}{\sqrt{zz - pp}}$

$\times dz(z + \sqrt{zz - pp}) = dz(z + \sqrt{zz - pp})$

ou  $x = z + \sqrt{zz - pp}$ , qui étant substituée

dans  $x-z(z + \sqrt{zz - pp}) = py$ , donne, après l'évanouissement de  $z$ ,  $2py - pp = xx$ . Equation à une parabole  $DC$ , dont  $BM$  est une perpendiculaire à l'axe passant par le foyer qui est  $A$ , le parametre étant  $2p$ . On voit aisément que cette parabole ne peut pas être touchée par un angle droit dont le sommet se mouvroit dans  $AMB$ , mais que l'angle  $CMD$  qui la touche est la difference, ou plutôt le complément à deux droits de la difference de deux angles  $BMf$ ,  $BMf'$ , dont la somme est un angle droit, ce qui n'est pas la solution du Problème proposé.

Si l'on avoit pris, suivant ce que j'ai enseigné dans mon Mémoire, pour  $*af, z + \sqrt{zz + pp}$ , dont le produit par  $af, z - \sqrt{zz + pp}$ , donne

\* Fig. 4.

ne  $-pp$ , on auroit eu  $2py + pp = xx$ , qui exprime une parabole dont  $BA$  est la directrice avec le même parametre que la précédente, & cette parabole dans tous ses points peut être touchée par les deux côtés de l'angle droit  $DMC$ , dont le sommet  $M$  est dans la droite  $AB$ .

~~~~~

R E P O N S E

AUX REMARQUES PRECEDENTES.

Par M. FONTAINE.

10. Si vous prenez $\sqrt{p^2 - \phi^2} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{p-m}{p+m}}$.

$$Q + \frac{1}{2\sqrt{p-m}} \sqrt{2pnn - (p-m)Q^2}.$$

Il faudra prendre $\sqrt{p^2 - \phi^2} = -\frac{1}{2} \sqrt{\frac{p-m}{p+m}}$.

$$Q + \frac{1}{2\sqrt{p-m}} \sqrt{2pnn - (p-m)Q^2}.$$



Et si vous prenez $\sqrt{p^2 - \phi^2} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{p-m}{p+m}}$.


$$Q - \frac{1}{2\sqrt{p-m}} \sqrt{2pnn - (p-m)Q^2}.$$

Il faudra prendre $\sqrt{p^2 - \phi^2} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{p-m}{p+m}}$.

$$Q - \frac{1}{2\sqrt{p-m}} \sqrt{2pnn - (p-m)Q^2}.$$

Car





Car à cause de l'angle constant * aMa' il y a un même rapport entre les sinus $ab, a'b'$, qu'entre les cosinus $Mb, M'b'$; or ce rapport détermine les signes de la maniere précédente.

2°. Puisque pour chaque z il doit y avoir deux sinus, deux cosinus, deux tangentes, deux, &c. il est évident par le Lemme premier, que Q doit être un radical, parce que c'est sur son coefficient que tombe la différence des signes.

3°. Enfin on aura la même courbe, soit qu'on substitue dans les formules du Lemme second les valeurs de Mb & de ab , ou celles de Mb' & de $a'b'$. Donc, &c.



SUR LE MERCURE.

Par M. BOERHAVE.

J'ECRIVIS l'année passée quelques Observations sur le Vif-Argent, par lesquelles il paroissoit que quoiqu'il semblât se transformer continuellement en d'autres corps, il conservoit pourtant d'une maniere surprenante la propriété d'être immuable. J'offris ces Observations à cette Assemblée savante qui orne l'Angleterre sous les auspices de Sa Majesté Britannique. Elles y ont été goûtées au-delà de mes esperances; de sorte qu'on les a jugé dignes d'être imprimées parmi les Mé-

* Fig. 3.

Mémoires de ce Corps illustre. Mon unique but dans cet Ecrit étoit de rapporter fidèlement & précisément les opérations que j'ai faites sur le Vif-Argent, & le produit de ces opérations, & d'exempter par-là mes lecteurs du soin & de la dépense nécessaires pour les répéter. J'ai à présent le même dessein, & j'offre ici à cette Académie si florissante, par les bienfaits de Sa Majesté Très-Chrétienne, quelques expériences que j'ai faites sur le même sujet. En joignant ces deux Dissertations, on pourra juger de la fidélité & de l'exactitude des anciens & vrais Alchymistes dans ce qu'ils ont dit touchant le Mercure; & on verra en même tems qu'il faut bien de l'application & de la prudence pour être en état d'expliquer leur sentiment, ou les critiquer avec fondement. J'espère aussi mettre ceux qui s'attachent à la Chimie en état de n'être pas facilement les dupes du savoir extravagant des Alchymistes modernes, gens qui dans le fond ne savent rien de bon & de solide, & qui n'ont que l'art d'attraper par leurs fourberies l'or très réel de ceux à qui ils font croire qu'ils leur apprendront à en faire. Enfin je confirmerai ce que j'ai déjà prouvé de l'immutabilité, de la simplicité & des propriétés singulieres du Vif-Argent. C'est à une Assemblée aussi savante que la vôtre, Messieurs, qu'il convient de juger de l'utilité & de la vérité de cet Ecrit, à l'examen duquel je vous prie de donner quelques momens de relâche de vos occupations plus importantes. Je sai que ces momens sont rares, aussi j'aurai

rai soin d'être aussi concis qu'il me sera possible. J'entre en matière.

I.

Le vif-argent pur, tel qu'on le trouve ordinairement chez les marchands en compagnie à Amsterdam, mis longtems en digestion sur le feu, ne se change point en métal.

E X P E R I E N C E.

Ce vif-argent étant distillé, n'a laissé aucune feces. Après cela mêlé avec le vinaigre distillé & le sel marin, & agité pendant longtems, il est resté pur. Je l'ai fait passer par une peau de Chamois & j'en ai mis ensuite une livre dans un matras bien net à long col, dont j'ai bouché l'ouverture avec un cornet de papier & par-dessus recouvert d'un autre papier bien lié au col du matras, de manière qu'aucune poussière n'y pouvoit entrer, & que cependant l'air avoit le passage libre pour y entrer & en ressortir : je l'ai placé sur un fourneau à une chaleur continue, qui au Thermometre de M. Fahrenheit, a toujours été entretenue au-dessus de cent degrés depuis le 15 de Novembre 1718, jusqu'au 23 de Mai 1734. J'ai trouvé alors le Mercure fluide dans ce matras, avec un peu de poussière noire sur la surface. Cette poussière se revivifioit en Mercure en le frottant dans un mortier. J'ai mis tout ce vif-argent en distillation dans une cornue de verre bien nette, en augmentant le feu vers la fin au point que

la retorte étoit presque rouge. Il n'est resté quoi que ce soit dans la retorte; & le Mercure en est sorti sans aucun changement sensible.

COROLLAIRES.

1. Le feu au degré & pendant le tems susdits, ne change rien à la fluidité, à la volatilité, ni à la nature du vif-argent mis dans un vase où l'air a le passage libre; il ne s'est fait aussi aucune séparation du pur d'avec l'impur.

2. Il ne s'est fait non plus aucune génération sensible de la moindre quantité de métal.

3. Bien moins encore d'argent ou d'or.

4. Il ne s'est rien fixé du Mercure dans cette opération continuée pendant 15 ans $\frac{1}{2}$, il n'a pas paru le moindre commencement de fixation métallique, non pas même du plomb, qui cependant, au dire de ceux qui se vantent de le bien savoir, est le métal qui doit se former le premier par cette opération.

5. Cette expérience n'est nullement favorable au sentiment de ceux qui affirment que les métaux se forment du vif-argent comme matière, & du feu comme soufre fixant, unis par la digestion.

6. Il y a toute apparence que toutes les opérations semblables faites avec le Mercure commun pur, ne répondent nullement à ce qu'on en promet, puisque le peu de poussière noire dont j'ai parlé, est plus légère

re que le Mercure sur la surface duquel elle flotte, & qu'elle redevient Mercure très facilement. Voyez dans les Transactions Philosophiques ce que j'ai dit d'une poussière semblable, produite du Mercure par le seul mouvement.

7. Il ne paroît pas que le vif-argent puisse se changer dans les mines en quelque chose de métallique que ce soit, par la seule action de la chaleur souterraine agissante pendant un long tems, & dans un lieu où l'air ait un accès libre: car la chaleur ne monte gueres au-delà de 70 degrés dans les lieux où se trouvent les veines des métaux. On dit à la vérité qu'il faut mille ans pour produire cet effet; mais comment les hommes qui vivent si peu ont-ils pu s'en assurer?

8. Le souphre que les Alchymistes ont cru être un des principes des métaux, & dont ils disent qu'il unit ensemble les élémens du vif-argent pour faire un corps solide, fixe à un degré de feu capable de le mettre en fusion & malléable; ce souphre, dis-je, paroît être toute autre chose que la matiere de la lumière ou du feu, quoique le feu seul soit l'unique moyen de produire cette union admirable de ce souphre & du Mercure.

Cependant dans cette expérience l'air avoit un accès libre au Mercure, & l'on pourroit dire peut-être que c'est ce qui empêche cette action du feu, d'autant plus que les Alchymistes disent que l'air crud empêche la coction philosophique: c'est ce qui m'a porté à faire l'expérience suivante que je vais rapporter.

Le

I I.

Le vif-argent mis en digestion dans des vaisseaux bien fermés, pendant le tems exprimé ci-dessous, ne produit aucun métal.

O P E R A T I O N .

J'ai mis du vif-argent pur dans un vase de verre conique à fond plat, tel que les Esfayeurs s'en servent pour la séparation de l'argent & de l'or, je l'ai exposé à une chaleur de 100 degrés depuis le 6 Décembre 1732, jusqu'au 8 Juillet 1733. Le vase étant toujours bouché, le Mercure n'a souffert aucun changement notable; j'en ai pris 6 onces que j'ai mis dans un vase semblable au précédent, dans l'ouverture duquel j'ai fait entrer le col d'une phiole renversée, sans luter les deux vases ensemble; je l'ai exposé pendant 4 jours au feu de sable assez ardent pour que le Mercure commençât à monter, & cela dans la vue d'en chasser toute l'humidité qu'il pouvoit y avoir. Lorsqu'il m'a paru qu'il n'y avoit plus le moindre signe d'humidité, j'ai luté exactement l'endroit où ces deux vases se joignoient; j'ai exposé le Mercure au feu de sable assez violent pour le faire doucement monter & descendre; j'ai continué ce degré de chaleur jusqu'au 29 Janvier 1734. Je n'ai trouvé au fond du vase que du Mercure fluide légèrement couvert d'une poussière noire, légère & fine, rien de fixe, point de précipité, quoique le degré de chaleur ait toujours été

été fort approchant de celui de l'eau bouillante. Alors, j'ai fait passer ce Mercure par un entonnoir de papier bien net & bien sec, dont l'ouverture par en-bas étoit à peine grande à laisser passer un cheveu. Le Mercure bien net a passé par ce petit trou, & il est resté dans l'entonnoir, à ses parois, & autour du petit trou, un peu de noir, qui, en le broyant dans un mortier, est redevenu Mercure. J'ai mis distiller ce Mercure ainsi épuré dans une retorte de verre bien nette à feu de sable, & à la fin à feu de suppression; il n'est rien du tout resté de fixe au fond de la retorte. Le vif-argent a paru peut-être un peu plus fluide qu'auparavant, mais d'ailleurs nullement changé.

COROLLAIRE.

De ceci on peut à-peu-près tirer les mêmes conclusions que de l'expérience précédente, & en les joignant à ce que j'ai écrit sur ce sujet dans les Transactions Philosophiques, il paroîtra clairement que le vif-argent est immuable de sa nature par les mouvemens mécaniques, par les distillations, & par les digestions décrites. Je conclus de tout ceci, que les Chimistes peuvent se dispenser du travail inutile de répéter toutes ces opérations, dans la vue de fixer le Mercure, ou de le changer en quelque autre corps que ce soit; je leur conseille de plus, de se défier de ces ignorans, abondans en vaines promesses, dont la moins mauvaise espece est de ceux qui tâ-
Mém. 1734. Kk chent

chent de hazarder des expériences aux dépens d'autrui.

Je vais rapporter le résultat de quelques autres expériences que j'ai faites sur les métaux, & qui ne m'ont pas moins coûté de travail que les précédentes. Il y a longtems que je travaille à favoir au juste s'il est vrai que les métaux puissent se résoudre par art en vif-argent & en un autre principe; plusieurs Auteurs l'affirment si nettement & en tant d'endroits, qu'il ne me paroïssoit pas même permis de douter du fait: je le croyois, sur la foi de ces Auteurs; mais pour en être convaincu par mes propres yeux, je me mis à operer sur le plomb. Le fameux Van Helmont dit que le plomb, à cause de la crudité de sa nature métallique, telle que quelquefois le feu seul peut le détruire, peut aussi par la partie grasse des sels fixes être divisé dans les principes qui le composent, de sorte qu'il laisse couler le vif-argent crud. (*Potest. medicam. §. 40.*) Son fils François-Mercure Van Helmont dit, (*Discours paradox. part. 2. §. 21.*) que le plomb peut se résoudre par des sels fixes, ou autres, ou par des huiles qui en séparent le souphre, en sorte que ce métal se transforme en vif-argent volatil, fluide, & qui ne peut souffrir le feu. Joachim Becherus assure la même chose, & répond du succès de plusieurs opérations qu'il décrit pour cet effet. (dans les *Collectanea quingen-zorum experimentorum*, à pag. 310. ad pag. 333.) Voici clairement & en peu de mots ce que j'ai appris sur ce sujet, au prix d'un travail très long & très ennuyeux.

O P E R A T I O N.

J'ai fait dissoudre de la céruse pure, autant qu'elle a pu se dissoudre, dans l'esprit de nitre affoibli par six fois son poids d'eau; j'ai filtré cette dissolution qui s'est trouvée extrêmement claire: cette liqueur mise dans un vaisseau de verre bien net, épaissie à une chaleur douce, ensuite laissée en repos dans un lieu froid, il s'y est formé des cristaux, dont j'ai pris 14 onces, que j'ai réduits en poudre dans un mortier de verre, & avec un pilon de verre: j'ai fait dissoudre cette poudre dans de l'eau de pluie bien pure, & j'ai affoibli cette dissolution par trois fois autant d'eau de pluie; ensuite j'ai versé lentement & avec précaution une autre dissolution filtrée & bien claire, faite de sel armoniac, dans de l'eau de pluie: le mélange devient blanc comme lait, & le plomb se précipite d'abord, comme il arrive à l'argent dissous dans l'eau-forte, dès qu'on y mêle le sel armoniac; la poudre précipitée au fond, & qui étoit blanche comme neige, étant lavée dans beaucoup d'eau, puis séchée, s'est trouvée fort insipide, & pesoit 18 onces $\frac{1}{2}$: j'ai mis 6 onces de cette poudre blanche & sèche dans un urinal de verre bien net, & j'y ai versé jusqu'à la hauteur de deux doigts, en dessous de cette poudre, d'une lessive très forte, composée de chaux vive & de cendres gravelées, & que j'ai gardées plusieurs années dans une bouteille bien bouchée; ensuite j'ai couvert l'urinal d'un papier brouillard

K k 2

bien

bien lié tout au tour de son col, & je l'ai placé dans un fourneau de putréfaction à une chaleur de 96 degrés, où je l'ai laissé depuis le 6 de Février 1732, jusqu'au 13 d'Août de la même année, pour essayer si ce mélange exposé à l'air, seroit changé par cette chaleur de putréfaction. Je n'ai trouvé qu'une masse blanche, que j'ai réduite en poudre, & qui avoit le goût de sel; je l'ai mise dans une retorte de verre enduite d'un lut composé d'argille & de sable; je l'ai poussée à feu ouvert jusqu'à la faire rougir, & la tenir pendant trois heures en cet état: il est monté un peu de fuye blanche dans le col de la retorte, mais point du tout de Mercure, & il est resté dans le fond une matiere fragile à demi vitrifiée, de couleur de cendres; je l'ai réduite en poudre de même couleur, que j'ai fait longtems broyer dans un mortier avec une lessive de sel alkali fixe & de chaux vive; je l'ai fait sécher à feu lent, j'y ai versé de nouvel alkali, & je l'ai exposée à la chaleur de 96 degrés, depuis le 18 Août 1732, jusqu'au 15 Octobre 1733, la broyant tous les jours dans le mortier de verre où elle étoit, qui n'étoit couvert que d'un papier, de sorte que l'air y avoit un libre accès; c'étoit alors une poudre blanche, sèche & âcre: j'y ai de nouveau versé de la même lessive, & je l'ai fait broyer jusqu'à ce qu'elle fût réduite en pâte; je l'ai mise en putréfaction comme ci-dessus, en continuant à la broyer souvent, depuis le susdit jour, jusqu'au 21 Février 1734; c'étoit alors une masse saline, blanche & d'un goût fort approchant du sel marin:

après

après l'avoir broyée & lavée avec de l'eau, & fait bien sécher très lentement, j'ai eu une poudre blanche très insipide; je l'ai mise dans une cornue où je l'ai tenue pendant quelques heures au plus grand feu que le verre luté peut supporter; le 20 Mai 1734, il n'en est venu aucun Mercure, le col de la retorte étoit peint de diverses couleurs, & la masse friable qui restoit dans le fond, jettoit aussi diverses couleurs disposées par couches, & pesoit 5 onc. 6 gros $\frac{1}{2}$; la poudre où elle fut réduite, en la broyant, étoit de couleur de cendres roussâtres.

S C H O L I E.

Dans cette opération, le plomb étoit d'abord de la céruse, c'est-à-dire, qu'il étoit pénétré & dissous par la vapeur du vinaigre, & réduit en chaux blanche, ensuite réduit en poudre fine. Il a été dissous dans l'esprit de nitre affoibli, & est par-là devenu une liqueur très claire, sans couleur, d'un goût doux; dans laquelle le plomb étoit réduit & divisé en parties extrêmement petites. En troisième lieu, le sel armoniac dissous qu'on y a versé, en chassant l'esprit de nitre, y a substitué l'esprit de sel marin, & s'unissant intimement à la partie métallique du plomb, l'a disposé, autant qu'il se peut, à faciliter la séparation du Mercure d'avec la partie métallique, suivant l'opinion de tous ceux qu'on croit avoir le mieux écrit sur ces matieres; car ils attribuent sur-tout au sel armoniac & au sel marin, la propriété de séparer le Mercure des

métaux. En quatrieme lieu, la chaux ainfi préparée & mise en digestion pendant fept mois avec un alkali très violent, sembloit devoir faire reparoître le Mercure, en absorbant le foupbre du plomb: cependant, quoique poulée à grand feu, elle n'a pas donné le moindre Mercure. En cinquieme lieu, cette masse broyée longtems & fortement, & puis mêlée d'un nouvel alkali très fort, & mise en digestion pendant quatorze mois, n'a donné aucune apparence de Mercure. En fixieme lieu, elle a été encore broyée avec de nouvel alkali, & mise en digestion pendant cinq mois; de forte qu'après toutes ces opérations, elle a été assez expofée à l'action de l'alkali, pour qu'il eût le tems de féparer la partie partie fulphureufe du plomb, & que le Mercure dégagé de ce foupbre, pût être exprimé de cette masse par la force du feu. Cependant, après tout ce travail, le plus grand feu n'a fait paroître aucun Mercure.

Il est donc clair, que ce que les Auteurs avancent hardiment touchant la facilité qu'il y a de tirer le Mercure du plomb, n'est pas confirmé par l'expérience. Or le plomb est, difent ces Auteurs, le métal qui contient le plus de Mercure, & qui se réfout le plus facilement en Mercure par les fels reffuscitans. La chose est donc plus difficile dans les autres métaux. Les Auteurs affurent cependant que cela peut se faire assez aifément, & ils prefcrivent des méthodes peu différentes de celle que je viens de rapporter, & qui, après toute la peine qu'elle m'a caufée, m'a fait voir que ce qu'ils m'avoient promis, ne me réus-

réussissoit point du tout. Je doute que ces Auteurs ayent été fondés en observation dans leurs assertions sur ce sujet ; & je panche beaucoup à croire qu'ils se sont plutôt livrés à leur opinion en cette matiere, qu'ils n'ont consulté l'expérience. Tout ce que je viens de rapporter, servira au moins à exempter le lecteur, de la peine & de la dépense de répéter ces observations, & à l'empêcher d'admettre facilement ces prétendus principes de la science des métaux. Il seroit bien à souhaiter que ces Chimistes habiles & laborieux nous eussent raconté fidèlement le résultat des expériences qui ont trompé leur attente, & qu'ils ne nous eussent jamais prescrit d'opérations avant de les avoir faites eux-mêmes : cela nous épargneroit du tems, de la dépense & du travail, & la Chimie pourroit en peu de tems prendre son rang entre les Sciences. Par toute autre voye, si je ne me trompe point, on ne parviendra jamais à la vérité, qui est le but de nos recherches.

III.

Isacus Hollandus a écrit que le vis-argent pouvoit facilement se tirer du sel de plomb, fait par le moyen du vinaigre distillé : pour en faire l'épreuve, j'ai préparé avec la meilleure litharge & le vinaigre du vin distillé, ce suc concret qu'on appelle *suc de Saturne* ; j'en ai calciné 2 onces dans un vaisseau de verre ouvert, par un feu doux continué depuis le 6 Juin 1734 jusqu'au 19 Juillet suivant. La poudre blanche qui en est provenue a été

Kk 4.

pilée

pilée fort fine dans un mortier de verre avec
 un pilon de verre. Je l'ai fait broyer fort vîte
 & fort longtems, en y ajoutant une lessive
 autant chargée du plus violent sel alkali fixe,
 que l'eau en a pu dissoudre. Je l'ai gardée
 dans le même mortier couvert de papier,
 dans une chaleur continuée depuis le 21 Juil-
 let jusqu'au 27 Novembre. Pendant tout ce
 tems j'ai toujours eu soin, dès que cette pou-
 dre étoit sèche, de la rebroyer, en y ajou-
 tant de nouvelle lessive. Je l'ai tenue, cou-
 verte d'un papier, à une chaleur de 90 de-
 grés, la séchant, l'humectant & la broyant
 ainsi alternativement pendant tout ce tems-là.
 Le dernier jour je pilai cette matiere sèche
 & blanche en poudre impalpable, & l'ayant
 mise dans une cornue de verre lutée, j'ai
 poussé le feu par degrés avec précaution,
 jusqu'à ce que la cornue fût rougie, & je l'ai
 tenue en cet état pendant 4 heures. Il ne
 parut pas le moindre petit globule de Mer-
 cure ni dans le récipient, ni dans le col de la
 cornue, dans le fond de laquelle il s'est trou-
 vé une masse très noire, légère, en forme de
 poudre, d'un goût d'alkali brulant. Je l'ai mise
 le 28 Novembre dans un plat de verre à la
 cave, où elle est d'abord devenue humide, &
 je l'y ai laissée jusqu'au 8 Janvier 1735. Cette
 matiere avoit alors augmenté de volume,
 toute la partie saline s'étant tournée en liqui-
 de d'elle-même par le secours de l'humidité
 de l'air, & la partie métallique étant au fond
 en forme de poussiere noire. J'ai fait sécher
 le tout ensemble, tant ce qui s'étoit fondu
 que ce qui ne l'étoit pas, & ce mélange s'est
 trouvé

trouvé très noir. Je l'ai remis encore dans une retorte de verre, & je l'ai poussé à la fin à un feu qui a tenu le tout rouge pendant 4 heures. Il ne parut cette fois non plus que l'autre, pas la moindre marque de Mercure, ni dans le récipient, ni dans la cornue, dans le fond de laquelle il resta une matiere de couleur de cendre, d'un goût brulant comme du feu, qui immédiatement se tournoit en liquide étant exposée à l'air.

Dans cette opération le plomb dissous & ouvert par le vinaigre pur, & disposé de sorte qu'il pût être intimement pénétré par le sel; mêlé & broyé avec un alkali fixe, caustique & liquide; mis en digestion, mis en putréfaction, exposé à un feu violent; dissous par l'humidité de l'air pendant un mois philosophique; derechef pilé, séché, poussé à grand feu, n'a pas produit de Mercure le moins du monde.

Que penser donc de cette matiere & de ce qu'en avancent si hardiment des gens crédules, paresseux, ou attachés à la spéculation seule? Ils engagent ceux qui ont plus d'application au travail que de connoissances, à des travaux inutiles & à des dépenses excessives, & rendent par-là odieux un des plus beaux Arts. Les autres peuvent profiter de mes peines & de la dépense que j'ai faite, & s'en servir à épargner les leurs.

I V.

Après m'être assuré par ma propre expérience, que les sels appelés *ressuscitans*, ne
K k 5 peu-

peuvent pas tirer, à la maniere décrite, le Mercure du plomb; j'ai voulu essayer ce que le vif-argent lui-même pouvoit produire en ce cas; vu sur-tout que les Chimistes appellent ce fluide l'*Eau des métaux*, dans laquelle, disent-ils, ceux-ci meurent, renaissent & sortent plus beaux qu'ils n'étoient auparavant. J'ai fait donc fondre une once de plomb dans une cuilliere de fer bien nette. J'ai fait en même tems chauffer dans une autre cuilliere semblable trois onces de vif-argent pur. J'ai versé ensuite le Mercure chaud sur le plomb fondu; il s'y est mêlé d'abord, & ils se sont formés en masse solide, de couleur d'argent. Je l'ai pilée, & après l'avoir ramollie, je l'ai mise dans un petit matras que j'ai fait chauffer, & l'ayant ensuite bouché d'un bouchon de liège, je l'ai posée dans un fourneau de digestion à une chaleur toujours égale de 84 degrés, depuis le 11 Février 1732, jusqu'au 10 Janvier 1735. C'étoit un amalgame mou, coulant comme du beurre sous le pilon, noirissant d'abord quand on le secouoit, pesant quatre onces justes. Je l'ai mis le même jour dans une cornue de verre, bien nette, à un feu de sable, & à la fin au feu de suppression, au point que le sable étoit tout rouge, & cela pendant quatre heures; il passa 2 onces 6 gros $\frac{1}{2}$ de Mercure dans le récipient. Il y avoit au fond & au col de la cornue une poudre rouge formée par le Mercure dans la distillation, il y avoit un peu de vif-argent au col, & il y avoit quelques petits globules de plomb tout pur en forme de poussiere; tout cela pesoit ensemble 52 grains. Enfin

il y avoit au fond une masse solide de plomb pesant 1 once moins 5 grains, lesquels faisoient la valeur de ces petits globules de plomb en forme de poussiere dont je viens de parler, de sorte qu'il paroît que tout le plomb y restoit, & qu'il s'étoit dissipé 43 grains de Mercure. Ceux qui ont quelque connoissance de ces matieres, trouveront facilement la cause de cette dissipation dans les causes mentionnées ci-dessus, sur-tout s'ils considerent que dans les distillations une partie de ce Mercure reste attachée à la superficie fort étendue d'un grand récipient, & qu'une autre partie demeure en forme de petits nuages sur la superficie de l'eau qu'on doit toujours mettre dans le récipient.

J'ai appris par cette opération, que par une digestion du Mercure avec le plomb, continuée pendant près de 3 ans, & par une distillation des plus violentes, on ne peut tirer aucun Mercure du plomb; & qu'on ne peut non plus, par ce moyen, fixer le Mercure en plomb, parce que dans la distillation du Mercure, il y en a toujours une petite quantité qui se change en poudre rouge qui est fixe dans le feu en cette application; mais le poids du plomb est toujours resté le même.

V.

J'ai fait la même opération sur un amalgame fait de 3 onces de vif-argent & 1 once de bon étain, je l'ai mis au même degré de chaleur pendant autant de tems, ensuite je l'ai mis distiller de la même maniere dans une cor-

nue de verre par le même feu: voici quel en fut le succès. J'ai retiré du récipient 2 onces 4 gros de Mercure; dans le fond de la retorte il y avoit une poudre dont une partie étoit fine & composée d'une petite quantité de Mercure fixé, & l'autre partie plus grossière étoit noire, composée de très petits morceaux d'une consistance telle qu'est celle de l'étain. Il y avoit encore un peu de Mercure au bas du col de la retorte: tout cela pesoit ensemble 2 gros 5 grains. Au fond étoit une masse solide d'étain, pesant 1 once 1 gros 9 grains. Le déchet étoit de 46 grains: j'ai déjà donné les raisons de ce déchet.

Il paroît que par cette opération on ne peut point tirer de Mercure de l'étain; mais il y a eu 3 gros 14 grains, c'est-à-dire, plus de la septième partie du Mercure, qui s'est uni avec l'étain, & si bien fixé, qu'il n'a pu en être séparé par un feu qui faisoit rougir le sable, continué pendant 4 heures. Il y a grande liaison entre Jupiter & Mercure, & le Soleil est au milieu des deux. *Nov. Lum. Rem. Tractat. 9.*

V I.

J'ai versé 10 onces de Mercure, après les avoir bien chauffées, sur 2 onces de très bon étain mis en fusion dans une cuillère de fer bien nette. Je l'ai broyé, le tout en un amalgame uniforme que j'ai mis bien chaud & bien sec dans une bouteille de verre nette & chaude, que j'ai ensuite bien bouchée; je l'ai placé dans une boîte de bois, que j'ai attachée au martinet (pilon) d'un moulin à foulon travail.

vaillant continuellement, & là elle a été dans un mouvement presque continuel jour & nuit depuis le 30 Novembre 1732, jusqu'au 9 Janvier 1735. J'ai ôté alors la bouteille qui étoit entiere, au fond de laquelle se trouvoit du Mercure coulant, & après un repos de quelques jours, il s'est trouvé au-dessus un amalgame assez dur; le tout pesoit exactement 12 onces. J'ai fait distiller dans la cornue de verre lutée 11 onces 7 gros de cet amalgame, & cela à feu ouvert, poussé vers la fin au point d'entretenir la cornue toute rouge pendant deux heures. Il n'en est sorti précisément que la même quantité de Mercure qui y avoit été mise, & elle en sortit très fluide, & il restoit au fond une masse d'étain attachée au verre avec un peu de matiere jaune qui étoit comme feuilletée. Cette masse d'étain pesoit 1 once 6 gros $\frac{1}{2}$, & il y avoit encore une petite quantité de la matiere jaune dont il vient d'être fait mention.

Il est donc certain qu'à l'aide d'un mouvement continué pendant un aussi long tems, le Mercure ne peut pas dissoudre l'étain, de maniere qu'on en puisse tirer du Mercure par une distillation faite à très grand feu.

S C H O L I E.

Une chose singuliere que j'ai remarquée dans ces trois dernieres opérations, c'est que le Mercure séparé du plomb ou de l'étain par la distillation, étoit extrêmement liquide, & qu'en le remuant dans un pot de fayence blanche bien net, il pâlissoit en fort peu de tems la superficie de cette fayence, & y lais-
soit

soit une petite tache noire fort adhérente. Dès que j'avois nettoyé cette tache en l'esfuyant avec du papier bien net & bien sec, il s'en reformoit d'abord une autre, & cela plusieurs fois de suite. Cela m'a fait penser que cela devoit s'attribuer à une partie du métal grasse, qui dans la distillation s'élevoit avec le Mercure, & restoit attachée à sa superficie & s'en séparoit alors. Pour m'éclaircir sur ce fait, j'ai répandu ce Mercure sur du papier blanc très net & très sec, & il y a laissé une légère trace noire par-tout où il a passé; d'ailleurs la superficie de ce Mercure étoit toujours couverte d'une pellicule extrêmement mince, & qui paroissoit comme un peu de graisse. Ainsi, quoique par des distillations de Mercure souvent réitérées, quelques parties des autres métaux puissent bien s'unir avec le Mercure, il ne s'ensuivroit pas que quelques-unes fussent changées en Mercure.

J'avois eu soin de faire la même expérience avec le plomb, & il avoit été exposé au même mouvement pendant le même tems; mais dans le tems que je voulois le faire détacher de ce martinet du moulin, la bouteille fut cassée par malheur, & la matiere étant perdue, je ne pus pousser l'opération à la fin.

Ces expériences peuvent répandre plus de lumiere sur la nature du Vif-Argent. J'en ai fait plusieurs autres sur le Mercure & sur les métaux, fort différentes de celles-ci, & qui m'ont coûté beaucoup plus de travail. Je les donnerai au public dès que j'en aurai trouvé le tems.

S U I.

~~~~~
SUITE DES OBSERVATIONS
DU THERMOMETRE,

Faites à l'Isle de Bourbon par M. COSSIGNY,
Correspondant de l'Académie ;

Et le Résultat de celles de chaque mois, faites à
Paris pendant l'année 1734, avec un Thermo-
metre pareil à celui de M. Cossigny.

Par M. DE REAUMUR.

M COSSIGNY partit de la rade de l'Orient pour l'Isle de Bourbon le 1^{er}. Janvier 1732, bien pourvu de Thermometres construits sur nos principes. Pendant sa route, il fut attentif à observer chaque jour la hauteur où se trouvoit la liqueur du Thermometre aux heures les plus chaudes de l'après-midi. Après son arrivée à l'Isle de Bourbon, il continua ses observations, & il les continua de même à l'Isle de France & à la Baye d'Antongil de l'Isle de Madagascar où il fut obligé d'aller. Il nous envoya en 1733 toutes celles qu'il avoit faites pendant plus de quatorze mois consécutifs; nous les avons rapportées dans les Mémoires de 1733. Le résultat de ces observations est assurément curieux. Il fait voir qu'on peut passer la Ligne, & habiter constamment dans les lieux situés entre les Tropiques, sans avoir à craindre de souffrir des chaleurs plus grandes que celles auxquelles nous sommes exposés à Paris dans certains jours d'Eté. M. Cossigny a continué ses observations, & nous a envoyé celles

celles qu'il a faites pendant près de douze autres mois à l'Isle de Bourbon, c'est-à-dire, celles qu'il y a faites pendant le mois d'Avril, & tous les autres mois suivans de 1733, & pendant les mois de Janvier, & Février de 1734. Nous croyons faire plaisir au Public en les lui communiquant; il verra que le résultat des premières observations n'a point été démenti par les suivantes. Afin même qu'on ait ici une suite d'observations faites pendant douze mois presque complets, nous reprendrons celles de quelques jours de Mars 1733, quoiqu'elles aient déjà été imprimées.

Observations des degrés auxquels s'est trouvée la liqueur du Thermometre à l'Isle de Bourbon, à deux ou trois heures après midi, depuis le 4 Mars 1733 jusqu'au 1 de Mars 1734.

M A R S 1733.

Jours.	Degrés.
4. à	26.
5.	26 $\frac{1}{2}$.
6.	26 $\frac{1}{2}$.
7.	24 $\frac{1}{2}$.
8.	24 $\frac{1}{2}$.
9.	25 $\frac{1}{2}$.
10.	24.
11.	24 $\frac{1}{2}$.
12.	25.
13.	25.

Ici finissoit la Table des observations du mois de Mars; & dans une Lettre écrite à la fin du même mois, M. Cossigny me marquoit que depuis le 13 jusqu'au 26, la hauteur de la liqueur du Thermometre avoit été entre 26, 27 & 28 degrés.

AVRIL

ILLET.

Thermom.

Degrés.

22

22

23

22

22

21 $\frac{1}{2}$

21 $\frac{1}{2}$

22

23 $\frac{1}{3}$

22 $\frac{1}{2}$

22 $\frac{1}{2}$

23

22 $\frac{1}{2}$

22

22

23

23 $\frac{3}{4}$

23 $\frac{3}{4}$

23

21

21 $\frac{1}{2}$

23 $\frac{1}{2}$

22 $\frac{1}{2}$

22

22

20 $\frac{1}{2}$

22

22

22 $\frac{1}{2}$

22 $\frac{1}{2}$

22 $\frac{1}{2}$



O B R E. N O V E M B R E.

Thermom.		Thermom.
Degrés.	Jours.	Degrés.
22	1	22
23	2	25
23	3	25
22 $\frac{1}{2}$	4	25
22	5	24 $\frac{3}{4}$
21	6	24 $\frac{2}{3}$
22	7	24 $\frac{3}{4}$
21 $\frac{1}{2}$	8	24 $\frac{3}{4}$
22	9	24
22 $\frac{1}{2}$	10	24
21	11	23 $\frac{2}{3}$
20 $\frac{1}{2}$	12	24
21 $\frac{1}{2}$	13	24 $\frac{1}{2}$
21 $\frac{1}{3}$	14	25
21	15	23
21 $\frac{1}{3}$	16	24
22 $\frac{2}{3}$	17	25 $\frac{1}{3}$
22	18	25
22	19	23 $\frac{1}{3}$
22	20	22
23	21	20 $\frac{1}{2}$
23 $\frac{1}{2}$	22	23
22	23	24 $\frac{1}{2}$
23	24	24 $\frac{1}{2}$
25	25	24 $\frac{1}{2}$
26	26	22
23 $\frac{1}{2}$	27	22
23 $\frac{2}{3}$	28	21
22 $\frac{1}{2}$	29	23
23	30	23

EVRIER.

	Thermom.
rs.	Degrés.
	25 $\frac{1}{2}$
	26
	26
	25 $\frac{1}{2}$
	26
	26
	25
	24 $\frac{1}{2}$
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	25
	24 $\frac{3}{4}$
	24 $\frac{3}{4}$
	26
	26 $\frac{1}{2}$
	23
	26
	26
	26
	25 $\frac{1}{2}$
	25 $\frac{1}{2}$
	25 $\frac{1}{2}$
	25





61

en-
du
ux
ousindre
leur.. 24^d.. 23^d.. 22^d $\frac{1}{2}$.. 21^d.. 20^d $\frac{1}{2}$.. 20^d.. 21^d.. 21^d.. 20^d $\frac{1}{2}$.. 22^d.. 22^d $\frac{1}{2}$.. 23^d.

f. a



Si nous prenons dans les Tables précédentes de chaque mois les jours où la liqueur du Thermometre a monté le plus haut, & ceux où elle s'est tenue le plus bas après midi, nous trouverons ce qui suit.

JOURS.	Plus grande chaleur.	JOURS.	Moindre chaleur.
M A R S 1733.			
Les dern. jours du mois à	28 ^d .	Le 10. à	24 ^d .
A V R I L.			
Le 18. à	27 ^d $\frac{1}{2}$.	Le 13. à	23 ^d .
M A I.			
Le 2. à	26 ^d .	Le 13. à	22 ^d $\frac{1}{2}$.
J U I N.			
Le 1. à	24 ^d $\frac{1}{2}$.	Les 24. & 26. à	21 ^d .
J U I L L E T.			
Le 17. à	23 ^d $\frac{3}{4}$.	Le 26. à	20 ^d $\frac{1}{2}$.
A O U T.			
Le 28. à	25 ^d .	Les 14. 22. & 23. à . . .	20 ^d .
S E P T E M B R E.			
Les 16. 17. 25. & 29. à	23 ^d .	Les 6. 7. & 13. à . . .	21 ^d .
O C T O B R E.			
Le 26. à	26 ^d .	Les 6. 11. & 15. à . . .	21 ^d .
N O V E M B R E.			
Le 17. à	25 ^d $\frac{1}{3}$.	Le 21. à	20 ^d $\frac{1}{2}$.
D E C E M B R E.			
Le 7. à	27 ^d .	Le 22. à	22 ^d .
J A N V I E R 1734.			
Le 24. à	28 ^d .	Les 12. & 13. à	22 ^d $\frac{1}{2}$.
F E V R I E R.			
Depuis le 9. jusqu'au 16. à	27 ^d .	Le 21. à	23 ^d .

La plus grande chaleur qui se soit fait ressentir à l'Isle de Bourbon, pendant douze mois consécutifs, a donc été marquée par 28 degrés de hauteur de la liqueur du Thermometre, & la liqueur n'est montée à ce terme que le 28 Janvier & les derniers jours de Mars. Dans les après-midi les moins chaudes, qui ont été celles des 14, 22 & 23 Août, la liqueur s'est tenue à 20 degrés. La différence entre la chaleur de l'après-midi la plus chaude de ces douze mois, & celle de l'après midi la moins chaude, n'a donc été que de 8 degrés. Nous sommes sujets dans nos climats à des inégalités bien plus considérables. Pour en être convaincu, on n'a qu'à consulter la Table des plus grands chauds & des plus grands froids de chaque mois de l'année 1734, qu'on trouvera ci-après. Quoique cette année ne nous ait fait ressentir ni froid ni chaud excessif, on verra que le 24 Juin la liqueur du Thermometre s'est élevée à 27 degrés $\frac{1}{2}$ à 3 heures après-midi, & que le 22 Janvier à pareille heure, elle étoit à 2 degrés au-dessous de la congélation: ainsi, à Paris, la différence entre la chaleur de l'air de deux après-midi a été exprimée par plus de 29 degrés. Dans d'autres années on trouvera cette différence de 32 degrés & plus, & elle n'est à l'Isle de Bourbon que de 8 degrés. Les voyageurs se réunissent pour vanter la salubrité de l'air de cette Isle. Il la doit peut être en grande partie à ce que sa température ne varie pas aussi considérablement que celle du nôtre.

La différence qui est entre notre position

&

& celle de l'Isle de Bourbon , nous montre assez que d'un Solstice à l'autre, nous devons être sujets à des variétés de chaud & de froid qu'on n'éprouve pas dans cette Isle. On ne voit pas de même pourquoi nous sommes sujets à des inégalités de chaleur beaucoup plus grandes dans le même mois, & dans les mois même où le Soleil est presque stationnaire, où nous sommes sujets à des variétés auxquelles l'éloignement ou l'approche du Soleil n'ont aucune part. Nous trouverons, par exemple, dans la Table suivante, que dès le 18 Mai la liqueur s'est élevée à 3 heures après-midi à 26 degrés, & que le 26 du même mois à 2 heures après-midi la liqueur n'étoit qu'à 10 degrés; ainsi le 26 la liqueur étoit à 16 degrés plus bas qu'elle n'avoit été le 18 à pareille heure. Dans 8 jours de tems on a une difference de chaleur exprimée par un nombre de degrés, double de celui qui exprime la variation de chaleur trouvée dans l'Isle de Bourbon pendant le cours de 12 mois, à de pareilles heures, & triple ou quadruple de la variation d'un mois dans la même Isle. Les mois de Juin, de Juillet & d'Août nous fournissent dans d'autres années de ces variétés & de plus grandes. On trouvera celles que nous avons eues en 1734 dans la Table suivante. On y marque le jour de chaque mois où la liqueur est descendue le plus bas le matin; le jour de chaque mois où la liqueur a été le plus bas l'après-midi; le jour de chaque mois où la liqueur a été le plus haut le matin; & le jour de chaque mois où la liqueur s'est le plus élevée après midi. Pendant les

mois de Septembre & d'Octobre j'ai été en Poitou, ou en route pour y aller & pour en revenir, & j'ai marqué les endroits où les observations ont été faites; les autres observations ont été faites, rue St. Thomas du Louvre, à l'Hôtel d'Uzès, avec un Thermomètre exposé au Nord à l'air extérieur, ou à Charenton. Les degrés qui se trouvent au-dessus de ce trait—, sont au-dessus de la congélation, & ceux qui sont au-dessous, sont au-dessous de la congélation.

Cette Table nous apprend que le 4 Janvier à 6 heures du matin, la liqueur du Thermomètre étoit à 10 deg. $\frac{3}{4}$ au-dessus de la congélation, & que le 26 du mois de Mai à 2 heures après midi, elle n'étoit qu'à 10 degrés. Il faisoit donc plus chaud le 4 Janvier à 6 heures du matin que le 26 Mai à 2 heures après midi; cependant dès le 18 Mai, la liqueur s'étoit élevée l'après-midi à 26 degrés, ce qui marque un degré de chaleur de nos jours d'Eté très chauds.

Le 24 Juin est de tous les jours de cette année celui où nous avons observé la liqueur plus haut; après midi elle s'éleva à 27 degrés $\frac{1}{3}$. Les observations rapportées par M. Maraldi donnent le 8 Septembre pour le jour le plus chaud, & nous l'eussions apparemment trouvé tel, si nous eussions été à Paris. La liqueur de l'ancien Thermomètre de l'Observatoire y monta à 75 degrés; j'étois ce jour-là à Saint-Dié près de Blois. La liqueur de notre Thermomètre posé en dehors d'une fenêtre tournée vers le Nord, ne monta qu'à 27 degrés; mais la différence des positions d'un

d'un Thermometre peut donner de plus grandes differences que celles d'un demi-degré, ou même d'un degré. J'ai souvent observé que dans une chambre d'une grandeur médiocre, la liqueur du Thermometre placé à côté de la cheminée, étoit constamment élevée de 3 degrés de plus que celle du Thermometre qui étoit placé vers le milieu de cette chambre.

Notre Table nous donne le plus grand froid le 23 Janvier à 7 heures $\frac{1}{2}$ à 6-degrés $\frac{1}{2}$ au-dessous de la congélation. Le 10 Décembre à pareille heure à-peu-près, nous avons eu la liqueur à 6 degrés au-dessous de la congélation, & ce dernier jour est celui qui a été trouvé le plus froid à l'Observatoire.

Le 5 Septembre j'étois en route vers les cinq heures après midi, la liqueur de deux Thermometres qui étoient dans ma Berline, étoit à 25 degrés; nous étions quatre dans la même Berline, à qui ce degré de chaleur étoit très incommode. Je voulus voir quel étoit alors le degré de chaleur de ma peau, & deux autres personnes eurent la même curiosité pour avoir celui de la leur. Nous appliquames les boules des Thermometres immédiatement contre notre peau au-dessous de la poitrine, nous les recouvrimes autant qu'il étoit possible, pour que l'air extérieur fît sur elles peu d'impression. La chaleur de nos peaux se trouva à-peu-près la même; elle ne put faire monter la liqueur à plus de 32 degrés, & celle d'un de nous trois ne la fit monter qu'à 31 $\frac{1}{2}$. J'ai rapporté ailleurs que j'avois fait une épreuve semblable pendant

l'Hiver, étant auprès de mon feu où l'air étoit tempéré. La chaleur de ma peau fit alors monter la liqueur du Thermometre à 32 degrés, comme dans l'expérience précédente. Nous pouvons donc être dans un air dont nous avons peine à supporter la chaleur, & dans un air dont nous aimons la température, sans que notre peau ait réellement un plus grand degré de chaleur dans l'une que dans l'autre de ces circonstances.



OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES

FAITES A UTRECHT

PENDANT L'ANNEE M. DCCXXXIV.

Extraites d'une Lettre de M. MUSSCHENBROEK.

Par M. DÜ FAY.

M MUSSCHENBROEK Professeur de Mathématiques à Utrecht, & Correspondant de l'Académie, qui fait depuis plusieurs années les observations Météorologiques en cette ville, avec toute l'attention & toute l'exaétitude qu'on peut attendre d'un homme aussi versé qu'il l'est dans toutes les parties de Physique & de Mathématique, m'a envoyé celles de l'année 1734; M. de Mairan à qui j'ai communiqué cette Lettre, en a extrait ce qui concernoit les Aurores Boréales, & en a rendu compte à l'Académie; j'ai fait
la.

la même chose pour ce qui regarde les Parhélies, Halos, ou Paraselènes, & on trouvera dans les Mémoires de l'année prochaine, plusieurs observations que j'ai faites ou recueillies sur cette matière, parmi lesquelles sont celles de M. Musschenbroëk. Je vais maintenant faire un extrait de ses autres observations, qui n'ont pu trouver place dans ces deux Mémoires.

La plus grande hauteur du Barometre fut à Utrecht le 22 Janvier, elle fut de 29 pouces 10 lignes $\frac{1}{2}$, mesure du Rhin, ce qui revient à 28 pouces 10 lignes $\frac{1}{4}$, ou environ, de notre mesure. M. Musschenbroëk n'avoit point encore vu le mercure monter aussi haut: le vent étoit au Nord, & ce qu'il y eut de singulier, c'est que le lendemain le Ciel fut couvert, & il dégelait un peu; cependant le mercure ne baissa que d'une demi-ligne, & demeura encore le jour suivant à la même hauteur. Ce fut le 25 Décembre à midi qu'il fut le plus bas, il n'étoit qu'à 27 pouces 8 lignes, ou 26 pouces 8 lignes $\frac{1}{4}$ de notre mesure. Ce jour-là fut mémorable par une tempête qui fit périr un très grand nombre de Bâtimens, tant sur les côtes de Hollande que sur celles d'Angleterre. Le plus grand froid a été le 22 Janvier sur le soir, le même jour auquel le Barometre avoit aussi été le plus élevé; le Thermometre de Fahrenheit étoit à 22 deg. ce qui répond à 5 degrés au-dessous du terme de la congélation du Thermometre de M. de Reaumur; & le plus grand chaud a été le 19 Mai & le 9 Juillet, le Thermometre de Fahrenheit ayant monté ces deux jours-là au 82^{me}.

degré, ce qui revient au $23\frac{1}{2}$ de celui de M. de Reaumur. Il y eut le 5 Juillet une pluye prodigieuse; car depuis 11 heures du matin jusqu'à minuit il tomba 47 lignes $\frac{1}{2}$ d'eau, & cependant il y eut une interruption assez considérable depuis le commencement jusqu'à 2 heures après midi; cette pluye fut accompagnée d'un tonnerre peu considérable, qui dura depuis 3 heures $\frac{1}{2}$ jusqu'au soir.

La quantité d'eau de pluye tombée à Utrecht en 1734, a été de 35 pouces 11 lignes $\frac{3}{4}$, ou 34 pouces 9 lignes de notre mesure, ce qui seroit beaucoup plus pour Paris que ce n'est pour Utrecht, car on y compte l'année moyenne de 24 pouces du Rhin, ou de 23 pouces 10 lignes du pied de Roi. La somme de l'évaporation pendant toute l'année a été de 25 pouces 3 lignes, ce qui fait 24 pouces 2 lignes $\frac{1}{2}$, mesure de France.

M. Musschenbroek fait avec un soin très particulier les observations de l'inclinaison & de la déclinaison de l'aiguille aimantée, & il a trouvé qu'il y avoit quelquefois d'un jour à l'autre des changemens assez considérables; les aiguilles dont il se sert, sont très grandes, & elles demeurent toujours dans la même position sur des appuis très solides, & desquels il a eu soin d'éloigner tous les corps métalliques qui pouvoient apporter quelque dérangement aux observations; la déclinaison a varié dans le cours de cette année depuis $12^d 55'$ jusqu'à 14^d , & en général les plus grandes déclinaisons ont été pendant les mois de Juillet, Août & Septembre, mais cette règle n'a pas été sans exception: l'inclinaison de l'ai-

l'aiguille aimantée a varié depuis 71^d 10' jusqu'à 77^d 30', elle a demeuré pendant plusieurs jours à cette déclinaison au mois de Novembre pendant une gelée assez forte, mais les autres changemens sont arrivés dans toutes les températures indifferemment, si ce n'est qu'après avoir été presque toujours croissante depuis le milieu de Juillet jusqu'au milieu de Novembre, elle a déchu ensuite jusqu'à la fin de l'année, où elle n'étoit que de 73^d 35'.



JOURNAL D'OBSERVATIONS

DES AURORES BOREALES,

*Qui ont été vues à Paris ou aux environs,
à Utrecht, & à Petersbourg, dans le
cours de l'année 1734.*

Avec quelques Observations de la Lumiere Zodiacale.

Par M. DE MAIRAN. *

JE remarquai l'année dernière, en finissant un pareil Journal, qu'elle avoit été moins féconde en grandes Aurores Boréales que la précédente 1732, & 1732 moins encore que l'année 1731. Il n'en étoit pas tout-à-fait de même à l'égard de la fréquence absolue du Phénomene pris indifferemment dans toutes

* 10. Decemb. 1734.

tes ses apparitions plus ou moins marquées ; car il avoit paru plus souvent en 1732 qu'en 1731. Mais sa diminution tant de fréquence, que de grandeur & de régularité, a été beaucoup plus sensible cette année 1734, que dans aucune de celles dont je viens de parler. Ce qui doit sans doute être attribué en partie au mauvais tems, & à plusieurs nuits sombres qu'il a fait cette Automne, c'est-à-dire, dans la saison de l'année où les Aurores Boréales sont communément les plus fréquentes, les plus grandes, & les plus régulières.

Janvier. Je n'ai observé le Phénomene dans tout ce mois, que le 8, quoiqu'il s'y soit passé peu de soirées sans que j'y aye fait attention ; il étoit *informe*, & répandu par gros flocons de matiere lumineuse en divers endroits du Ciel, le Nord en étant cependant beaucoup plus chargé que tout le reste. Je l'avois apperçu dès 6 heures $\frac{1}{2}$ du soir, malgré le tems sombre qu'il avoit fait toute la journée, & qui duroit encore. Il est vrai que la Lune qui avoit 4 jours, & qui étoit sur l'horizon, pouvoit rendre ces apparences équivoques ; mais à 8^h $\frac{3}{4}$, & après le coucher de la Lune, l'Aurore Boréale n'étoit plus douteuse ; elle me fut bientôt dérobée par quantité de nuages obscurs.

J'ai appris par des personnes qui étoient sur pied à 4 heures du matin, le jour des Rois, qu'ils avoient vu vers le Nord, & le Nord-Ouest, une grande clarté, comme si le jour alloit paroître. C'étoit, selon toute apparence, un reste de l'Aurore Boréale de la veille (le 5), laquelle n'avoit pu se montrer à cause
du

du tems sombre; car ce n'étoit ni l'heure, ni le lieu de la Lumiere Zodiacale, & il n'y avoit point de Lune.

J'ai appris auffi par deux Lettres de M. *Bouillet*, que le 9, après le coucher du Soleil, on avoit vu à Servian, gros villagé à 2 ou 3 lieues de Béziers, une bande de lumiere rougeâtre qui s'élevoit au-dessus de l'horizon, à-peu-près à l'endroit du coucher. C'étoit, sans doute, la Lumiere Zodiacale; mais comme cette lumiere ne se terminoit nullement en pointe, qu'elle montoit fort haut, & qu'elle dura assez avant dans la nuit sous cette forme, il y a grande apparence auffi que la matiere de l'Aurore Boréale s'y mêla, comme il arrive souvent, & sous l'apparence d'une de ces bandes Zodiacales dont nous avons parlé plusieurs fois dans les observations des années précédentes.

Du reste, je n'ai vu la Lumiere Zodiacale qu'une ou deux fois dans tout ce mois, quoique j'y aye été attentif, & qu'il ait fait plusieurs belles soirées très propres à la faire paroître.

Février. Le 3, le tems ayant été couvert après le coucher du Soleil, & longtems après, j'ai été averti à 11 heures qu'il paroisoit une Aurore Boréale, & je l'ai trouvée en effet très bien formée, clair-céladon, horizontale, & déclinant beaucoup vers l'Occident: elle s'étendoit depuis l'Ouest jusqu'au Nord-Est; le Ciel étoit serein dans toute cette partie, & les Etoiles y brilloient. La plus grande clarté du Phénomene, &, comme je le présume, son milieu répondoit au dessous

& entre le triangle de Cassiopée & les Etoiles du Dragon, dont plusieurs se trouvoient alors disposées verticalement. Quelques minutes après elle a été coupée par une bande noire horizontale, de 2 ou 3 degrés de largeur, élevée de 5 à 6, & le Ciel s'est bientôt couvert de brouillards ou de matiere fumeuse & opaque; j'ai cru y appercevoir quelques rayons à la jambe orientale de l'arc vers les $11^h \frac{1}{4}$, mais tout cela a disparu, ou a été obscurci dans un instant.

Le 18, j'ai vu dans le Ciel, peu de tems après le coucher du Soliel, de ces bandes blanchâtres, concourantes vers les deux points opposés, en forme de côtes de melon, dont j'ai parlé plus d'une fois dans les observations des deux années précédentes, & qui m'ont paru tenir quelque chose de la matiere de l'Aurore Boréale, ou l'annoncer comme prochaine.

Le 21, la Lumiere Zodiacale a paru fort grande vers les $7^h \frac{1}{2}$ du soir.

Le 22, il y a eu une Aurore Boréale, tranquille, basse, mais assez bien terminée. Je ne l'ai observée que sur ses fins, ou pendant que des nuages l'offusquoient, vers les $8^h \frac{1}{2}$ du soir; mais M. *Godin* qui l'a vue à $7^h \frac{3}{4}$, m'en a donné une note, d'où je recueille qu'il y avoit un segment obscur, & par-dessus un arc lumineux très brillant; que la corde de cet arc mesurée sur l'horizon étoit de 104 degrés, & que son milieu, qui s'élevoit à plus de 10 degrés, déclinait du Nord vers l'Ouest de 14 degrés. La luisante de la queue du Cigne étoit à cette heure sur le bord de l'arc.

l'arc lumineux, dont la largeur étoit d'environ $1^d \frac{1}{2}$; mais cette Etoile déclinait vers l'Ouest par rapport au sommet de l'arc. Le même Phénomène a été observé à Bayeux par M. l'Abbé *Outhier*, avec quelques différences que la situation, l'heure & d'autres circonstances peuvent avoir occasionnées.

Le 26, malgré un Ciel fort couvert, & par un vent de Sud qui tenoit de la tempête, il y a eu vers les $8^h \frac{3}{4}$ du soir, des signes fort marqués de l'Aurore Boréale, des trainées de lumière blanches, des nuages rougeâtres, que je ne saurois attribuer à aucune autre cause.

Mars. Le 8. de ce mois, par un tems fort semblable à celui du 26 Février, & le Barometre se trouvant plus bas que je ne l'avois vu depuis long-tems, savoir à 26 pouces 9 lignes, j'ai vu l'Aurore Boréale, qui a été aussi remarquée à 9^h par M. *Grand-Jean*, & quelque tems après par M. *Godin*.

Le 28, le 30 & le 31, la Lumière Zodiacale, ou l'Aurore Boréale, ou peut-être les deux ensemble ont paru; car il m'a été difficile de les bien distinguer: cependant je présume qu'il y a eu certainement beaucoup de matière Boréale le 31.

Le 11 & le 14, la Lune a été environnée d'une couronne ou *Halo*, que je juge avoir été du nombre de celles qui ont 44 à 45 degrés de diamètre.

Avril. L'Aurore Boréale s'est souvent montrée dans ce mois: elle a été bien décidée le 5, le 7 & le 8; douteuse ou peu marquée le

le 2, le 4, le 9 & le 10; mais cette dernière n'a pas été peu marquée en Italie.

Celle du 8 a été ici la plus forte: elle avoit des jets de lumière, & paroïssoit avec la Lune qui avoit quatre jours. Je juge qu'elle pouvoit avoir commencé vers les 8 heures. La journée avoit été froide; le Soleil y avoit souvent été caché par les nuages, avec de la pluye & de la grêle. A 8^h $\frac{1}{4}$, il y avoit sous l'Etoile Polaire une si grande clarté rougeâtre, & si semblable à l'effet d'un grand feu allumé derrière des murs qui le cacheroient, que me trouvant alors dans les rues, j'ai été obligé de monter chez moi, & de voir cette partie du Ciel à découvert, pour me convaincre que c'étoient les approches d'une grande Aurore Boréale, dont je voyois déjà çà & là divers rayons, qui partoient de plusieurs nuages fumeux répandus du côté du Nord. A 9^h l'arc étoit formé, mais assez mal terminé, fort large, d'environ 4 à 5 degrés, de couleur céladon fort beau & fort vif. Je n'ai pu bien distinguer le pied occidental de cet arc, ni l'extrémité du segment obscur qu'il bordoit, à cause de la clarté de la Lune qui étoit au-dessus, & de plusieurs nuages vrais ou apparens qui s'y mêloient; mais l'extrémité opposée de ce segment vers l'Est, passoit 2 ou 3 degrés au-delà du vertical de l'Etoile α de la Lyre vers le Midi, c'est-à-dire, 47 ou 48 degrés d'amplitude orientale; de sorte que comptant l'occidentale à environ 85 ou 86, à-peu-près sous le vertical de la Lune, on aura 132 ou 133 degrés pour la corde horizontale du segment, &

sa déclinaison de 18 à 20 degrés. Comme il étoit mal terminé, je n'ai pu juger de la hauteur de son sommet qu'imparfaitement, de 12 à 15 degrés. Il y a eu encore quelques jets après 9^h $\frac{1}{4}$, presque toujours mêlés de matiere fumeuse, la clarte dominante tirant vers le citrin céiaddon. Le Phénomene a toujours été ensuite en diminuant de vivacité & de hauteur, & à 11 heures on ne voyoit plus qu'une petite clarté blanchâtre vers cette partie du Ciel.

Les circonstances du tems ne m'ont pas permis d'observer le Phénomene du 10. Je vis seulement du côté de l'Est vers les 9 heures, une assez grande clarté dont la présence de la Lune me rendoit la cause douteuse, parce que du côté opposé où elle étoit, & où le Ciel se trouvoit plus découvert, cet Astre dardoit sa lumiere sur la plupart des nuages, ou sur des pelotons de matiere fumeuse & boréale qui étoient parsemés dans tout le reste du Ciel. Mais j'ai été bien dédommagé de ces obstacles par l'exacte description que M. *Manfredi* m'a envoyée de ce qu'il avoit vu à Bologne le même jour & à la même heure. Il observa, sans doute, par un tems très favorable, puisqu'à compter depuis 8^h $\frac{1}{4}$ qu'il commença d'appercevoir le Phénomene, jusqu'à minuit, il en remarqua toutes les apparences presque à chaque minute. Je garde précieusement ce détail pour m'en servir dans l'occasion, & je me contente d'en transcrire ici ce qu'il contient de plus essentiel par rapport au plan que je me suis fait dans ce Journal.

Le

Le Phénomene consistoit d'abord, à 8h $\frac{3}{4}$ du soir, en une lumiere couchée sur l'horizon à l'Orient équinoctial: elle étoit si vive, qu'on eût dit que le Soliel alloit se lever. Au-dessus de cette lumiere, en tirant vers la droite, ou voyoit une matiere fumeuse, de couleur cendrée, qui s'élevoit par pelotons; & un peu plus haut, à environ 5 à 6 degrés au-dessus de l'horizon, & perpendiculairement sur le milieu du Phénomene, paroissoit un petit nuage lumineux & rougeâtre, qui s'y maintint sans changer de place jusqu'à 9 ou 10 minutes après 9 heures. Tout cet amas de lumiere & de fumée sembla ensuite avoir un mouvement qui le rapprochoit du Nord, conservant toujours cependant une position fort orientale. Il y eut quelques rayons, dont les plus grands ne montoient gueres au-delà de 8 degrés $\frac{1}{2}$. Vers les 10 heures, c'étoit la partie septentrionale du Phénomene qui étoit la plus brillante. Enfin la lumiere s'affoiblit de vivacité & d'étendue, & il n'en restoit à minuit que quelques traces, sous une forme ronde, & de la grandeur de la Lune naissante. Ces sortes d'Aurores Boréales, ou plutôt Orientales, sont très rares.

Les Aurores Boréales du 5 & du 7 dans le même mois, & dont j'ai déjà fait mention, étoient du nombre de celles que j'appelle *informes*. Celles du 2, du 4 & du 9 m'ont paru douteuses en ce qu'elles étoient foibles & mêlées de la Lumiere Zodiacale, si ce n'étoit la Lumiere Zodiacale toute seule qui paroissoit, & mal terminée, comme je juge

ge qu'elle a paru encore le 29 du même mois.

Mai. J'apprends de M. *Maraldi* qu'il y a eu une petite Aurore Boréale le 24. Le 2, la Lumière Zodiacale s'étendoit jusqu'aux Etoiles des Gemeaux, mais mal terminée. Je ne donne aucun détail du Parhélie qui fut observé le jour précédent, & que M. *du Fay* a décrit. Il me suffit d'en faire mention, pour remplir mon objet, dans l'ignorance où je suis de la liaison que tous ces Phénomènes pourroient avoir ensemble.

Juin. Je n'ai rien apperçu dans ce mois, ni de l'Aurore Boréale ni de la Lumière Zodiacale.

Juillet. Le 2, je juge par une lumière qu'il y a vers le Nord à 11^h, & qui surpasse celle du Crépuscule, de même que par plusieurs autres circonstances, qu'il y a assurément une Aurore Boréale.

Août. L'Aurore Boréale paroît le 23 à 11^h par une simple clarté, mais bien marquée sur l'horizon, presque directement au-dessous de l'Etoile Polaire, ayant seulement une déclinaison occidentale de 2 ou 3 degrés.

Le 24, le 25, le 26 & le 30, il n'y a eu que des apparences équivoques du Phénomène, tant par elles-mêmes, que par les circonstances extérieures du tems. Mais le 31 il y a eu une de ces Aurores Boréales qui occupent presque tout l'horizon, & qu'on peut par-là appeler *horizontales*. Celle-ci consistoit en un nuage fumeux surmonté de blanc, à 5, 6, 10 & 12 degrés de hauteur; un peu plus haut on voyoit les Etoiles ternies, sans doute par la continuation de la même matie-

re

re autrement distribuée ou modifiée; ce que j'ai observé avec divers changemens peu remarquables depuis 9^h du soir jusqu'à 11.

Septembre. Le 19 de ce mois, étant à Nointel près de Beaumont, j'ai observé l'Aurore Boréale à rayons & jets de lumière, mais sans arc lumineux, ni segment obscur, ce qui est assez rare, & qui pourroit même être douteux en cette occasion; parce que je n'ai commencé de l'observer qu'à 10 heures, & que j'ai vu qu'elle paroïssoit avec beaucoup d'éclat tout au moins à 9. Or, comme je l'ai remarqué dans mon Traité sur cette matiere, l'arc ou le limbe lumineux, & le segment obscur venant à ne plus former qu'un amas confus de lumière sur la fin du Phénomene, lorsque, selon ma conjecture, toutes ses parties ont eu le tems de s'enflammer, il y a grande apparence que je n'ai vu celui-ci qu'en cet état; & en effet il a toujours diminué jusqu'à 11 heures, où il n'en restoit aucun vestige.

Le 20, il y a eu sûrement une Aurore Boréale, mais si obscurcie & si interrompue par les nuages, que je n'ai rien à en dire de positif. L'on m'a appris depuis qu'elle avoit été beaucoup mieux vue à Paris, & les mêmes personnes m'assurent qu'un semblable Phénomene y avoit paru le 13.

Le 23 & le 27, Aurores Boréales bien marquées & très lumineuses, mais dont on ne peut déterminer les limites, à cause du tems sombre, nébuleux, & changeant.

Le 28, autre Aurore Boréale à-peu-près dans les mêmes circonstances de tems que les

les deux précédentes ; mais qui a eu cela de particulier, qu'elle a été d'abord *Lumière Boréale & Méridionale* tout ensemble, le reste du Ciel étant parsemé çà & là dans ses autres parties, & sur-tout vers le Zénith, de la même matière. C'est l'état où étoit le Phénomène lorsque je l'ai apperçu à 8^h $\frac{1}{2}$, après quoi il m'a été souvent caché en tout ou en partie. A 11^h, toute cette matière fumeuse ou éclairée s'étoit entièrement jettée vers le Nord, l'Ouest & l'Est, du moins n'en ai-je rien pu discerner vers le Midi.

Le 29, à Paris, après une belle journée & un beau coucher, n'ayant rien vu dans le Ciel qui m'annonçât l'Aurore Boréale, j'avois négligé d'y être attentif ; mais ayant été averti à 11^h qu'elle paroissoit, je l'ai trouvée en effet très bien formée, à *segment*, avec un *arc* lumineux, foible & blanchâtre ; ce qui joint à quelques autres circonstances, me fait juger qu'elle devoit avoir commencé depuis quelque tems & tirer sur sa fin. Le limbe de l'arc étoit comme entrelacé avec les Etoiles de la grande Ourse, passant à gauche ou du côté de l'Occident entre les Etoiles β & γ de cette Constellation, & à droite entre celles qui sont marquées ϵ , ζ , & η , de manière que β , ϵ , ζ , sembloient raser le bord supérieur de ce limbe, & γ , η , l'inférieur, le milieu où le sommet se trouvant entre ces deux dernières, mais un peu plus près de η que de γ . Ce qui donne une détermination de sa hauteur de 13 à 14 degrés au bord supérieur, & de 12 à 13 à l'inférieur, sa largeur demeurant par-là d'environ un degré. J'ai aussi déterminé

né son amplitude occidentale de 59 ou 60, par le moyen du vertical de l'Etoile de la Lyre, où se trouvoit assez exactement le pied de cet arc; mais je n'ai pu voir son pied oriental, à cause de la face du vieux Louvre qui répond à cette partie du Ciel, & qui me la cachoit. A 11h $\frac{1}{4}$ il ne restoit presque plus rien du Phénomene.

Octobre. Le 10, à 9h il y avoit autour de la Lune une couronne dont la partie comprise entre son centre & l'Etoile de la Lyre, m'a paru partager cet intervalle, en raison de 2 à 5, les 5 demeurant entre l'arc de la couronne & l'Etoile. Ce qui par le lieu actuel de la Lune (à environ $23^{\circ} 38'$ $\times$; latitude septentrionale $3^{\circ} 20'$) & la distance à cette Etoile (environ 78°), donne un peu plus de 22 degrés de rayon à la couronne: c'est à-peu-près la mesure ordinaire de ces Phénomènes, selon M. *Huygens*.

Dans la plupart des jours de ce mois le tems a été sombre, pluvieux, & accompagné quelquefois d'un vent de tempête; par exemple, le 15 & le 16, le Barometre qu'on a à Nointel où j'étois, s'est trouvé fort bas, & 3 ou 4 lignes au dessous de 27 pouces. C'est un Barometre à gros tuyau, où j'ai vérifié que le Mercure peut aller jusqu'au bout. L'Aurore Boréale aura donc pu être bien des fois dans l'Atmosphère, sans paroître: mais j'ai jugé qu'elle y étoit sûrement le 19, par la grande clarté que j'ai vue du côté du Nord, depuis l'entrée de la nuit jusqu'à 11h $\frac{1}{2}$, & de même à-peu-près le 21 & le 23.

Le 25, le Ciel étant beaucoup plus serein,

le Phénomene a paru après 7 heures du soir, il étoit tranquille, & à *simple Lumiere septentrionale*, déclinant vers le Couchant. Cette lumiere, ou, si l'on veut, cette espece de nuage blanc & lumineux, formoit au-dessous de la grande Ourse un segment bien terminé, dont le sommet, autant que j'en ai pu juger, répondoit à l'intervalle des deux Etoiles δ, ϵ , de cette Constellation, & il déclinait par-là vers le Couchant, d'une vingtaine de degrés. Il faut remarquer cependant que dans les Aurores Boréales fort basses, il est mal-aisé de distinguer le sommet du segment par lui-même. Telle étoit celle-ci, où la hauteur de ce sommet ou de la partie que j'ai prise pour le milieu, m'a paru un peu moindre que la distance de la premiere & de la dernière Etoile (ϵ, η ,) de la queue de l'Ourse, à laquelle je pouvois aisément la comparer. Et je n'ai pu déduire ce milieu de l'amplitude du segment sur l'horizon, parce que du lieu où j'étois il m'étoit caché à l'Orient, & qu'au Couchant il y avoit une espece de gros nuage qui couvroit la lumiere. Le Phénomene s'est soutenu à la même hauteur jusqu'à 11 heures, après quoi il a diminué sensiblement d'étendue, & de clarté.

Le 26, le 27, le 28 & le 29, j'ai apperçu des marques certaines que l'Aurore Boréale étoit dans l'Atmosphère & au-dessus des gros nuages qui m'ont permis d'en voir la clarté par intervalles, malgré le tems obscur & couvert de toutes ces nuits.

Novembre. Le 14 & le 15. Aurores Boréales informes.

Mém. 1734.

Mm

Le

Le 19, à 8h $\frac{1}{2}$ du soir, tout le Ciel étant couvert d'une espece de brouillard, j'ai aperçu vers le Nord-Est une clarté fort haute, & fort large, qui avoit toutes les apparences d'un grand rayon de l'Aurore Boréale, & qui ne pouvoit en effet être attribué qu'à ce Phénomène, si ce n'est qu'au-lieu d'un rayon, ce pouvoit n'être que la lumiere de l'Aurore Boréale en général, vue à travers une ouverture ou un intervalle que le brouillard laissoit en ce moment dans cette partie du Ciel. Elle a été effacée dans quelques minutes.

Le 22, l'Aurore Boréale se montre à diverses fois derriere des nuages depuis 8h $\frac{1}{2}$ jusqu'à 1ch.

Décembre. Je n'ai vu l'Aurore Boréale que le 17, & par un tems aussi peu favorable à l'observation que dans le mois précédent. Mais il y en a eu de simples apparences qui se compliquent, à mon avis, avec la Lumiere Zodiacale, les 19, 22, 24, 25 & 30.

Où je dois cependant remarquer que le 21, le Ciel étant beau & sans nuages, & ayant fait attention à l'un & à l'autre de ces Phénomènes aux heures les plus convenables, je n'en ai pu appercevoir le moindre vestige. A l'égard du 25, j'ai appris par M. *Bouguer*, que les apparences que j'y avois remarquées, se sont trouvées à Rouen & sur le chemin du Havre à cette ville, où il alloit ce jour-là, des signes non équivoques d'une Aurore Boreale fort claire, & fort étendue.

Le Barometre a été encore fort bas dans ce mois, savoir, le 26, étant descendu à 26 pouces 8 lignes, ou 7 lign. $\frac{1}{2}$. On peut même pré-

présumer qu'il avoit été plus bas pendant la nuit, parce qu'à 8 heures du matin le mercure montoit, comme je l'ai reconnu à sa surface convexe dans le tube *, & comme la suite l'a justifié une heure après. Nous avons vu ci-dessus qu'il avoit été au même point dans le mois d'Octobre; ce qui est assez rare, y ayant bien des années où il n'en approche pas.

Je ne saurois mieux terminer ce Journal d'Observations de l'Aurore Boréale, que par des marques publiques de reconnoissance pour tout que je dois sur cette matiere à M. *Celsius* Professeur en Astronomie à Upsal, & aujourd'hui très connu personnellement, & par son savoir, de la plupart des Membres de cette Compagnie. Vers le commencement de cette année, j'appris qu'il avoit donné dans la précédente 1733, & à-peu-près au même tems que mon *Traité de l'Aurore Boréale* parut, un *Recueil d'observations de ce Phénomène*, au nombre de 316, faites dans toute la Suede, & jusques sous le Cercle Polaire, soit par lui-même, soit par ses correspondans, depuis 1716 jusqu'en 1732 inclusive-ment.

* Le frottement ou la viscosité du mercure sur la paroi intérieure du tube, fait qu'il y devient plus convexe, lorsqu'il monte, & beaucoup moins, ou même concave, lorsqu'il descend. Ce que l'on reconnoitra en frappant doucement sur la planche du Barometre; car on y verra sur le champ le mercure monter ou descendre d'une demi-ligne plus ou moins, selon qu'il est en montée, ou en descente. J'écris ici cette remarque, toute simple qu'elle est, sur ce que l'on m'a dit qu'elle pouvoit être utile, pour voir tout d'un coup, si le Barometre monte, descend, ou est fixe & stationnaire.

ment. Parmi ces observations qui roulent sur 224 Aurores Boréales différentes, il y en a 188, c'est-à-dire, environ 5 de 6, qui n'ont point paru ici, ou qui m'avoient été inconnues. On peut juger de l'empressement que j'eus pour recouvrer un Livre si intéressant pour moi, & que je ne regardois pas moins comme un trésor, en ce qu'il pouvoit contenir de peu favorable à mes idées, & me donner lieu par-là de les rectifier, qu'entant qu'il étoit capable de les favoriser. L'Ouvrage n'étoit gueres répandu encore qu'en Italie, où M. *Celsius* étoit alors depuis plusieurs mois, & où il l'avoit apporté d'abord après l'impression. M. le Marquis *Poleni* à qui il en avoit fait présent, m'en donna le premier connoissance *, & dans un détail qui est trop important sur la matiere dont il s'agit, & qui fait trop d'honneur à mon hypothese, pour être passé sous silence. M. *Poleni* venoit de recevoir mon Traité, & comme il avoit fait beaucoup d'attention aux Tables que j'y ai données, pour comparer par voye de dénombrement la fréquence ou la rareté des apparitions du Phénomene, selon les différentes situations de la Terre sur l'Ecliptique, ou selon ses différentes distances au Soleil, il les avoit appliquées aux observations de M. *Celsius*; en un mot, il en avoit dressé des Tables toutes pareilles aux miennes, & ce sont ces Tables d'observations faites dans des vues, en des tems, & en des lieux si differens de ceux qui sont marqués dans celles que j'avois

re-

recueillies, qui ont fourni à M. *Poleni* des résultats tout semblables aux miens; la plus grande fréquence du Phénomene, par exemple, aux Périhélies de la Terre, à ses tems d'ascendance, ou lorsqu'elle est dans les Signes septentrionaux ascendants, & ainsi du reste. Mais j'ai encore des obligations plus directes à M. *Celsius*; car depuis qu'il est à Paris, il m'a fait part de son Livre, & d'une infinité d'observations ou de matériaux qu'il a rassemblés depuis sur le même sujet, tant par rapport aux années renfermées dans son Ouvrage, que pour des tems plus réculés, ou pour les années suivantes 1733 & 1734, & cela avec une générosité & une politesse peu communes. Par le moyen des Phénomènes que m'a fournis M. *Celsius*, & de tous ceux que j'ai recueillis d'ailleurs, ou observés moi-même depuis la publication de mon Traité, je puis appliquer la méthode & les principes que j'y ai adoptés, à plus de 600 apparitions de l'Aurore Boréale, au-lieu de 229 seulement, que j'y avois employées. C'est aussi ce que je compte faire dans un supplément, que je ferai par-là en état de donner bien plutôt que je n'eusse osé l'espérer. J'y rendrai justice aux autres personnes qui m'ont fourni, ou qui me fourniront à l'avenir leurs observations, & entre lesquels le savant M. *Kirch* est un de ceux à qui je suis le plus redevable, ayant reçu de lui sur ce sujet une Lettre remplie de réflexions & de recherches curieuses, où il remonte jusqu'aux Aurores Boréales qui ont paru depuis deux siècles. Cependant les observations de ce Phénomene que M. *Musschen-*

broek Professeur de Mathématique à Utrecht & Correspondant de l'Académie, nous a envoyées depuis peu pour la présente année, trouvent naturellement ici leur place. Elles sont contenues dans une Lettre Latine du 3 Janvier 1735, adressée à M. *du Fay*, & avec toutes les autres observations météorologiques de l'année 1734. Je ne toucherai qu'aux Aurores Boréales, & je me contenterai d'en donner un extrait abrégé. Du reste, l'exactitude & le savoir de M. *Musschenbroek* sont trop connus par ses excellens Ouvrages, pour qu'il soit nécessaire d'en faire mention.

Aurores Boréales observées à Utrecht, pendant tout le cours de l'année 1734.

Le 7 *Février*, à 7^h $\frac{1}{2}$ du soir, l'Aurore Boréale parut entre le Nord & le Nord-Ouest; elle jetta quelques rayons, parmi lesquels on en vit qui atteignoient jusqu'au Zénith. Ces rayons s'élevoient du bord supérieur & éclairé d'un nuage d'ailleurs très obscur, qui étoit comme suspendu un peu au-dessus de l'horizon. *Cette Aurore Boréale est marquée & décrite ci-dessus.*

Le 22 *Mars*, il y eut une petite Aurore Boréale à 8^h du soir, laquelle s'étendoit depuis le Nord jusqu'à l'Est, & qui s'élevoit d'environ 10 degrés au-dessus de l'horizon.

Dans le mois d'*Avril*, on a vu l'Aurore Boréale trois nuits consécutives, savoir, le 7, le 8 & le 9; celles du 7 & du 9 furent peu considérables, mais celle du 8 fut très grande. Elle brilloit déjà à 9^h du soir, s'étendant.

dant de l'Orient au Couchant, au-dessus d'un nuage éclairé; elle avoit des jets de lumiere qui montoient jusqu'au Zénith, & qui à mesure qu'ils approchoient de ce point, sembloient s'y confondre & s'y allumer. Il souffloit pendant ce tems-là un petit vent de Nord-Est, le Ciel étoit serein, & le Phénomene dura presque toute la nuit. *On peut voir ce que j'en ai dit ci-dessus, & comparer avec ceci la maniere dont il parut à Paris.*

Le mois de *Mai* a été un des plus féconds en Aurores Boréales à Utrecht, M. *Musschenbroek* en a compté jusqu'à 12; savoir, le 1, le 4, le 5, le 6, & les 8 derniers jours de ce mois. Il faut que des circonstances de tems aient été contraires à ce Phénomene à Paris; car je ne sache pas qu'on l'y ait observé aucun de ces jours, excepté le 24.

L'Aurore Boréale du premier *Mai* étoit tranquille, sa lumiere comme suspendue au haut de l'Atmosphère, sur-tout vers le Nord & vers l'Occident, laissoit voir toutes les Etoiles si distinctement, que M. *Musschenbroek* ne se souvient pas d'en avoir observé de pareille à cet égard.

Celle du 4, n'étoit pas de la même transparence vers cette partie du Ciel, elle n'y laissoit appercevoir que les Etoiles de la premiere & de la seconde grandeur; mais du côté du Midi où elle s'étendoit aussi jusqu'à la hauteur de 15 degrés, on en voyoit de la troisieme & de la quatrieme grandeur. M. *Musschenbroek* dit avoir remarqué dans le cours de ce Phénomene, que la matiere qui le composoit, se portoit souvent du Septen-

trion au Midi: & comme il y a remarqué la plupart des mêmes apparences, quoique sans jets de lumière, qu'on a coutume de voir du côté du Nord, il croit qu'on peut l'appeller *méridional*. Il y avoit aussi un semblable mouvement, soit vrai ou apparent, du Septentrion vers le Midi, à l'Aurore Boréale du 5, qui parut à 9 heures du soir après un peu de pluie. On juge d'ordinaire ce mouvement à l'inspection de quelques flocons ou nuages de matière lumineuse; mais on voit combien il faut être réservé à l'établir de la part de la matière Boréale proprement dite. Car comme des nuages & des amas de vapeurs qui n'appartiennent pas au Phénomène, peuvent fort bien en avoir les apparences, étant éclairés par sa lumière, rien n'est plus aisé que de s'y méprendre. On doit aussi se tenir beaucoup sur ses gardes dans les jugemens que l'on porte des apparitions de l'Aurore Boréale dans tous ces mois qui avoisinent le Solstice d'Été; car le Soleil ne s'y trouvant jamais pendant la nuit que fort près de l'horizon, les Crépuscules y sont longs & forts, & s'y compliquent souvent avec la Lumière Zodiacale, dont les apparences dans ces rencontres ne diffèrent presque point de l'Aurore Boréale tranquille & horizontale; & c'est de quoi M. *Musschenbroek* nous avertit lui-même, comme nous allons voir.

L'Aurore Boréale du 6 donna encore une lumière méridionale toute semblable à la lumière septentrionale.

Avant que de parler de l'Aurore Boréale du 24, & de celles qui l'ont suivie presque sans

in-

interruption jusqu'au 7 Juin,, Me voilà par-
,, venu, dit M. *Muffchenbroek*, à une Auro-
,, re Boréale la plus longue, &, pour ainsi
,, dire, la plus opiniâtre que j'aye jamais vue,
,, ayant vraisemblablement duré pendant l'es-
,, pace de 15 jours, quoiqu'il y ait eu deux
,, jours dans cet intervalle (savoir le 3 & le 6
,, Juin) où elle n'a pas été visible. Ce n'est,
,, ajoute-t-il, qu'avec beaucoup de circons-
,, pection qu'il faut observer l'Aurore Boréale
,, dans ces tems-ci, à cause de la Lumiere
,, Zodiacale, qui pourroit fort aisément trom-
,, per ceux même qui y font les plus exercés,
,, s'ils n'avoient pas d'ailleurs des indices *ma-*
,, *nifestes* de l'Aurore Boréale. Depuis quel-
,, ques années, continue le savant Professeur,
,, que j'observe ce Phénomene avec atten-
,, tion, j'ai appris à le discerner & à le pré-
,, voir pendant le jour, & le présage ne m'en
,, a pas trompé jusqu'ici; non que je puisse
,, connoître la matiere Boréale pendant que
,, le Soleil est encore fort élevé, mais seu-
,, lement lorsqu'il commence à s'approcher
,, du Couchant, & qu'il n'est tout au plus qu'à
,, une quinzaine de degrés sur l'horizon; car
,, si l'on voit alors vers le Septentrion des
,, nuages bleuâtres, comme s'il alloit tonner,
,, on peut s'assurer qu'ils contiennent de la
,, matiere Boréale. Mais je connois encore
,, mieux cette espece de nuages, que je ne
,, les puis décrire, &c.

Il passe ensuite à la description de l'Aurore
Boréale du 24 Mai, dont la lumiere s'éten-
doit à 40 degrés au-dessus de l'horizon, & qui

a continué sous différentes formes, jusqu'au 7 Juin inclusivement.

Dans le mois de *Juin*, M. *Musschenbroek* n'a vu l'Aurore Boréale que le 24. Elle étoit *tranquille*, mais sa lumière s'étendoit jusqu'au Zénith, entre le Septentrion & le Levant: c'étoient des nuages très légers & fort interrompus.

En *Juillet*, le Phénomene a paru le 5, le 7, & peut être le 8. Ce dernier est douteux, à cause de la lumière de la Lune qui entroit dans son premier quartier. Celui du 5 se montra vers les 9 heures du soir, parmi la pluie & le tonnerre.

Le 6 *Août*, il y eut, selon toute apparence, une Aurore Boréale tranquille, qui se manifesta sur tout l'horizon par des nuages lumineux dispersés çà & là. Mais le 7 de ce mois elle ne fut pas équivoque, & elle consistoit de même en des nuages interrompus & dispersés vers la partie occidentale du Ciel, ce qui rend d'autant plus vraisemblable l'apparition du jour précédent. Elle parut aussi le 9.

M. *Musschenbroek* a vu 4 Aurores Boréales dans le mois de Septembre à Utrecht, savoir, le 21, le 25, le 27 & le 29; j'ai aussi observé les deux dernières auprès de Paris, comme il a été rapporté ci-dessus. Celle du 21 étoit méridionale, n'ayant presque vers cette partie du Ciel où elle étoit fort lumineuse, & où elle s'étendoit, qu'environ 20 degrés d'amplitude, avec la même hauteur sur l'horizon. Celle du 25 étoit au Nord, au Couchant, & au Midi; l'une & l'autre ont été mêlées de pluie.

pluye. Dans celle du 27, M. *Musschenbroek* remarqua des colonnes ou verges qui s'étendoient du Septentrion au Midi, paralleles entre elles, & à l'horizon, *virgæ parvæ lucantes, copiosæ, breves, ex porrectæ omnes à Septentrione ad Austrum, &c.* & il n'avoit, ajouta-t-il, jamais vu un semblable Phénomene. Je suis bien trompé si ce n'est-là ce que j'ai observé quelquefois, & que j'ai désigné par des bandes, ou grandes trainées blanchâtres disposées en côte de melon, & qui s'étendent depuis un côté du Ciel jusqu'au côté opposé sur l'horizon, où elles semblent concourir. Voyez-en des exemples ci-dessus au 18 Février, p. 772, & dans les Mémoires de l'année dernière, pp. 656 & 664; car ce qui est dit ici de leur parallelisme pourroit bien tomber sur leur partie supérieure vers le Zénith, ou à quelque distance de leurs points de concours vus ou présumés sur l'horizon, lorsqu'il est assez découvert pour cela; & il se peut faire que l'horizon d'Utrecht ne l'étoit pas. L'Aurore Boréale du 29, que je n'ai observée à Paris que sur sa fin, depuis 11^h jusqu'à environ 11^h $\frac{1}{2}$, fut vue un peu après 10^h à Utrecht; elle y parut occuper la plus grande partie du Ciel; cependant M. *Musschenbroek* ne la met qu'au nombre des *tranquilles*, n'y ayant remarqué aucune émission de jets de lumière. Ce n'est pas ce que j'en aurois jugé, en la voyant encore si marquée à son dernier quart d'heure. M. *Musschenbroek* ajoute qu'il sembloit y avoir dans ce Phénomene un mouvement assez lent de l'Est à l'Ouest. Mais j'ai fait observer ailleurs combien cette appa-

tence peut être trompeuse, soit par la matière qui s'assemble d'un côté, tandis qu'elle se dissipe de l'autre, soit par celle qui s'allume, ou qui vient à être éclairée, & qui ne l'étoit pas auparavant, &c.

Il n'y a presque pas eu un jour serein dans le mois d'Octobre. M. *Musschenbroek* n'a pas laissé d'y observer 5 Aurores Boréales, le 1, le 2, le 5, avec une très grande pluie, le 6 & le 14. Pendant cette dernière, qui étoit foible, & qui paroissoit entre le Nord & l'Est, il vit une couronne autour de la Lune, qu'il trouva avoir exactement 44 degrés par son diamètre intérieur.

Le reste de l'année ne lui a fourni que 2 Aurores Boréales; savoir le 19, & le 25 Décembre.

Aurores Boréales observées à Petersbourg, pendant les mois de Septembre, Octobre, & Novembre, par M. Delisle.

Entre plusieurs Aurores Boréales observées à Petersbourg par M. *Delisle*, & dont il a bien voulu me faire part, il y en a 18 des mois de *Septembre, Octobre & Novembre* de cette année. Je les ajoute ici avec leurs descriptions, telles qu'elles m'ont été envoyées, & sur lesquelles on peut d'autant plus compter, que, comme M. *Delisle* me l'apprend dans une de ses Lettres, il a fait placer une espèce de Quart-de-cercle azimuthal sur le haut de son Observatoire, dans le seul dessein de bien déterminer la grandeur, les positions, & toutes les apparences de ces Phénomènes. Il rap-

rapporte une de ces apparences bien singulière, du 5 Octobre à 3 heures du matin, après une Aurore Boréale qu'il y avoit eu le soir de la veille. C'étoit une lumière très vive qui avoit l'air de la queue d'une Comete obliquement couchée au-dessus de l'horizon, & qui, selon la figure qu'il m'en a envoyée, & la comparaison que j'en ai faite avec l'état actuel du Ciel sur le Globe, devoit se trouver précisément dans le plan de l'Equateur Solaire par le milieu de sa longueur. Si cette bande de lumière avoit été placée à l'Orient, on ne douteroit point que ce ne fût la Lumière Zodiacale, qu'on fait devoir paroître le matin en Automne; mais elle étoit à l'Occident. Du reste, il paroît par les Phénomènes qui ont été vus à Petersbourg en Octobre, que le Ciel y a été pendant ce mois beaucoup plus serein qu'à Paris.

Le 1 & 2 Septembre 1734, à Petersbourg.

Le 1 & 2 Septembre 1734, il a paru de foibles Aurores Boréales indécises, depuis 10 heures environ du soir, avec quelques traits ou jets de lumière verticaux au Nord-Ouest, sans arc lumineux, ni forte lumière dans ces Aurores. Celle du 1 a duré presque toute la nuit; au moins le 2 au matin elle étoit encore visible avant la lumière du Soleil. Celle du 2 au soir a été plus foible, & n'a pas duré si longtems.

Le 3 Septembre 1734.

Le 3 Septembre, il a encore paru une Aurore Boréale, depuis le soir après le crépuscule, mais sans traits de lumière. Il n'y avoit qu'un arc lumineux semblable au crépuscule élevé de quelques degrés, & ayant un segment obscur à l'ordinaire qui lui servoit de base; mais ce segment & la lumière qui le bordoit ne paroissent pas parfaitement circulaires. Ils étoient défigurés un peu au Nord-Est. Le tout étoit élevé de peu de degrés, & s'est abaissé vers le milieu de la nuit, de sorte qu'il a disparu peu après une heure du matin, le 4 Septembre.

Le 8 Septembre 1734.

Après quelques jours de tems couverts, il paroist le 8 Septembre au matin, un peu avant le crépuscule, vers les 3 & 4 heures, un reste d'Aurore Boréale indécise qui s'élevoit encore de 8 à 9 degrés.

Le 18 Septembre 1734.

La nuit du 18 au 19 Septembre, il y a eu une assez grande Aurore Boréale, dont les nuées n'ont laissé voir le 18 au soir jusqu'à 8h $\frac{1}{2}$; qu'une lumière assez élevée, indécise; mais vers les 11 heures du soir, il y avoit des jets de lumière fort hauts, & le matin du 19, à 4h $\frac{1}{2}$ environ, on n'en voyoit plus rien, autant qu'on le pouvoit discerner au

tra-

travers des nuées dont presque tout le Ciel étoit couvert.

Le 23 Septembre 1734.

Le 23 Septembre au soir à 8^h 5', il paroiffoit comme un faisceau de Lumière Boréale au dessous des Pléiades, ayant 2 à 3 degrés de largeur, & 5 à 6 degrés d'étendue, en se perdant insensiblement depuis la base qui étoit la plus lumineuse, & qui n'étoit élevée que de 2 ou 3 degrés sur l'horizon. Il paroiffoit en même tems une autre grande bande lumineuse qui commençoit à droite de la tête du Bélier, & qui passoit au dessous de la luisante de l'Aigle. Cette lumière n'avoit que 2 degrés environ de largeur dans ses extrémités, & 10 ou 12 dans son milieu.

A 8^h 20' la première lumière s'élargit beaucoup en forme de gerbe, & est dirigée vers l'Etoile Polaire. Elle a 5 à 6 degrés de largeur, & est longue de 10 à 12 degrés. Les Pléiades sont sur son bord vers le Midi. L'autre bande s'efface presque à 8^h 22'.

La lumière au dessous des Pléiades est restée la même jusqu'à 8^h 33' presque aussi brillante qu'aucune Lumière Boréale. Le Ciel étoit serein par-tout, & il n'y avoit aucune autre lumière, pas même au Nord: l'horizon étoit un peu sombre au dessous de cette lumière jusqu'à la hauteur de 2 ou 3 degrés.

A 8^h 35' la lumière a commencé à s'affoiblir en s'éloignant des Pléiades, & restant dans une même situation à l'égard de l'horizon.

zon. A 8^h 38' elle est très foible. A 8^h 40' elle n'est pas encore dissipée

Depuis, jusqu'à 8^h 43', au-lieu de se dissiper, elle s'est un peu rallumée par deux reprises différentes.

A 8^h 47' cette lumiere ne paroît plus, mais immédiatement après, il paroissoit au Nord plusieurs rayons sans segment, peu élevés, & en petit nombre. Il en parut encore quelques-uns de même à 10^h, & puis le tout s'est réduit à une Lumiere Boréale indécise, qui se perdoit insensiblement depuis l'horizon jusqu'à la hauteur de 8 ou 10 degrés, & cela jusqu'à 11 heures du soir.

Le segment boréal s'est ensuite élevé peu après jusqu'à la hauteur de 8 ou 10 degrés qu'il avoit atteints à minuit & demi, mais il déclinait considérablement, c'est-à-dire, d'environ 10 degrés du Nord vers l'Ouest, ce dont on n'a pu s'assurer exactement, n'ayant fait cette estime qu'à la vue sans instrumens. Le 24 Septembre, à 4 heures du matin, il ne paroissoit plus rien au Nord ni ailleurs que le crépuscule ordinaire au Nord-Est.

Le 24 Septembre 1734.

Le 24 Septembre, dès les 8 heures du soir, il a paru au Nord de considérables jets de lumiere fort étroits, & qui montoient fort haut: il n'y avoit point de segment obscur ni d'arc lumineux. Le lendemain à 4^h du matin, le Ciel étant très serein, comme il l'a été toute la nuit, il n'y avoit plus aucune Lumiere Boréale. La fatigue des obser-

servations de la veille précédente m'a fait coucher ce soir-là de bonne heure, ce qui m'a empêché d'observer tout le progrès de cette lumière boréale de la nuit du 24 au 25 Septembre.

Le 29 Septembre 1734.

Le 29 Septembre au soir, entre 7 & 8 heures, il paroïssoit un rayon de lumière étroit en forme de lance. La tête de cette lumière, qui étoit sous les nuées, étoit dans le Taureau vers les Pléiades: de-là cette lumière alloit un peu en s'élargissant. Sa situation étoit oblique à l'égard de l'horizon. Elle laissoit les plus basses Etoiles de Persée au dessus d'elle, & les touchoit presque. Sa longueur étoit d'environ 30 degrés, & sa largeur d'un degré au plus. Cette lumière étoit fort foible, sur-tout à son extrémité la plus élevée. L'on a vu le même soir & la nuit une Aurore Boréale indécise dont je n'ai pas observé la durée; mais les nuées dont le Ciel a souvent été couvert en auroient bien troublé l'observation.

Le 30 Septembre 1734.

La nuit du 30 Septembre au premier Octobre il y a eu une Aurore Boréale que je n'ai pas observée.

Le 1. Octobre 1734.

La nuit du 1 au 2 Octobre, le Ciel étant
ex-

extrêmement sercin, il a paru une petite Aurore Boréale fort peu élevée, & indéterminée pendant la plus grande partie de la nuit.

Le 4 Octobre 1734.

Le 4 Octobre au soir, il paroissoit une petite Aurore Boréale vers les 9 heures sans segment, avec des rayons. Le 5 à 3 heures du matin elle étoit sans rayons & mêlée de nuées; mais il y avoit à l'Ouest une lumière très vive, qui avoit l'air de la queue d'une Comete dirigée vers le point du Ciel qu'occupoit alors la Planete de Saturne, & obliquement à l'horizon dans le même sens, & à-peu-près selon la même inclinaison que le plan de l'Ecliptique auquel elle étoit presque parallele du côté du Sud*.

Le 6 Octobre 1734.

Le 6 Octobre, à 3 & 4 heures du matin, il paroissoit une Aurore Boréale avec un segment obscur élevé seulement de quelques degrés. Le sommet de ce segment declinoit aussi de quelques degrés à l'Ouest.

Le 14 Octobre 1734.

Le 14 Octobre au soir, il y a eu de 7 à 8 heures de fort belles apparences d'une Aurore Boréale, remarquable par des portions d'arcs fort lumineux & fort étroits, mais fort

* Cette description a été ajoutée d'après une figure qu'il y avoit ici, & conformément à ce qui en a été dit ci-dessus, p. 793.

fort interrompus, & fort changeans par leur situation. Il y en avoit des portions élevées jusqu'à la hauteur de 30 à 40 degrés. Il n'y a point eu de segment obscur, mais seulement quelques traits verticaux de lumière, qui s'élevoient jusqu'à 15 à 20 degrés de distance du Zénith.

Le 16 Octobre 1734 au matin.

Le 16 Octobre, à 2 heures du matin, il paroissoit une grande Aurore Boréale composée d'un segment obscur élevé d'environ 20 degrés par son sommet, qui déclinait considérablement vers l'Ouest. Ce segment étoit bordé par un arc lumineux de plusieurs degrés de largeur, qui se perdoit insensiblement. Cet arc s'est ensuite élevé considérablement, & s'est divisé, & il a paru des traits de lumière avec des ondulations. Les parties de l'arc lumineux qui s'élevoient & se détachent, avoient la figure de petits cintres surbaissés, & aux extrémités la lumière étoit plus vive & plus large. Ces arcs pouvoient avoir 40 degrés dans leur plus grande étendue posée horizontalement. Il ne paroissoit plus rien à 3 heures du matin.

Le 16 Octobre 1734 au soir.

Le 16 Octobre au soir après le Crépuscule, il a paru un grand arc circulaire fort large, & se perdant insensiblement; son sommet passoit par les Etoiles de la tête de la grande Ourse; il se terminoit du côté de l'Occident environ
sous

sous le vertical d'Arcturus, & du côté de l'Orient sous le vertical de la Lune qui se levoit alors; c'étoit vers 8 heures. Il y avoit au-dessous de cet arc un segment obscur, mais qui n'étoit pas fort sombre. Le tout n'a pas duré longtems; une heure après, toute cette apparence étoit fort diminuée, & à 9h du soir environ il n'y avoit plus rien.

Le 17 Octobre 1734.

Le 17 Octobre au soir, il y a eu une fort grande Aurore Boréale qui, à 6h $\frac{1}{4}$, étoit élevée jusqu'aux Etoiles les plus basses du quartier de la grande Ourse. Il y avoit un grand segment obscur & deux arcs lumineux fort larges, principalement le supérieur. Le tout a duré plusieurs heures.


Le 20 Octobre 1734.

Le 20 Octobre au soir, il paroissoit une Aurore Boréale plus basse que celle du 17, elle avoit aussi un segment obscur qui n'étoit pas bien terminé.

Le 26 Novembre 1634.

La nuit du 26 au 27 Novembre, il a paru une petite Aurore Boréale élevée de quelques degrés; elle me paroissoit un peu décliner vers l'Ouest; elle étoit tranquille, formée par une simple lumière au-dessus d'un segment obscur, mal terminé.

M E.



M E T H O D E

D'OBSERVER LA VARIATION
DE L'AIGUILLE AIMANTÉE

• E N M E R. •

Par M. G O D I N. •

S'IL étoit toujours possible d'observer les Astres à l'horizon toutes les fois qu'ils y arrivent, je ne crois pas qu'il y eût de meilleure méthode d'observer la variation de l'Aiguille aimantée en Mer, que la méthode ordinaire des Pilotes, rectifiée sur les remarques de M. Bouguer, & dans laquelle on se serviroit d'une Bouffole qui, suivant M. de la Condamine, porteroit un Cercle divisé, posé de chan sur le bord de la Rose, en sorte qu'il y en eût une moitié en dessus, l'autre moitié en dessous, ce qui me paroît ajouter à cet instrument une perfection considérable. Dans ce cas, les pinnules ou filets verticaux doivent être d'une telle étendue, qu'on puisse par leur moyen viser à l'horizon, tant en dessus de la Rose pour un des côtés du Ciel, pour l'Est par exemple, qu'en dessous pour l'Ouest. Dans les deux cas, le même filet vertical dirigé à l'Astre, marquera sur l'un des demi-cercles gradués, le degré de

de la Rose auquel répond l'Astre à son lever ou à son coucher, à compter depuis la pointe de la Fleur-de-Lys; & sachant l'amplitude de cet Astre, on aura la variation à la manière ordinaire, ce qui ne demande qu'un seul observateur. Mais cette méthode, la meilleure de toutes sans contredit, est presque toujours impraticable, faute de pouvoir observer les Astres à l'horizon, & même fort souvent le Soleil qui y est enveloppé de vapeurs. Il seroit donc utile de pouvoir se servir des Astres dans d'autres situations, & d'en déduire commodément la variation. Voici pour cet effet un moyen qui ne dépend que d'une Addition fort simple faite au Compas ordinaire de Variation.

Je suppose qu'on sache l'heure en Mer. On peut la connoître par le lever & le coucher du Soleil, même avec assez de précision; on peut encore prendre des hauteurs correspondantes, en se servant du Quartier Anglois; enfin on la peut avoir par une simple observation de quatre Etoiles, dont deux soient dans un même vertical vers l'Orient, & les deux autres dans un même vertical vers l'Occident: car cette observation qui ne demande qu'un à-plomb & des Tables d'Ascension droite & de Déclinaison des Etoiles, si elle se peut faire en Mer, donnera en même tems la hauteur du Pole & l'heure de l'observation. Le calcul en est effectivement un peu long; mais comme l'observation se peut faire à terre avec précision, qu'elle ne demande aucun appareil d'Instrumens, & qu'elle peut être répétée autant de fois qu'on voudra, & être fort utile en

bien

bien des occasions, lorsque les autres moyens manqueroient, j'ai cru la devoir ajouter ici à la suite de la Méthode d'observer la Variation.

Mais si l'on connoit l'heure par le lever ou le coucher du Soleil, on pourra aussi alors observer la variation: cela est vrai, mais la méthode de l'observer à toutes les heures du jour ou de la nuit n'en sera pas moins utile.

Je fais une Bouffole ou Compas de Variation dont la Rose soit évidée intérieurement, autant qu'il est possible, & dont la circonférence soit divisée en degrés. M. de la Condamine s'en sert aussi dans sa Méthode, du moins dans certains cas, & il remarque que la Bouffole en devient plus légère, & peut être plus agile. Je tends un fil un peu au-dessus, qui passe par le milieu de la chape. Dans la Boîte je mets une Glace de Miroir qui en occupe tout le fond.

Je dis qu'avec une telle Bouffole, & connoissant l'heure, on observera aisément la variation toutes les fois qu'il y aura quelque Astre visible sur l'horizon, à quelque hauteur & en quelque azimuth qu'il soit. Mais il est plus facile de le prendre lorsqu'il est au Méridien: or on fait, par des Tables ou toutes calculées, ou très aisées à calculer, à quelle heure chaque Astre, chaque Etoile doit passer par le Méridien; donc puisqu'on connoit l'heure, on saura le moment auquel cette Etoile sera effectivement dans ce cercle. Alors tournant la Bouffole à l'Etoile, de manière que son image peinte sur le Miroir du fond soit coupée par l'image du fil, ce fil représentera exactement la Méridienne du lieu,
&

& dans cet instant on remarquera à quel degré du cercle de la Rose le même fil répond, ce qui donnera tout d'un coup la variation par la différence de ce degré à 180, dont la dénomination sera aisée à reconnoître par le sens de la division de la Rose.

Cette méthode, comme on voit, ne demande que l'heure par quelque moyen qu'on la connoisse; elle n'a pas besoin de la hauteur du Pole, si l'heure est donnée indépendamment; elle n'est point sujette aux réfractions, elle peut être répétée un très grand nombre de fois de suite, enfin un seul observateur lui suffit.

Elle se peut encore pratiquer dans tous les autres Azimuths, mais alors il faut connoître la Latitude du lieu & l'Azimuth de l'Astre, ou l'angle qu'il fait avec le Méridien. On peut l'avoir par un calcul fort court, en connoissant l'heure de son passage par le Méridien & sa déclinaison, ce que les Ephémérides donnent & l'heure de l'observation; mais il seroit très aisé de faire une Table qui évitât ce calcul.

On peut aussi se passer de connoître l'heure, & cependant trouver assez précisément le tems auquel une Etoile passe par le Méridien, & en conclure ensuite tous les Azimuths dans lesquels on voudra prendre l'Etoile pour observer la variation.

Voici maintenant la méthode de trouver la Latitude & l'heure, sans autre instrument qu'un à-plomb.

Soit P le Pole, Z le Zénith, ZB , ZD , deux verticaux quelconques; soient CD , deux
Etoi-

Etoiles dans un même vertical du côté de l'Orient, & AB deux autres Etoiles dans un autre vertical vers l'Occident dans le même instant.

Dans le Triangle PAC étant donnés PA , PC , & l'angle compris CPA , on connoitra AC & les angles sur AC . De même dans le Triangle PBC on connoît PB , PC , & l'angle compris CPB ; donc on connoitra BC & les angles sur BC .

Dans le Triangle BAC on connoît donc AC , BC , & l'angle compris ACB , qui est la difference entre les angles PCB , PCA ; donc on connoitra BAC , dont le supplément fera l'angle ZAC . Or ôtant cet angle de l'angle PAC , il restera l'angle PAZ .

Dans le Triangle PBD on connoît PB , PD , l'angle compris BPD , on connoitra donc BD & l'angle CBD ; c'est pourquoi dans le Triangle CBD , connoissant les deux côtés CB , BD , & l'angle compris, on aura l'angle BCD , dont le supplément ZCB , diminué de l'angle ACB , donnera l'angle ZAC .

Or dans le Triangle ZCA , on connoît le côté AC , & les angles faits sur le côté en C & en A ; donc on connoitra les côtés ZA , ZC , & l'angle CZA .


Enfin dans le Triangle PAZ , on connoît AZ , PA , & l'angle PAZ ; donc on connoitra PZ , complément de la latitude du lieu.

Mais dans ce même Triangle on connoitra aussi l'angle APZ , qui est l'azimuth de l'Etoile A . Or par-là on connoitra l'heure en connoissant l'ascension droite de l'Etoile à l'é-

gard du Soleil, & par conséquent à quelle heure elle doit passer par le Méridien. Supposons, par exemple, qu'à l'heure de l'observation une Horloge quelconque, une Montre, par exemple, ait marqué 6h 30' après-midi; que l'angle APZ , réduit en heures, ait été trouvé de 2h 55', & que l'Etoile soit à l'Occident; donc l'Etoile A a passé par le Méridien 2h 55' avant l'heure de l'observation, c'est-à-dire, à 3h 35' après-midi. Mais si par le calcul des Ascensions droites, cette Etoile a dû passer par le Méridien à 3h 45', il suit que la Montre de laquelle on s'est servi, retarde sur le tems vrai de 10'. Donc le tems vrai de l'observation étoit à 6h 40' après-midi.

J'ai omis ici plusieurs attentions ou corrections dont j'aurois pu grossir cet Ecrit, & dont on feroit un très bon usage dans l'observation de la Variation en Mer, parce que je suppose qu'on les remarquera, en y faisant la moindre attention.

L'Acad. 1734 Pl 39 Pag. 806.





~~~~~

OBSERVATIONS  
MÉTÉOROLOGIQUES  
FAITES

PENDANT L'ANNÉE M. DCCXXXIV.

Par M. MARALDI. \*

*Observations sur la quantité de Pluie.*

IL y a longtems qu'il n'y a eu d'année aussi pluvieuse que l'année 1734; elle est la plus pluvieuse qu'il y ait eu depuis 1720: cependant la pluie n'a pas été aussi abondante qu'aux années où on a commencé à faire les Observations Météorologiques, & où on avoit déterminé une année commune à 19 pouces. La quantité de la pluie tombée en 1734 a été de 17 pouces 6 lignes  $\frac{1}{2}$ , ce qui approche de l'année commune, qu'on a été obligé de réduire dernièrement à 17 pouces  $\frac{1}{2}$ . Voici le détail de la pluie tombée chaque mois.

|                | pouc. lign.                          |                 | pouc. lign.                         |
|----------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| En Janvier ... | 1 2 $\frac{1}{2}$                    | En Juillet .... | 3 1 $\frac{1}{2}$                   |
| Février ...    | 0 9                                  | Août ..... 0    | 10 $\frac{1}{2}$                    |
| Mars ..... 1   | 5 $\frac{1}{2}$                      | Septembre. 0    | 2 $\frac{1}{2}$                     |
| Avril ..... 1  | 1 $\frac{1}{2}$                      | Octobre ... 1   | 11 $\frac{1}{2}$                    |
| Mai ..... 1    | 11 $\frac{1}{2}$                     | Novembre. 0     | 8                                   |
| Juin ..... 1   | 2 $\frac{1}{2}$                      | Décembre. 2     | 9 $\frac{1}{2}$                     |
|                | <u>7 10 <math>\frac{1}{2}</math></u> |                 | <u>9 8 <math>\frac{1}{2}</math></u> |
|                | N <sup>o</sup> 2                     |                 | Donc                                |

\* 12 Janvier 1735

Donc la somme totale de la pluie est de 17 pouces 6 lignes  $\frac{1}{2}$ .

La pluie tombée dans les six premiers mois a été de 7 pouces 10 lign.  $\frac{1}{4}$ , moindre de 1 pouce 9 lign.  $\frac{3}{4}$  que celle qui est tombée dans les six derniers mois, qui est de 9 pouces 8 lignes  $\frac{1}{2}$ . Elle a été distribuée fort inégalement dans les six derniers mois; le seul mois de Juillet en a fourni autant que les trois mois suivans, Août, Septembre & Octobre. J'ai vu plusieurs Rivieres qui ont débordé au commencement de ce mois, comme la Marne, la Meuse & la Moselle, aux bords desquelles la plus grande partie des fourages a été perdue. Le vent a toujours été pendant ce mois au Sud, tirant tantôt vers l'Est, tantôt vers l'Ouest. La pluie du mois de Décembre a été aussi très abondante, elle a été de 2 pouces 9 lignes  $\frac{1}{2}$ . Il y a eu sur la fin de ce mois des vents de Sud-Ouest très violens, & le 25 de ce mois il y a eu un grand orage avec des éclairs & tonnerres.

*Observations sur le Thermometre.*

L'Hiver a été très modéré, le plus grand froid n'a fait descendre la liqueur du Thermometre ordinaire qu'à 23 degrés  $\frac{1}{2}$ , & celle du Thermometre de M. de Reaumur à 996 degrés, le 23 & le 24 de Janvier, par un tems couvert & un grand vent de Nord-Est; mais le vent s'étant calmé le 25, la liqueur de l'un monta à 24 degrés  $\frac{1}{2}$ , & celle de l'autre à 996  $\frac{1}{2}$ , & le 28 du même mois elle étoit dans le premier à 28 degrés, & dans le second à 999.

Il paroît que le plus grand froid de l'année 1734 est arrivé, suivant les Thermometres, le 30 de Novembre. La liqueur du Thermometre ordinaire est descendue ce jour-là à 22 degrés  $\frac{1}{2}$ , & dans celui de M. de Reaumur à 994  $\frac{1}{2}$ ; elle avoit été le 29 à 24 degrés  $\frac{1}{2}$  dans le premier, à 997 dans le second. La chaleur de l'Été n'a pas été fort grande, les mêmes Thermometres ont marqué la plus grande chaleur au commencement de Septembre. Le 6 de ce mois, à 3 heures après midi, la liqueur de l'un est montée à 76 degrés, & celle de l'autre à 1025  $\frac{1}{2}$  par un vent d'Ouest. Le 7 elle étoit à 72 degrés dans le premier, & à 1024 dans le second; mais le 8 elle étoit montée à 75 degrés dans l'un, & à 1025  $\frac{1}{2}$  dans l'autre.

*Sur le Barometre.*

Le Barometre a marqué la plus grande élévation du Mercure le 9 de Février à 28 pouces 6 lignes, le 16 du même mois à 28 pouces 6 lignes  $\frac{1}{2}$  par un tems couvert & un vent de Nord-Est; il a été plusieurs jours avant & après à 28 pouces 5 lignes  $\frac{1}{2}$ ; enfin il s'est soutenu à une grande hauteur pendant les mois de Janvier & de Février.

Le même Barometre a marqué la plus petite hauteur le 26 & le 27 de Décembre à 26 pouces 11 lignes, par un tems couvert & pluvieux, & un très grand vent de Sud-Ouest qui a régné pendant la plus grande partie de ce mois.

*Déclinaison de l'Aiguille aimantée.*

J'ai observé le 13 de Mai 1734, avec une Aiguille de 4 pouces, la Déclinaison de l'Aiman de  $15^{\circ} 35'$  au Nord-Ouest. M. Buache l'a observée le 1<sup>er</sup>. de Décembre avec une Aiguille de 6 pouces de  $15^{\circ} 40'$ .

*ADDITION au Mémoire qui a pour titre Nouvelle Maniere d'observer en Mer la Déclinaison de l'Aiguille aimantée.*

*Extrait d'une Lettre de M. DE LA CONDAMINE, de Saint-Domingue, le 15 Juillet 1735.*

PENDANT notre traversée de France à la Martinique & à Saint-Domingue, nous avons eu le loisir de faire l'expérience de mon nouveau Compas de Variation. M<sup>rs</sup> Godin & Bouguer, mes compagnons de voyage, en ont paru fort contents, & le préférèrent à tous ceux dont on se sert en Mer, particulièrement pour l'observation des Amplitudes horizontales, ce qui est son usage principal & le plus ordinaire. Il fait très bien son effet, & est d'une grande commodité, en ce qu'il ne demande qu'un observateur, & qu'il n'a pas besoin comme les autres d'être continuellement dirigé vers le Soleil, auquel il suffit de l'exposer. Les Pilotes, qui n'approuvent gueres ce qui a un air de nouveauté, lui donnent



nent unanimement la préférence sur leur Compas de Variation, & ont trouvé celui-ci d'un usage facile & commode. Si leur suffrage est de quelque poids, c'est sur-tout dans les choses de pratique; vous pouvez voir de quelle maniere s'exprime dans son Certificat le Sr. Auroy, ancien Pilote, Vice-Amiral des Vaisseaux du Roi, qui étoit embarqué avec nous.

J'avois craint que lorsque le Soleil ne seroit pas bien net à l'horizon, ce qui arrive assez fréquemment, on ne pût pas observer, faute de pouvoir distinguer l'ombre du Stile, & j'avois songé à me servir en ce cas d'un Verre convexe pour rassembler les rayons, & former une ombre sensible. Mais l'expérience m'a fait connoître qu'en se plaçant à l'opposi-  
te du Soleil, on peut toujours & fort aisément remarquer à quel degré du rebord vertical répond le Stile ou le Pivot, en leur faisant couper en deux également le disque du Soleil levant ou couchant. Lorsque le Soleil est brillant, on a le choix d'observer ou de cette maniere ou par l'ombre, ou des deux manieres tout à la fois.

L'expérience m'a encore appris qu'on peut aussi observer directement la variation avec ce Compas par le moyen des Etoiles fixes, en les prenant au Méridien, & remarquant alors à quel degré du rebord vertical répond le Stile ou le Pivot. La seule difficulté en ce cas consiste à bien éclairer les degrés de la Rose ou du rebord, sans présenter la lumiere aux yeux de l'observateur qui bornoye l'Etoile par le Stile vertical ou par le Pivot, selon que le rebord vertical gradué est supérieur

ou inférieur au plan de la Rose: on comprend bien que les Étoiles les plus proches de l'horizon sont les plus commodes & les plus propres pour cette observation. On trouve des Boussolés toutes faites de cette nouvelle construction à Paris, Quai de l'Horloge, chez le S<sup>r</sup> le Maire fils, au Quartier Anglois, il les met en état d'être transportées par terre.

*Corrections & Additions pour le Mémoire intitulé Nouvelle Maniere d'observer en Mer la déclinaison de l'Aiguille aimantée. 14 Novembre 1733.*

*Page 602. ligne dern. après ces mots, tout le secours qu'on en doit attendre. Ajoutez, Peut-être n'est-ce qu'à l'imperfection de l'Instrument dont on se sert en Mer pour observer la Variation, qu'il faut s'en prendre, si on n'a encore pu tirer aucun avantage, pour la connoissance des longitudes en Mer, de l'ingénieux Système des Courbes de Variation de M. Halley.*

*Page 603. ligne 5. Ce n'est probablement pas. Lisez, & ce n'est probablement pas.*

*Ligne 17. Le mérite de ce qui a paru d'excellent sur cette matiere. Lisez, le mérite de tout ce qui a paru sur cette matiere.*

*Page 605, ligne 7. On peut voir ce qu'en ont dit M. de Radouay, &c. Lisez, On peut voir ce qu'en ont dit le P. Feuillée dans son Journal d'Observations, le P. Laval dans son Voyage de la Louifiane, M. de Radouay, &c.*


*Ligne 11. Je me contenterai d'observer qu'ou-*

qu'outre les défauts auxquels on peut remédier, &c. *Lisez*, Je me contenterai de rapporter ici les termes dont se sert l'illustre M. de la Hire, en parlant des Bouffoles de Vaisseau en général : *Celles de Mer sont si grossières qu'on ne peut assez s'étonner comment on s'y fie pour la conduite d'un Vaisseau, mais on n'a rien de meilleur ni de plus commode. Mém. de l'Acad. 1716. p. 14.* Outre les défauts auxquels on peut remédier, &c.

*Ligne 17. après ces mots*, dans son état présent. *Ajoutez*, tel à-peu-près que le sont les Compas de Variation de construction Angloise.

*Ligne 30.* Il ne suffit pas que chaque observation instantanée soit juste en elle-même, si elles ne sont pas exactement contemporaines. *Lisez*, il ne suffit pas que les deux observations soient justes en elles-mêmes, si elles ne sont pas simultanées.

F I N.





## AVIS AU RELIEUR.

Le Relieur aura soin de conserver le papier blanc qui est à côté des Figures, afin de les faire déborder hors du Livre.

## AAN DEN BOEKBINDER.

De Boekbinder zy gewaarschouwt het papier ter zyde de Figuren niet af te snyden, maar zodaanig in te zetten, datze buiten het Boek uitstaan.



Ad 1476086









21  
22  
23

4x  
B  
5

